





## Repertorium specierum novarum regni vegetabilis.

Centralblatt für Sammlung und Veröffentlichung von Einzeldiagnosen neuer Pflanzen.

Herausgegeben

von

Prof. Dr. phil, Friedrich Fedde.

Gesamtverzeichnis: von Band I—X.:

Berlin-Dahlem.

Selbstverlag des Herausgebers, Fabeckstraße 49. 1914.

I, ndey Bd. 1-10 1905/12

## Vorrede.

Hiermit übergebe ich das Inhaltsverzeichnis von Band I—X des Repertorium der Öffentlichkeit und hoffe, daß es gute Dienste leisten wird. Es enthält einschließlich der Synonyme über 15000 Namen, ein Beweis, was für eine Fülle von Stoff in den ersten, z. T. noch recht dünnen Bänden des Repertorium enthalten ist. Sollten sich beim Gebrauche Irrtümer oder Druckfehler herausstellen, so bitte ich, sie mir mitzuteilen, damit sie in den Druckfehlerverzeichnissen richtiggestellt werden können.

Berlin-Dahlem, Ende Juli 1914.

Prof. Dr. F. Fedde.





## Inhalt.

Ames, Oakes. Species novae Acoridii generis in Philippinis insulis indigenae.
(Ex: Proc. Biol. Soc. Washington, XIX [1906], pp. 143-154)  IV (1907) pp. 72-82
Andres, H. Beiträge zur Kenntnis der Pirolaceae.  (Ex: I. Verh. Naturh. Ver. Rheinlande u. Westfalen LXVI [1909], pp. 99—151. — II. Deutsche Bot. Monatsschrift, 1910, no. 2 [pp. 4—7]; 1911, no. 3 u. 4 [pp. 18—22, 34—37, 50—54, tab. I—III]. — III. Abh. Botan. Ver. Provinz Brandenburg, LII [1910], pp. 90—97. — IV. Mitt. Bayer. Botan. Ver., II, no. 19 [1911], pp. 338—340, tab. II.)  X (1911/12) pp. 134—144
Areschoug, F. W. C. Plantae novae sub itinere navis bellicae Eugeniae anno 1852 a N. J. Andersson circa Guayaquil collectae.  (Ex: Kgl. Sv. Fregatten Eugenies Resa 1851—53. — 1910, pp. 115—142.)  X (1911/12.) pp. 299—303
Bailey, F. M. Species novae ex: Contributions of the Flora of Queensland and New Guinea. I.  (Ex: The Queensland Agric. Journ, XVI, pt. 6, March 1906, pp. 410
- 412.)
— Species novae ex: F. M. Bailey, Contributions of the Flora of Queensland, III.
(Ex: The Queensland Agric. Journ., XX, 1908.) IX (1910/11) pp. 545-546  Species novae ex: F. M. Bailey, Contributions of the Flora of Queensland. IV.
<ul> <li>(Ex: The Queensland Agric. Journ., XXI, 1909.).</li> <li>Species novae ex: F. M. Bailey, Contributions of the Flora of Queensland.</li> </ul>
(Ex: The Queensland Agric. Journ., XXIII, 1909.) IX (1910/11) pp. 547—548  Baker, Ed. G. Two new Leguminosae from East Africa. (Original-diagnosen.)
Baker, J. G. Generis Albucae species novae Capenses a J. G. Baker descriptae.  (Aus: Records of the Albany Museum, I [1904], pp. 89-94.)  II (1906) pp. 193-195. III (1906/07) p. 59
Baker, R. T. Plantae novae Australienses.  (Ex: R. T. Baker, Contribution to a Knowledge of the Flora of Australia. — Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI [1906], pp. 711—721, tab. LXV—LXVII.)

```
Baker, R. T. Actinotus Paddisoni.
       (Aus: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, XXX [1905], p. 225-228, pl. IV.)
                                                         V (1908) pp. 158—159
- Neues aus: Richard T. Baker and Henry G. Smith, A Research of the
     Pines of Australia.
     (Techn. Mus. N. S. Wales. — Tech. Educ. Ser. no. 16, Sydney 1910, XIV, 452 pp. mit 300 Textfiguren, vielen Tafeln und 3 Karten)
                                                      IX (1910/11) pp. 127-128
Battandier, J. A. Nova ex: J. A. Battandier, Flore de l'Algérie. Supplé-
     ment aux Phanérogames. 1910.
                                                      X (1911/12) pp. 218-219
Beccari, O. Palmae novae antillanae. (Originaldiagn.) VI (1908/09) pp. 94-96
Becker, W. Viola Jaccardii = V. calcarata × cenisia W. Becker hybr.
    nov. (Originaldiagnose.) .
                                                    III (1906,07) pp. 132—133
- Viola gracillima St. Hil., Pl. rem. Bras. (1824), p. 275, var. incisa W. Becker
       nov. var. (Originaldiagnose.) .
                                                                V (1907) p. 46
- Zwei Violen aus Peru. (Originaldiagnosen.)
                                                    VII (1909) pp. 123-124
Béguinot, A. Gypsophila Visiani Beg., n. sp., ex Dalmatia. (Original-
    diagnose.)
                                                                (V 1908) p. 97
- Species novae Ibericae Romuleae generis.
      (Ex: Bol. Soc. Broter. Coimbra, XXII [1906], pp. 3-20.)
VIII (1910) pp. 214-216
Beille, L. Pausinystalia nov. gen. Rubiacearum, tribus Cinchonearum
    a Pierre descriptum.
      (Ex: L. Beille, Contribution à l'étude des genres Corynanthe Velw.
    et Pausinystalia [nov. gen.] Pierre. In: Act. Soc. Lin. Bordeaux,
    LXI [1906], pp. 129—132, avec 5 fig.).
                                                         V (1908) pp. 309-310
Bennett, Arthur. Potamogetones novae ab Arthur Bennett descriptae.
      (Ex: Ann. Cons. et Jard. Bot. Genève, IX. [1905], pp. 93 à 105.)
                                                      III (1906-07) pp. 87-89
Berger, A. Neue Arten sukkulenter Euphorbien.
      (Ex: A. Berger, Sukkulente Euphorbien. Illustr. Handbücher sukku-
    lenter Pflanzen, 1907, 135 pp.) .
                                                        VIII (1910) pp. 84-89
                 Bitter, Georg.
    (Originalarbeit.) .
 - Solana nova vel minus cognita. I. (Originalarbeit) X (1911/12) pp. 529-565
Bolus, Harry. Plantae africanae novae. I.
      (Ex: Trans. South African Phil. Soc., XVI, pt. 2 [Oct. 1905], pp. 135—152.)
                                                       IV (1907) pp. 194-202
- Plantae africanae novae. II. III.
      (Ex: Trans. South African Phil. Soc., XVI, pt. 4 [Dec. 1906], pp. 381-400)
    I cf. Rep., IV (1907), pp. 194-202. . . VII (1909.) pp. 124-132, 151-157
Borbàs, V. de. Menthae generis species novae ad sectionem "Nudici-
    pitum" pertinentes.
      (Aus: Ung. Bot. Bl. IV [1905]. pp. 48-54.) . II (1906) pp. 64, 80, 112
Bornmüller, J. Zur Gattung Monanthes. (Originaldiagn.) III (1906/07) pp. 23, 24

— Centaurea Amasiensis Bornm. 1890 (sect. Centaurium) florae Anatoliae
    species indescripta nova. (Originaldiagnose.) .
                                                      III (1906/07) pp. 54-55
- Zwei neue Arten der Gattung Pedicularis aus Süd- und West-Persien.
    (Originaldiagnosen)
                                                       lll (1906/07) pp. 72—75
- Die Arten und Formen der persischen Cruciferengattungen Clastopus Bge.
    und Straussiella Hausskn. (Originaldiagnosen.) III (1906,07) pp. 114—116
- Papilionacearum species quaedam novae e flora Phrygiae. (Original-
    diagnosen.)
                                                     III (1906/07) pp. 129-132
- Galium Dieckii Bornm., eine neue Art der Sektion Eugalium-Chromogalia
    aus der Flora des Cilicischen Taurus. (Originaldiagn.) IV (1907) pp. 267–268
— Bryonia Haussknechtiana Bornm. nov. spec. (Originaldiagn.) IV. (1907) p. 354
- Über eine neue Biarum-Art aus der Flora Persiens. (Originaldiagnose.)
                                                          V (1908) pp. 57-58
- Ein neues Ornithogalum aus der Flora des assyrischen Kurdistan.
   V (1908) p. 135
```

Bornmüller, J. Species et varietates nonnullae novae e flora Phrygiae. (Originaldiagnosen.) V (1908) pp. 166–168
— Reaumuria Kermanensis Bornm., nov. spec. (1894 in exsicc.) (Original-
diagnose.)
— Über eine unbeschriebene Satureia der Section Sabbatia aus der Flora
von Assyrien. (Originaldiagnose.) VI (1908,09) pp. 114–113  — Saponaria Kermanensis Bornm. nov. spec. sectionis Proteiniae e flora  Parsiae austro originaldiagnose.) VI (1908,00) pp. 202, 203
Persiae austro-orientalis. (Originaldiagnose.) VI (1908,09) pp. 302—303—Zwei neue Scrophularien aus Persien und Kurdistan. (Originaldiagn.)
VII (1909) pp. 202—204  Ein neues Geranium der Sektion Batrachia, aus den türkisch-persischen
Grenzgebirgen. (Originaldiagnosen.) VIII (1910) pp. 81—82  — Drei neue Cirsium-Arten der Section Epitrachys aus der Flora Persiens
und Transkaspiens. (Originaldiagnosen.). VIII (1910) pp. 260—262  Neue Onosma-Arten aus Persien und Kurdistan. (Originalabhandlung.)
VIII (1910) pp. 539—544 Astragalus vulcanicus Bornm., eine neue nordpersische Art der Section
Myobroma. (Originaldiagnose.) VIII (1910) pp. 546—547—  Acantholimon microstegium Bornm., species nova sectionis novae persica. (Originaldiagnose.) VIII (1910) pp. 547—548
- Veronica Aleppica Boiss. B. schizostegia Bornm. (nov. var.) (Original-
diagnose.)
— Über einige unbeschriebene Aethionema-Arten der orientalischen Flora.
(Originaldiagnosen)
hörende neue Art der Flora Kleinasiens. (Originaldiagnose.)  X (1911/12) pp. 238—236
Notiz über zwei Gramineen aus Palästina. (Originaldiagnosen.)     X (1911/12) pp. 381—382  Crosus Machitiaus Parime at Direct parime and Palästina.  X (1911/12) pp. 381—382
<ul> <li>Crocus Moabiticus Bornm, et Dinsm, aus Palästina. (Originaldiagnose.)</li> <li>X (1911/12) p. 383</li> <li>Zwei neue Arten von Paracaryum und Nepeta aus Transkaspien.</li> </ul>
(Originaldiagnosen.)
asien. (Originaldiagnose.)
X (1911/12) pp. 465—468
X (1911/12) pp. 468—472
Brand, A. Novae species andinae generis Symplocos. (Originaldiagn.) Il (1906)pp. 13—14
Novae species sinicae generis Symplocos. (Originaldiagnose.) III (1906,07) pp. 216-218
<ul> <li>Decas specierum novarum Hydrophyllacearum in herbario Universitatis         Berkeley detecta.         (Ex: A. Brand, Beiträge zur Kenntnis der Hydrophyllaceae. — Bei-</li> </ul>
lage zum Jahresbericht des Kgl. Gymnasiums zu Sorau, 1911, pp. 7—9.) IX (1910/11) pp. 385—389
- Namation, eine neue Gattung der Scrophulariaceae. (Originaldiagn.) X (1911/12) pp. 280281
<ul> <li>Andropus, eine neue Gattung der Hydrophyllaceae. (Originaldiag.)</li> <li>X (1911/12) p. 281</li> </ul>
Brandegee, T. S. Plantae novae Mexicanae a C. A. Purpus collectae.  (Aus: Zoë, V [1906], pp. 231—241.) Ill (1906,07) pp. 373—380  — Plantae novae Californicae.
(Aus: Zoë, V [1906], pp. 227—230.) IV (1907) pp. 13—15

```
Brenner, Magnus. Varietates novae Taraxaci officinalis.
      (Ex: Medd. Soc. Faun. Flor. Fennica, It. 32, 3. III. 1906, p. 96-99.)
                                                        IV (1907) pp. 28-29
- Taraxaca nova vel distinctius definita. (Originaldiagn.) IV (1907) pp. 355-357
Briquet, John. Novitates Spicilegii Corsici a John Briquet descriptae.
      (Ex: Ann. Cons. et Jard. Bot. Genève, IX [1905], pp. 106 à 183.)
                                                   III (1906/07) pp. 121—125
- Labiatae novae in Asia media atque Persia ab Ove Paulsen collectae.
      (Ex: Bot. Tidsskr., XXVIII [1907], pp. 233-248.) VI. (1908/09) pp. 65-73
Britton, N. L. Plantae novae bahamenses. I. (Ex: Bull. N. Y. Bot. Gard., Ill [1905], pp. 441-453.) V (1908) pp. 179-185
- Plantae novae bahamenses. Il.
      (Ex: Bull. N. Y. Bot. Gard, IV [1905], 116-127.) VI (1908/09) pp. 244-249
Brockmann-Jerosch, H. Neue Arten und Formen aus dem Gebiete des
    Puschlav (Bezirk Bernina, Kanton Graubünden).
      (Ex: Die Pflanzengesellschaften der Schweizeralpen. I. Teil. Die
    Flora des Puschlav. Von Dr. H. Brockmann-Jerosch. Leipzig 1907.
    438 pp. mit 5 Vegetationsbildern und 1 Karte.)
                                                      V (1908) pp. 156-157
Brumhard, Philipp. Erodii generis novae varietates atque formae. (Original-
    diagnosen)
                                                       II (1906) pp. 117—119
Buchenau, Franz. Eine neue Butomaceen-Gattung (Ostenia). (Abh. Nat.
    Ver. Bremen, XIX [1906], pp. 23, 24). . . .
                                                      III (1906/7) pp. 90-91
Burchard, Oscar. Eine neue Lotus-Art auf Tenerifa.
                                                    (Originaldiagnose.)
                                                     VII (1909.) pp. 328-329
- Zwei neue kanarische Pflanzen. (Originaldiagnosen.) VIII (1910) pp. 551-552
Burkill, J. H. Anguillicarpus, genus novum Cruciferarum.
      (Ex: Journ. a. Proc. Asiatic Soc. of Bengal, N. S, III [1907], no. 8,
    pp. 559-561).
                                                      V (1908) pp. 250-251
Busch, N. Arabis sect. nov. Alliariopsis.
      (Ex: Mon. Jard. Bot. Tiflis, Livr. 6 [1906], pp. 1-23)
                                                       VI (1908/9) \text{ pp. } 39-40
- Ranunculacearum species atque varietates novae Caucasicae a N. Busch
    in Fl. Cauc. critica descriptae.
                                III, 3 [1901], pp. 1-32; [1902], pp. 33-112
      (Ex: Fl. Cauc. crit.,
                                                        VII (1909) pp. 23-31
    [1903], pp. 113—208.)
- Species novae ex: N. A. Busch, B. B. Marcowicz, G. N. Woronow,
    Schedae ad Floram caucasicam exsiccatam. II
      V. VI. [1907]; VII—X (1908).
                                                   IX (1910/11) pp. 132-133
Buser. R. Alchimillae novae Caucasicae et Ponticae.
      pp. 1-16.
Bush, B. F. Plantae novae Texanae.
      (Ex: Missouri Bot. Gard. Rep., XVIII [1906], pp. 119-125.)
                                                      IV (1907) pp. 213—217
Cadevall, Juan, y Diars. Plantae novae Catalanae.
      (Ex: Boll. Soc. Españ. Hist. Nat., VII [1907], pp. 123-132.)
                                                            VII (1909) p. 178
Callier, A. Diagnoses formarum novarum generis Alnus. (Original-
                                                    X (1911/12.) pp. 225-237
    diagnosen.) .
                       . . .
                                                   (Originaldiagnosen.)
De Candolle, A. Myrsinaceae novae tonkinenses.
                                                     VIII (1910) pp. 353-354
De Candolle, C. Meliaceae novae Bolivienses.
                                                   (Originaldiagnosen.)
    (cf. Herzog!)
                                                       VII (1909) pp. 58-59
- Piperaceae bolivianae. (Cf. Pax!)
                                                          IX (1910/11) p. 229
— Piperaceae Meeboldianae Herbarii Vratislaviensis, (Originaldiagnosen.)
                                                    X (1911/12) pp. 518—523
Chase, Agnes. Panicearum genera ac species aliter disposita. I.
      (Ex: Proc. Biol. Soc. Washington, XIX [1906], pp. 183-192.)
                                                        IV (1907) pp. 29-30
```

```
Chase, Agnes. Panicearum genera ac species aliter disposita II.
      (Ex: Proc. Biol. Soc. Washington, XXI [1908], pp. 1-10.)
                                                        V (1908) pp. 305-306
- Panicearum genera ac species aliter disposita. III.
      (Ex: Proc. Biol. Soc. Washington, XXI [1908], pp. 175-188.)
                                                       IX (1910/11) pp. 38-40
Chiovenda, Emilio. Graminaceae somalienses novae.
      (Ex: Ann. di Bot. ed. Pirotta, V [1908], pp. 59-68.) VI 1908/9) pp. 5-7

    Asteraceae novae in Ruwenzori Africae monte collectae.

      (Ex: Ann. di Bot. ed. Pirotta, VI [1907], pp. 149-151.)
                                                      VI (1908/9) pp. 181—183
- Poaceae novae in Ruwenzori Africae monte collectae.
      (Ex: Ann. di Bot. ed. Pirotta, VI [1907], pp. 147-148.)
                                                      VI (1908/9) pp. 179-180
Christ, H.
            Filices coreanae novae. (Originaldiagnosen.)
                                                        V (1908) pp. 284-285
- Cyatheaceae, Polypodiaceae, Schizaeaceae; in E. Hassler, Novitates
    paraguarienses. I. (Originaldiagnosen.) . . .
                                                      VI (1908<sub>1</sub>9) pp. 348—31
- Polypodiaceae Paraguarienses. II. (cf. Hassler!) . VII (1909) pp. 374-375
                                                      VIII (1910) pp. 17-20
- Filices costaricenses. (Originaldiagnosen.) .
Christensen, Carl. Dryopteris nova brasiliensis. (Originaldiagnose.)
                                                      VI (1908/9) pp. 380-381
- Four new ferns. (Originaldiagnosen)
                                                     IX (1910/11) pp. 370-372
- Two new bipinnatifid species of Alsophila. (Originaldiagnosen.)
                                                     X (1911/12) pp. 213-214
Clarke, C. B. Cyperaceae duae novae Brasilienses. (Originaldiagnosen.)
                                                              II (1906) p. 145
Cockayne. L. Nova ex: Report on a Botanical Survey of Stewart Island.
   (New Zealand, Department of Lands, C. 12, 1908, pp. 42-44.)
                                                      VIII (1910) pp. 220-224
               Orchidaceae novae Florae Brasiliensis. (Auszug der
    neuen Diagnosen aus Orchidaceae III in: Flora Brasiliensis, Enumeratio
    plantarum in Brasilia hactenus detectarum etc. Fasc. CXXVII. 202
    pp., cum. tab. 1-42.) . . .
                                                1 (1905) pp. 92-96, 108-112
- Orchidaceae novae Brasiliae atque terrarum adjacentium ab Alfredo
    Cogniaux descriptae. I. II. III.
      (Ex: Bull. Soc. Roy Bot. Belgique, XLIII [1906], pp. 266 à 356.)
                                                         IV (1907) pp. 54 60
                                                        V (1908) pp. 312-317
                                                       VI (1908/9) pp. 55-63
-- Macrozanonia gen. nov.
      (Ex: Bull. Soc. bot. Belgique, XLIII [1906], p. 358. IV (1907) pp. 380-381
- Deux Cucurbitacées nouvelles des îles Samoa. (Originaldiagnosen.)
                                                        V (1908) pp. 257—258
— Hemsleya nova Chinensis (H. trifoliolata.). (Originaldiagnose.)
                                                            VI (1908/9) p. 304

    Orchidées nouvelles de la Jamaïque, de l'Herbier "Krug et Urban",

                                                    VI (1908/09) pp. 304-307
    de Berlin. (Originaldiagnosen.)
— Orchidaceae novae paraguarienses. (Originaldiagnosen.) (cf. Hassler!)
                                                        VII (1909) pp. 69-70
— Melastomataceae novae paraguarienses. (Originaldiagnosen.) (cf. Hassler!)
                                                        VII (1909) pp. 71-72
— Cucurbitaceae novae paraguarienses. (Originaldiagnosen.) (cf. Hassler!)
                                                              VII (1909) p. 72
- Orchidées nouvelles de la Jamaïque de l'Herbier "Krug et Urban", de
   Berlin. II. (Originaldiagn.)
                                                      VII (1909) pp. 121—123
                                                   X (1911/12) pp. 343-344
- Orchidaceae II. (Cf. Hassler!) .
```

Cortest, F. Rubiaceae, Urticaceae, Rosaceae atque Crassulaceae novae
in Ruwenzori Africae monte cellectae. (Ex: Ann. di Bot. ed. Pirotta, VI [1907], p. 152; VI [1908], pp. 535-537.) VI (1908/9) pp. 189-191
Costantin et Bois. Genus Pachypodium speciebus novis auctum. (Ex: Ann. Soc. nat. Paris, Bot, 9. sér. VI [1906] pp. 307-330.) V (1908) pp. 246-250
Costantin et Gallaud. Asclepiadaceae novae madagascarienses a Geay collectae.
(Ex: Bull. Mus. d'Hist nat. Paris, XII. [1906], pp. 415—421.)  IV (1907) pp. 376—380
- Jatropha tepiquensis Costantin et Gallaud. (Ex: Rev. gén. Bot. XVIII (1906) p. 388, Fig. 1-2.) V (1908) pp. 128-129
- Asclepiadaceae novae Madagascarienses.
(Ex: Ann. Sci. nat. Paris, Botanlque, sér., 9 VI [1907,] pp. 333-364, pl. 3-5.)
Coulter, J. M. und Nelson, A. Neues aus: J. M. Coulter and A. Nelson, New Manual of Botany of the Central Rocky Mountains. 1909 IX (1910/11) pp. 482-486
Coutlnho, A. X. P. Borraginaceae Lusitanicae. (Ex: Bol. Soc. Brot., XXI [1904-1905] 1906, pp. 106-165.) VI (1908/9) pp. 187-189
— Scrophulariaceae novae Lusitanicae. (Bol. Soc. Broter. XXII [1906], pp. 114—213.)
Labiatae novae Lusitanicae. (Ex: Bol. Soc. Broter, XXIII [1907], pp. 51-175.) VIII (1910) pp. 458-463
Dahlstedt, H. Taraxaca nova Bergiana.  (Ex: Act. Hort. Berg., IV [1907], no. 2; 31 pp. mit 2 Tafeln und  8 Textfiguren VII (1909) pp. 134—140
Davidoff, B. Plantae novae Bulgariae orientalis. (Ex: Sbornik, XXV [1909], Sofia.)
Davidson, A. Acrolasia, Loasacearum genus, aucta. (Ex: Bull. South. Calif. Acad. Sci., V [1906], pp. 13—18.)
VII (1909) pp. 41—42 Diels, L. Agapetes Hosseana Diels n. sp. (Originaldiagn.) . I (1905) p. 16
<ul> <li>Marsilia paradoxa nov. spec. (Originaldiagnose.) III (1906/7) p. 86</li> <li>Rhododendron siamense Diels, nov. spec. (Originaldiagnose.)</li> </ul>
IV (1907) p. 289  — Prunus Hosseusii Diels, nov. spec. aus Siam. (Originaldiagnose.)
IV (1907) pp. 289 – 290 – Azorella Cockaynei. (Originaldiagnose.) VI (1908/9) p 36
<ul> <li>Ourisia modesta Diels, eine neue Art Neuseelands. (Originaldiagnose.)</li> <li>VII (1909) p. 114</li> </ul>
<ul> <li>Diapensia purpurea Diels, nov. spec. aus Szechuan. (Original-diagnose.)</li> <li>X (1911/12) pp. 419-420</li> </ul>
Diels, L., Ulbrich, E., Knuth, R., et Rehder, A. Novitates Filchnerianae tibeticae et chinenses. (Originaldiagn.) II (1906) pp. 65-67
Dode, LA. Species novae ex "Extraits d'une monographie inédite du Genre Populus" a LA. Dode descriptae. I. II. III. IV. V. III (1906/7) pp. 157—163, 199—206, 232—234, 258—262. 353—357
- Novae species Catalpae generis.
(Ex: Bull. Sec. Dendr. France, II [1907], p. 194—206.) VII (1909) pp. 7-8  - Ailanthus genus speciebus novis auctum.  (Ex: Bull. Soc. Dendr. France, II [1907], pp. 190—194.) VII (1909.) p. 8
- Species novae generis Juglandis. I. Ex: Bull. Soc. Dendr. France, I [1906], pp. 65—98.) VII (1909), pp. 90—94
and and ever behalf I takee, I [1888], pp. 68 88.) In (1888), pp. 68

```
Dode, L. A. Species novae Castaneae generis.
      (Ex: Bull. Soc. Dendr. France [1908], pp. 140-159.)
                                                     X (1911/12) pp. 239-243
- Species novae generis Juglandis. II.
      (Ex: Bull. Soc. Dendr. France [1909], pp. 22-50.) X (1911/12) pp. 297-299
Domin, K. Einige Novitäten aus Böhmen. (Originaldiagnose.)
                                                           I (1905.) pp. 11-16
— Eine neue Alopecurus-Art aus Palästina. (Originaldiagnose.) I (1905.) pp. 4-5
- Phanerogamae novae Bohemicae. (Auszug aus den Sitzungsberichten
    der Kgl. Böhm. Akad. Wissensch.; Math.- naturw. Kl.; Prag, 1904,
                                                         I (1905) pp. 129—131
- Some new South American Species of Koeleria. (Originaldiagnosen.)
                                                          II (1906) pp. 88-94
 - Eine neue Trisetum-Art aus Persien. (Originaldiagnose.)
                                                          II (1903) pp. 30-31

    Koeleriae novae danicae a K. Domin descriptae. I.

      (Ex: Bot. Tidsskr., XXVII [1906], p. 221-224.)
                                                          IV (1907) pp. 11-12
— Zwei neue Azorella-Arten aus Südamerika. (Originaldiagnosen.)
                                                        IV (1907) pp. 296-298
- Umbelliferae novae extraeuropaeae. I. (Originaldiagnosen.)
                                                        IV (1907) pp. 298-300
- Zwei neue Potentilla-Formen. (Originaldiagnosen.).
                                                          V (1908) pp. 65-66
— Dichosciadium, Umbelliferarum generis nomen novum. (Originaldiagnosen.)
                                                       XI (1908) pp. 104-105.
- First Contribution to the Flora of Australia. (Originaldiagnosen.)
                                                     IX (1910/11) pp. 550 -553
- Koeleria Hosseana, eine neue hochtibetische Koeleria-Art. (Original-
    diagnose.)
                                                       X (1911/12) pp. 54-55
- Second Contribution to the Flora of Australia.
                                                    (Originaldiagnosen.)
                                                       X (1911/12) pp. 57-61
— Third Contributio etc. .
                                                      X (1911/12) pp. 117—120
Durand, E. et Barratte, G. Plantae novae Tripolitanae.
      (Ex: Durand et Barratte, Florae Libycae Prodromus, 1910, 330 pp.,
   XX tab.)
                                           IX (1910/11) pp. 349 – 354, 467 – 475
Dusén, P. Species novae in "Serra do Itatiaya" Brasiliae indigenae. I. II.
      (Ex: Arch. Mus. Nac. Rio de Janeiro, XIII [1903], pp. 1-120)
                                              VI (1909) pp. 220 –225, 259 –264
Eaton, A. A. Epipactis, Serapias atque Serapiastrum. Commutationes
    nomenclatoriae.
      (Ex: Proc. Biol. Soc. Washington, XXI [1908], pp. 63-68.)
                                                        VI (1908/9) pp. 40-44
Engler, A. Berichtigung betreffend Schoenodendron
                                                            VIII (1910.) p. 242
Ewart, Alfred I. Contributiones Florae Australiensis.
      (Ex. Proc. Roy. Soc. Victoria N. S. XIX, 2 [1907], pp. 33-45, pl. X-XII.)
                                                      VIII (1910) pp. 402-406

    Contributiones Florae Australiensis. II.

     (Ex: Proc. Roy. Soc. Victoria N. S., XX, 1 [1907], pp. 76–87, pl.
    IX—XIII.)

    Contributiones Florae Australiensis. III.

     (Ex: Proc. Roy. Soc. Victoria N. S., XX, 2 [1908], pp. 125-139.)
                                                      VIII (1910) pp. 409-411

    Contributiones Florae Australiensis. IV.

      (Ex: Proc. Roy. Soc. Victoria N. S., XXI, 2 [1909], pp. 540-549,
    pl. XXX—XXXIII.) .
                                                      VIII (1910) pp. 411—413

    Contributiones Florae Australiensis. V.

     (Ex: Proc. R. Soc. Victoria, N. S. XXII, pt. 1 [1909], pp. 6-28,
                                                      IX (1910/11) pp. 63-67
   pl. III—X.)

    Contributiones Florae Australiensis VI.

     (Ex: Proc. R. Soc. Victoria, N. S. XXII, pt. 1 [1909], pp. 91-99.
   pl. XXI—XXVI.) .
                                                    IX (1910/11) pp. 134-135
```

Ewart, Alfred J. Contributiones Florae Australiensis. VII. (Ex: Proc. R. Soc. Victoria, N. S. XXII, pt. 2 [1910], pp. 315-329,
pl. LVI—LX.)
Fedde, F. Species novae generis Eschscholtziae.  (Aus: Notizblatt d. Kgl. Bot. Gart. Mus. Berlin n. 35, 1904.) I (1905) p. 17
<ul> <li>Papaveraceae novae ex Herbario Boissier et Barbey-Boissier.</li> <li>(Aus: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. V. [1905]. pp. 165-171, 445-448.)</li> </ul>
I (1905) pp. 29-31, 44-\$ Pflanzen, die in den Bänden I-VI (1900-1905) der Acta Horti Botanici
Jurjevensis neu beschrieben wurden II (1906) pp. 134-138 - Eschscholtziae generis species novae. I. II. III. IV. V. (Originaldiagnosen.)
II (1906) pp. 145–146 III (1906 7) pp. 24–25, 75–76, 105, 183–185
<ul> <li>Neues aus: K. W. von Dalla Torre und Ludwig Graf von Sarnthein, Flora von Tirol, Vorarlberg und Liechtenstein, VI. Band, 1. Teil (1906)</li> </ul>
III (1906/7) pp. 137—143
<ul> <li>Species novae e "Plantae novae vel minus cognitae ex herbario Horti Thenensis" editis a E. de Wildeman. Livraison 1—5 (1904—1905.)</li> </ul>
III 1906,7) pp. 161–166 — Plantae anno 1905 in "Botanical Magazin" denuo descriptae.
III (1906/7) pp. 185-190 — Neue Formen von Glaucium aus Nord- und Westpersien. (Aus den
Herbaren Haussknecht und Bornmüller.) (Originaldiagnosen.) III (1907/7) p. 215
— Species novae in "Fruticetum Vilmorianum. Catalogus primarius. 1904"
descriptae. (Cum 5 iconibus originalibus Fruticeti Vilmoriani.)  III (1906/07) pp. 226—232
<ul> <li>Dendromeconis generis species novae. (Originaldiagnosen.)</li> <li>III (1906/07) pp. 245—246</li> </ul>
<ul> <li>Hesperomeconis generis duae species novae Californicae. (Original-diagnosen.)</li> <li></li></ul>
- Meconellae generis species nova (M. kakoethes) Californiae australis.
(Originaldiagnose.)
V, no. 1201—1600 (1905). 170 pp III (1906)07) pp. 388—39 IV (1907) pp. 8—1
<ul> <li>Species novae in Gardeners' Chronicle, 3. ser., XXXVII (1905), descriptae</li> <li>IV (1907) pp. 120-126</li> </ul>
— Species novae in Gardeners' Chronicle, 3. ser., XXXVIII (1905), descriptae
— Species novae in Gardeners' Chronicle, 3. ser., XXXIX (1906), descriptae
V (1907) pp. 36337  — Plantae anno 1906 in "Botanical Magazine" denuo descriptae
IV (1907) pp. 167—169  — Species novae in Gardeners' Chronicle, 3. ser., XL. (1906), descriptae
V (1908) pp. 2— — Plantae anno 1907 in "Botanical Magazine" denuo descriptae
V (1908) pp. 77–8  — Species novae ex "Hookers Icones Plantarum". Vol. XXIX part I (1906),
tab. 2801—2825 V (1908) pp. 260—27 — Species novae ex "Hookers I cones Plantarum". Vol. XXIX part. II (1907),
tab. 2826—2850 V (1908) pp. 339—346
— Cactaceae atpue aliae succulentes novae. I. II. III. IV. V. VI. (Ex: Monatsschrift für Kakteenkunde, XVII [1907], pp. 129—192;
XVIII [1908], pp. 1—64, 65—192. XIX [1909], pp. 1—96, 97—102.) VI (1908/09) pp. 88—93, 130—134, 294—302
VIII (1910) pp. 224 - 226, 236 - 242, 427 - 434 - Species novae in Gardeners' Chronicle, 3. ser., XLI (1907), descriptae
VI 1908/09) pp. 317—320 — Species novae in Gardeners' Chronicle, 3. ser., XLII (1907), descriptae
VI (1908/09) pp. 355—35

Fedde. 9

reduc.
Fedde, F. Species novae ex ,,CR. Acad. Sci. Paris, CXLII, CXLIII, 1906", compilatae VI (1908/09) pp. 378—380
compilatae VI (1908/09) pp. 378—380  Neue Arten aus den "Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft", 1906 VI (1908/09) pp. 335—339
<ul> <li>Vier neue Formen von Papaver nudicaule aus dem pazifischen Gebiete.</li> <li>(Originaldiagnosen.)</li> <li> VII (1909) pp. 255—257</li> </ul>
- Species novae ex: Bulletin de l'Association Pyrénéenne pour l'échange
des plantes.  1. (XIV [1903/04], 1904, Quimper.) VII (1909) pp. 345—349  II. (XV [1904/05], 1905, Quimper.) VIII (1910) pp. 32—34  III. (XVI [1905/06], 1906, Quimper.) , , , , , p. 157
IV. (XVII [1906/07], 1907, Quimper.) , pp. 211—214 V. (XVIII [1907/08], 1908, Quimper.) , , pp. 322—323
VI. (XIX [1908/09], 1909, Quimper.) , , pp. 370–371  Novae species in , Icones Bogorienses." I. (Ex: Ic. Bogor., III, 2 [1907], pl. CCXXVI—CCL.) VII (1909) pp. 181–186
Plantae anno 1908 in "Botanical Magazine" denuo descriptae VII (1909) pp. 173—178
— Neue Arten aus den "Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen
Gesellschaft" 1907 VII (1909 pp. 395—362 — Goldmania Greenman nomen est delendum. (Originalmitteilung.) VIII (1910) p. 325
- Noch einmal Goldmania. (Originalmitteilung.) VIII (1910) p. 353
<ul> <li>Eine neue Corydalis (C. Mildbraedii) aus Deutsch-Ostafrika. (Original-diagnose.)</li> <li>VIII (1910) pp. 512-513</li> </ul>
<ul> <li>Papaver Schinzianum, ein neuer Mohn unbekannter Herkunft aus der Gruppe der Pilosa. (Originaldiagnose.)</li> <li>VIII (1910) p. 561</li> </ul>
<ul> <li>Neue Arten aus den "Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft" 1908 VIII (1910) pp. 342-348</li> </ul>
<ul> <li>Plantae anno 1909 in "Botanical Magazine" denuo descriptae VIII (1910) pp. 334-337</li> </ul>
<ul> <li>Species novae ex "CR. Acad. Sci. Paris, CXLIV, CXLV, 1907" compilatae VIII (1910) pp. 317—319</li> </ul>
- Neues aus: Leonhard Schultze, Aus Namaland und Kalahari. (Jena, G. Fischer, 1907. pp. 692-705.) VIII (1910) pp. 148-150
<ul> <li>Neue Namen in den Bulletins von 1909 des Bureau of Plant Industry,</li> <li>U. S. Dep. of Agriculture zu Washington.</li> <li>(Ex: U. S. Dep. of Agric. — Bur. of Pl. Ind. — Bull. no. 176 [1910].</li> </ul>
pp. 30, 31.) VIII (1910) pp. 488-489  — Species novae ex: N. A. Busch, B. B. Marcowicz, G. N. Woronow,
Schedae ad Floram caucasicam exsiccatam.         I. II. (1905), III (1906) VIII (1910) p. 184
- Species novae in Gardeners' Chronicle, 3. ser., XLIII (1908) descriptae VIII (1910) pp. 365-368
- Species novae in Gardeners' Chronicle, 3. ser., XLIV (1908) descriptae VIII (1910) pp. 379-380
<ul> <li>Species novae in Gardeners' Chronicle, 3. ser., XLV (1909) descriptae</li> <li>VIII (1910) pp. 381—383</li> </ul>
<ul> <li>Species novae in Gardeners' Chronicle, 3. ser., XLVI (1909) descriptae</li> <li>VIII (1910) pp. 383 – 385</li> </ul>
<ul> <li>Species novae ex: "CR. Acad. Sci. Paris, CXLVI, CXLVII, 1908"</li> <li>IX (1910/11) pp. 535—540</li> </ul>
<ul> <li>Novae species in "Icones Bogorienses". II.</li> <li>(Ex: Ic. Bogor., III, 3 [1908], tab. CCLI—CCLXXV.)</li> <li>IX (1910/11) pp. 304—314</li> </ul>
Neue Arten aus der Verwandtschaft der Corydalis aurea Willd. von Nord-Amerika. I. II. IV. (Originaldiagnosen.)  X (1911/12) pp. 311—315, 364—365, 379—380, 417—419, 479—480

Fedde, F. Corvdalis Allenii, eine neue Art aus der Verwandtschaft der Corvdalis Scouleri, von Washington. (Originaldiagn.) X (1911/12) pp. 478-479 Corydalis Redowskii, eine neue Art aus der Verwandtschaft von C. paeoniaefolia aus Ost-Sibirien. (Originaldiagn.) X (1911/12) pp. 508-509 - Corydalis Onobrychis, eine neue Art aus Kaschmir, aus der Verwandtschaft der C. astragalina. (Originaldiagnose.) . X (1911/12) p. 565 - Species novae ex: "C.-R. Acad. Sci. Paris, CXLVIII, CXLIX, 1909" X (1911/12) pp. 217-218 Fedtschenko, Boris. Nouvelles espèces de la flore duTurkestan (Auszug aus: Bull. Jard. Imp. Bot. St. Pétersbourg. V [1905], pp. 41-44.) III (1906/07) pp. 55-56 - Species novae in Turkestania detectae. (Ex: Journ. Bot. Sect. Bot. Soc. Imp. Nat. St. Pétersbourg, [1906], IV (1907) pp. 318-320 - Saussurea turgaiensis B. Fedtsch., nov. spec. (Originaldiagnose.) VIII (1910) p. 497 - Echinops tschimganicus B. Fedtsch., nov. spec. (Originaldiagnose.) IX (1910/11) p. 122 - Eine neue Cousinia (C. mindshelkensis), aus dem westlichen Tianschan. (Originaldiagnose.) X (1911/12) p. 164 - Linaria kulabensis B. Fedtsch., eine neue Art aus Buchara. (Original-X (1911/12) p. 380 diagnose.) X (1911/12) p. 464 - Crucianella bucharica spec. nov. (Originaldiagnose.) Fedtschenko, Olga et Boris. Iridaceae novae in Turkestania Rossica (Aus: Bull. Jard. Imp. Bot. St. Pétersbourg, V [1905], no. 4.) IV (1907) pp. 95-96 Figert, E. Neue Rubi in Schlesien. (Originaldiagn.) VI (1908/09) pp. 332-334 Fischer, Ed. Diagnosen einiger Fungi hypogaei aus Californien. (Zum Teil Originaldiagnosen.) VII (1909) pp. 134-193 Focke, W. O. Tragopogon praecox W. O. Focke (in Abh. Naturw. Ver. Bremen XVIII [1904], p. 188.) . I (1905) p. 48 - Zwei neu entstandene Tragopogon-Arten. (Ex: W. O. Focke, Betrachtungen und Erfahrungen über Variation und Artenbildung. in: Abh. Nat. Ver. Bremen XIX [1907], p. 68-87.) IV (1907) pp. 97-98 - Rubi novi Americae australis et centralis. I. (Originaldiagnosen.) IX (1910/11) pp. 235—237 Fomin, A. Plantae novae Caucasi. (Aus: Mon. Jard. Bot. Tiflis, Livr. 1 [1905], pp. 5—19.) VI (1908/09.) pp. 33—34 - Campanulacearum species atque varietates novae Caucasicae a Fomin in Fl. Cauc. crit. descriptae. (Ex: Fl. Cauc. crit., IV, 6 [1904], pp. 1-48, [1905], 49-80.) IX (1910/11) pp. 263—266 Forrest, George. Gentianaceae novae Orienti-Tibeticae atque Austrooccidentali-Chinenses. (Ex: Not. R. Bot. Gard. Edinburgh, XVII [April 1907], pp. 69-81, pl. XII—XIX.) VIII (1910) pp. 152-157 Fries, Rob. Anonaceae Regnellianae atque Riedelianae Austro-americanae novae. (Aus: Arkiv för Botanik IV, no. 19 [1905] und V, no. 4 [1905].) II (1906) pp. 189-192 - Zur Kenntnis der Phanerogamenflora der Grenzgebiete zwischen Bolivia und Argentinien. I. II. (Auszug aus: Arkiv för Botanik, V. (1905) no. 13.) III (1906/07) pp. 237-240, 251-254 - Neue Arten aus: Rob. E. Fries, Zur Kenntnis der alpinen Flora im nördlichen Argentinien. l. II. III. IV. V. (Ex: Nova Acta R. Soc. Sci. Upsaliensis, Ser. 4, Vol. I, no. 1 [1905].)
III (1906/07) pp. 295-302, 357-367

IV (1907) pp. 20-24, 33-42, 86-94

```
Fries, Rob. Zur Kenntnis der Phanerogamenflora der Grenzgebiete
    zwischen Bolivia und Argentinien. III. IV.
      (Auszug aus: Arkiv för Botanik, [1906]. no. 2 Vl. 16 pp)
                                            IV (1907) pp. 104-108, 202-207
- Scopariae generis species novae.
      (Ex: Arkiv för Botanik, VI, [1906], no. 9.) . IV (1907) pp. 116—120
- Zur Kenntnis der Phanerogamenflora der Grenzgebiete zwischen Bolivia
    und Argentinien. V.
      (Ex: Arkiv för Bot., VIII [1908], no. 8, p. 51.) VI (1908/09) pp. 204-209

    Sterculiaceae novae americanae.

      (Ex: Kgl. Svenska Vetensk. Akad. Handl., XLII. no. 12 [1907],
                                                   VIII (1910) pp. 372-379
    pp. 5-26.).
- Tiliaceae novae americanae.
      (Ex: Kgl. Svenska Vetensk. Akad. Handl., XLII. no. 12 [1907],
    pp. 62-64.) . . . . . . . . . . . VIII (1910) pp. 385-386

    Malvaceae novae americanae.

      (Ex: Kgl. Svenska Vetensk. Akad. Handl., XLII, no. 12 [1907],
                                 . VIII (1910) pp. 386—398, 497—500
    pp. 29-61.).

    Bombaceae novae americanae.

      (Ex: Kgl. Svenska Vetensk. Akad. Handl., XLII, no. 12 [1907],
                          . . . . . .
                                                          VIII (1910) p. 464
    pp. 27-28) .
- Eine neue Wissadula-Art aus Paraguay. (Originaldiagnose.)
                                                         IX (1910/11) p. 211
- Pseudabutilon, genus novum Malvacearum.
      (Ex: Kgl. Svenska Vetensk, Akad, Handl., XLIII [1908], no. 4.)
                                                  IX (1910/11) pp. 475-481

    Wissadula genus speciebus novis auctum. I. II.
    (Ex: Kgl. Svenska Vetensk. Akad. Handl., XLIII. [1908], no. 4.)

                                         IX (1910/11) pp. 486-492, 504-513
Fritsch, K. Neue Pflanzen aus Steiermark.
      (Ex: Mitt. Naturw. Ver. Steiermark XLIII, [1906/07], p. 409, XLIV
    [1907/08], pp. 292—293.) .
                                         . VI (1908/09) pp. 339—340
Gamble, J. S. Oreiostachys. genus novum.
      (Ex: Versl. Gew. Verg. Wis-en Nat. Afd. Kon. Ak. Wet. Anisterdam,
    [1908], p. 657; Proc. Meeting [1908], p. 685.) VI (1908/09) pp. 328-329
Gandoger, Michel. Eriogonum, Polygonacearum genus, speciebus varie-
    tatibusque novis auctum.
      (Ex: Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique XLII [1906], pp. 183-200.)
                                                       V (1908) pp. 169-179
Gave, P. Novae species Florae Sabaudiae. (Originaldiagnosen.)
                                                      V (1908) pp. 195-196
— Carex leporina L. var. Gavei Husnot, nov. var. (Originaldiagn.)
                                                          X (1911/12) p. 248
- Cyclamen europaeum L. var. parvifolium Gave, var. nov. (Originaldiagn.)
                                                          X (1911/12) p. 476
Gilg, Ernst. Beiträge zur Kenntnis der Gentianaceae III. Gentianaceae
    andinae. (Originaldiagnosen.) . . . . .
                                                       II (1906) pp. 33-56
Grecescu, Dem. Plantae rariores Romaniae hucusque incognitae.
      (Ex: Grecescu, Suppl. Conspect. Flor. Roman. [1909], Bukarest.)
                                                    X (1911/12) pp. 214-217
Greene, E. L. et Rose, J. N. Wislizeniae generis Capparidacearum species
    novae ab E. L. Greene et J. N. Rose descriptae.
      (Ex: Proc. Biol. Soc. Washington, XIX [1906], pp. 127 to. 132.)
                                                   III (1906/07) pp. 166-168
Greene, E. L. Rosaceae novae Columbiae Britannicae.
      (Ex: Ottawa Naturalist, XVII [1905], pp 215—216.)
                                                       . IV (1907) p. 208
```

Rhus glabra revisa et in species novas atque affines divisa.
 (Ex: Proc. Washington Ac. Sci., VIII [1906), pp. 167—196.)

IV (1907) pp. 311—316, 357—363

Greene, E. L. Novitates Boreali-Americanae. I. II. (Originaldiagnosen.) V (1908) pp. 45–46, 241–244
- Argemone pleiacantha Greene. (Originaldiagnose.)  VI 1908/09) p. 161
— Antennariae novae canadenses. (Ex: Ottawa Nat., XVII [1904], pp. 201—203, XVIII [1904], pp. 37—39.)
VI (1908/09) pp. 162-164
<ul> <li>Novitates Boreali-Americanae. III. Species novae generis Aconiti.</li> <li>(Originaldiagnosen.)</li> <li>VII (1909) pp. 1-6</li> </ul>
<ul> <li>Novitates Boreali-Americaniae IV. (Originaldiagnosen.)</li> <li>VII (1909) pp. 195—197</li> </ul>
- Novitates Boreali-Americanae. V. Species novae generis Thalictri.
(Originaldiagnosen.) VII (1909) pp. 252-255 Grüning, G. Eine verkannte Cryptandra aus Australien. (Originaldiagn.)
X (1911/12) p. 384 Hackel, Eduard. Gramineae novae. I. II. (Originaldiagnose) II (1906.) pp. 69 – 72
III (1906 07) pp. 241—245 — Gramineae novae Argentiniae. I.
(Ex: T. Stuckert. Contribución al conocimiento de las Gramináceas
Argentinas. — An. Mus. Nac. Buenos Aires, XI [1904], pp. 43-161.)
IV (1907) pp. 271—280
<ul> <li>Gramineae novae Argentiniae. II.</li> <li>(Ex: T. Stuckert. Segunda Contribución al conocimiento de las</li> </ul>
Gramináceas Argentinas. — An. Mus. Nac. Buenos Aires, XIII [1906],
pp. 409 –555.) IV (1907) pp. 305 –310, 340 – 348
Gramina Cubensia nova.
(Ex: Primer Informe Anual de la Estacion Agronomica de Cuba,
[1906], June I, pp. 409—412.) IV (1907) pp. 112—114
— Gramineae novae. III. IV. V. (Originaldiagnosen.)
V (1908) pp. 1—3, 333—335 VI (1908/09) pp. 153—161
- Gramineae novae Turkestanicae.
(Ex. Act. Hort. Petrop., XXVI [1906], pp. 55-60.) VI (1908/09) pp. 51-54
— Gramineae novae a. M. D. W. Jeffreys apud Bulawayo Rhodesiae collectae.
(Ex: Proc. Rhodesia Scientific Association, VII, part 2 [1908], pp. 65
—70.) VI (1908/09) pp. 321—324
- Gramineae in E. Hassler. Novitates paraguarienses. I.
VI (1908/09) pp. 341—346 — Gramineae novae, VI. (Originaldiagnosen.) . VII (1909) pp. 311—327
- Gramineae novae, vi. (Originaldiagnosen.) (cf. Herzog!)
VII (1909) pp. 49-50
- Gramineae Paraguarienses. II. III. (Originaldiagnosen.) (cf. Hassler!)
VII (1909) pp. 369—374
VIII (1910) pp. 46-47 - Gramineae novae, VII. VIII. (Originaldiagnosen.) VIII (1910) pp. 513-523
X (1911/12) pp. 165—174
Hagström, O. Potamogetonaceae asiaticae.
(Nach: Bot. Not. 1905, pp. 141–142.) II (1906) pp. 110–111
<ul> <li>Potamogetones novi.</li> <li>(Bot. Not., 1908, pp. 97-108.)</li> <li>VIII (1910) pp. 145-148</li> </ul>
Hallier, Hans. Neue indochinesische Dikotyledonen. (Originaldiagnosen.)
II (1906) pp. 59-63  Hamet, Raymond. Nouveautés asiatiques du genre Sedum. (Original-
diagnosen.) VIII (1910) nn 24–28
diagnosen.) VIII (1910) pp. 24—28  — Sur deux Sedum nouveaux. (Originaldiagnosen.) VIII (1910) pp. 142—144
Note sur deux especes nouvelles de Sedum. (Originaldiagnosen.)
VIII (1910) pp. 263—266
— Descriptions et étude des affinités de 3 Sedum nouveaux. (Original-

```
Hamet, Raymond. Sedum nouveaux de l'Herbier du Muséum d'histoire
    naturelle de Paris. (Ex: Bulletin du Muséum d'histoire naturelle de
    Paris, 1909, no 7, pp. 488-492.)
                                                 . IX (1910/11) pp. 41—45
v. Handel-Mazetti, H. Neues aus den Pontischen Randgebirgen im Sand-
    schak Trapezunt. I. II.
      (Ex: Ann. Naturh. Hofm. Wien, XXIII [1909], pp. 141–209.)
                                           X (1911/12) pp. 304—310, 397—402
Harms, H. Bolusanthus Harms, novum genus e tribu Sophorearum.
      (Originaldiagnosen.)
                                                        II (1906) pp. 14-16
— Eine neue Schettlera (Sch. Sarasinorum) aus Celebes. (Originaldiagnose.)
                                                      III (1906,07) pp. 23-24
- Eine neue Art der Gattung Macrolobium Schreb. (M. stenosiphon) aus
   Columbia. (Originaldiagnose.) .
                                                     III (1906/07) pp. 51-53
- Einige neue Aeschynomene-Arten aus dem tropischen Afrika. (Original-
                                                     VIII (1910) pp. 355-357
   diagnosen.)
- Über die Verbreitung der Leguminosen-Gattung Mastersia. (Original-
   arbeit.) .
                                                  IX (1910/11) pp. 367—369
- Eine neue brasilianische Leguminose, Poiretia longipes Harms nov. spec.
   (Originaldiagnose.) . . .
                                                  IX (1910/11) pp. 439-440
- Einige neue Leguminosen aus Neu-Caledonien. (Originaldiagnosen.)
                                                    X (1911/12) pp. 127—133

    Berichtigung [betreffend Desmodium].

                                                         X (1911/12) p. 176
Hassler, E. Ex herbario Hasseriano: Novitates paraguarienses. l. II. III.
                                             . VI (1908.09) pp. 341—352
VII (1909) pp. 69—78, 369—383
. VII (1909) pp. 356—359
   (Originaldiagnosen.) . . . . . .
— Compositae Bolivienses. (cf. Herzog!)
- Ex herbario Hassleriano: Novitates paraguarienses. IV. V. VI. VII. VIII.
    (Originaldiagnosen.)
                  VIII (1910) pp. 34-47, 66-73, 113-132, 204-210, 552-560
- Noch einmal Sida confusa Hassler. . . .
                                                    VIII (1910) pp. 324—325
- Malvaceae austro-americanae. (Originaldiagn.) VIII (1910) pp. 28-31 c. ic.

    Ex herbario Hassleriano: Novitates paraguarienses. IX. X. XI. XII. XIII.

    (Originaldiagnosen.)
                 IX (1910/11) pp. 1—16, 49—63, 115—121, 145—160, 193—197
— Ex herbario Hassleriano: Novitates paraguarienses. XIV. (Originaldiagn.)
                                                    X (1911/12) pp. 343—348
Hayata, B. Duae Compositae novae Formosanae.
      (Aus: Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo XIII n. 8 [1904], pp. 9-10, 25-26.)
                                                               I (1905) p. 21
-- Euphorbiaceae novae Japonicae.
      (Auszug aus "Revisio Euphorbiacearum et Buxacearum Japonicarum"
   in Journ. Coll. Sci. Tokyo XX, 3 [1904], pp. 1-92.) 1 (1905) pp. 42-44, 56-58
- Species novae in regionibus alpinis Formosae insulae indigenae.
      (Ex: B. Hayata, Contributions to the Alpine Flora of Formosa I. —
    Tokyo Bot. Mag., XX [1906], pp. 13-22.) .
                                                    VI (1908<sub>1</sub>09) pp. 25—28
Hayek, August v. Plantae novae Stiriacae. I.
      (Auszug der neuen Diagnosen aus den "Schedae ad floram stiriacam
    exsiccatam".)
                                                      II (1906) pp. 142—144

    Verbenaceae novae herbarii Vindobonensis. I. II. III. (Originaldiagnosen).

                                               II (1906) pp. 86-88, 161-164
                                                    III (1906,07) pp. 273—274

    Plantae novae stiriacae II.

   . . . . IV (1907) pp. 371—373

    Plantae novae Stiriacae. III.

      Ex "Schedae ad Floram Stiriacam exsiccatam" Lief. 13, 14 [1908]
    sched. no. 601 -700.) .
                                                . VI (1908,09) pp. 173-174
- Neue Arten aus A. v. Hayek, Flora von Steiermark. I. II.
      (I [1908], pp. 1–80, 81–160.) VI (1908/09) pp. 184–186, 241–244
- Neue Arten aus A. v. Hayek, Flora von Steiermark. III.
      (I, Heft 3 [1908]. pp. 161-240; Heft 4 [1908], pp. 241-320; Heft 5
    [1908], pp. 321—400.
```

. . VII (1909) pp. 32—37

```
Havek, August v. Neue Arten aus A. v. Hayek, Flora von Steiermark. IV. V. VI.
      Band I, Heft 6 (1908), pp. 401-480 . . .
                                                      VIII (1910) pp. 319-322
VIII (1910) pp. 368-370
Band I, Heit 7 (1909), pp. 481–500 . . . VIII (1910) pp. 368–370
Band I, Heit 8 (1909), pp. 561–640 . . . VIII (1910) pp. 434–436

— Neue Arten aus A. v. Hayek, Flora von Steiermark. VII. VIII.
Band I, Heft 9 (1909), pp. 641—720 . . IX (1910/11) pp. 382—384
Band I, Heft 10 (1909), pp. 721—800 . . IX (1910/11) pp. 498—504
Heimerl, A. Plantae novae Wettsteinianae.
      (Ex: Denkschr. Math.-Naturw. Kl. Ak. Wiss. Wien, LXXIX [1508],
                         . . . . . . VI (1908/09) pp. 79—87
    pp. 227—245.)

    Xyridaceae novae.

      (Ex: Ann. Hofmus. Wien, XXI (1906), pp. 61-71, tab. IV.)
                                                     VI (1908/09) pp. 209—213
Heller, A. A. Plantae novae Californiae mediae occidentalis.
      (Ex: Bull. South. Caiif. Ac. Sci. Los Angeles, II (1903), pp. 65-70.)
                                                         IV (1907) pp. 60-63
Hemsley, W. Botting. Triuridaceae novae.
      (Ex; Ann. of Bot., XXI [1907, pp. 71-77, pl. IX, X.) VI (1908/09) pp. 16-17
Herter, Wilhelm. Lycopodium Haeckelii nov. spec. (Originaldiagnose.)
                                                                V (1908) p. 22
- Ceropegia Meyeri Arthuri nov. spec. (Originaldiagnose.)
                                                       VII (1909) pp. 232-233
Herzog, Th. Siphonogamae novae Bolivienses in itinere per Boliviam
    orientalem ab auctore lectae. (Originaldiagnosen.) VII (1909) pp. 49-69
- Nachträge zu Siphonogamae novae Bolivienses. (Originaldiagnosen.)
                                                       VII (1909) pp. 354-359
Hicken, Cristòbal M. Filices novae Argentinae.
      (An. Soc. Cient. Argent., LXII [1906], pp. 161–188, 8 tab.)
                                                        VII (1909) pp. 169—173
- Filices novae Argentinae.
      (Ex: Trab. Mus. Farmac. Buenos Aires, no. 19, 1907.)
                                                       VIII (1910) pp. 275-276
Hieronymus, G. Species novae Selaginellarum philippinensium. (Original-
Hill, Arthur W. Peperoniae generis species novae geophilae.
      (Ex: Ann. of Bot. XXI [1907], pp. 139-160, pl. XV.)
                                                           (1908) pp. 350-352
Hitchcock, A. S. Agrostis genus novis speciebus Americae reptentrionalis
    auctum.
       (Ex: U. S. Departement of Agriculture, Bureau of Plant Industry-
                                                         V (1908) pp. 356-359
    Bull. no. 68, [1905], 68 pp.)
- Andropogon fasciculatum (L.) Thellung. (Originalarbeit.)
                                                      X (1911/12) pp. 461-464
Hochreutiner, B. P. G. Neobrittonia, genus novum Malvacearum edidit
    B. P. G. Hochreutiner.
      (Auszug aus: Ann. Conserv. et Jard. bot. Genève, IX [1905],
                                                           III (1906/07) p. 90
    pp. 184—185, avec une pianche.)

    Malvaceae novae.

      (Ex: Ann. Conserv. et Jard. bot. Genève, X [1906], pp. 15 à 23.)
                                                      III (1906/07) pp. 169—173
- Species novae Catalogi Bogoriensis novi.
      (Bull. Inst. Bot. Buitenzorg, XIX [1904], pp. 1-48.) V (1908) pp. 347-349
- Species novae Catalogi Bogoriensis novi. II.
      (Ex. Bull. Inst. Bot. Buitenzorg, XXII [1905], pp. 1-132.) Cf. Rep.,
    V (1908), pp. 347—349.) .
                                                         VII (1909) pp. 9-16
Hollick, Arthur. Species novae Pleistocaeniae Marylandicae.
       (Ex: Gontr. New-York Bot. Gard. no. 85, in: Maryland Geolog. Suro.
```

VIII (1910) pp. 199—203

```
Holm, Th. New plants from Arctic North America. (Originaldiagnosen.)
                                                 III (1906/07) pp. 337—338
- Carices novae Americae Boreali-occidentalis.
      (Ex: Holm, Studies in the Cyperaceae, XXIV, in: Amer. Journ. Sci.
    XX [1905], pp. 301-306.)
                                     . . . IV (1907) pp. 50—54
Holmboe, Jens. Einige neue Formen von Anemone Hepatica L. aus der
    Umgegend von Christiania.
      (Ex: Nyt Mag. J. Naturw., XLIV [1906], pp. 357-377, Taf. XV.)
                                                    IV (1907) pp. 155—159
Hooker, J. D. Impatientis species novae. I. II.
      (Ex: Hooker's Icon. Pl., [1908], tab. 2851-2875.)
                                          VIII (1910) pp. 172—181, 338—342
Hosseus, C. C. Leguminosae novae siamenses. (Originaldiagnosen.)
- Eine neue Gésneraceae (Didymocarpus aureo glaudulosa) C. B. Clarke,
IV (1907) pp. 291—292
                                                 IX (1910/11) pp. 465-466
    diagnose.)
- Einige neue Arten meiner Siam-Expedition. (Originaldiagnosen.)
                                                    X (1911/12) pp. 61-64
- Phyllanthodendron (Uranthera) siamense (Pax et K. Hoffm.) Hosseus
    nom. nov. (Originaldiagnose.) . . . . . . . . . . . . X (1911/12) p. 116
House, H. D. Ipomoea genus speciebus novis Americae septentrionalis
    auctum.
      (Ex: Ann. N. Y. Ac. Sci., XVIII [1908], pp. 181-263.)
                                                   VIII (1910) pp. 228—236
Huber, J. Heveae generis species ab J. Huber nuper descriptae.
      (Bol. Mus. Goeldi, Pará, IV [1905], pp. 620-651.) III (1906/07) pp. 385-386
 - Neue Arten von Vitex aus dem Amazonasgebiet.
      (Ex: Bol. do Mus. Goeldi, V [1908], pp. 209-222.) V (1908) pp. 307-308
Husnot, T. Nova ex: T. Husnot, Cyépracées 1906.
      (Descriptions et figures des Cypèracèes de France, Suisse et
                                                  VII (1909) pp. 202—210
    Belgique)
lanchen, E. Nomina nova.
      (Ex: Mitt. Naturw. Ver. Univ. Wien, V [1907], pp. 83-100, 105-107,
    108-112.) . . . . . . . . . . . . . . . . VIII (1910) p. 257
Janczewski, Eduardus. Species novae generis Ribes. I. II. III.
      (Ex: Bull. intern. Acad. Sci. Cracovie, Cl. Sci. math. et nat., Déc. 1905,
    pp. 755-764; Janv. 1906, pp. 1-13, Mai 1906, pp. 280-293.)
                                                  llI (1906/07) pp. 381—384
IV (1907) pp. 209—212
                                                 VI (1908/09) pp. 216—220
- Species novae generis Ribes. IV.
(Ex: Bull. Ac. Sci. Cracovie, 1909, pp. 60—75.) Jennings, Otto E. Plantae novae Pennsylvanicae.
                                                   VII (1909) pp. 333—335
                                                 VI (1908,09) pp. 202-204
      (Ex: Ann. Carnegie Mus., III [1906], no. 4.)
Jepson, W. J. Godetiae novae Americae borealis.
      (Ex: A Synopsis of the North American Godetias. [Univ. of Calif.
    Publ., Bot., II (1907), pp. 319-354, pl. 29.]) . VI (1908/09) pp. 104-110
Jones, W. W. Zexmeniae generis quattuor species novae Mexicanae et
    Bolivianae.
      (Aus: W. W. Jones, A revision of the genus Zexmenia, in: Proc.
    Amer. Ac. Arts and Sci. Boston XLI [1905], pp. 143-167.)
                                                     1 (1905( pp. 131—132
Jumelle, H. et Perrier de la Bathie, H. Plantes nouvelles du Nord-
    ouest de Madagascar.
      (Ann. Mus. Col. Marseille, XV [1907], pp. 363—405.)
```

```
lumelle, H. et Perrier de la Bathie, H. Asciepiadaceae novaeboreali-
    occidentali-madagascarienses.
      (Ex: Ann. Mus. colon. Marseille, XVI [1908], pp. 131—239, pl. I—V.)
                                                 IX (1910/11) pp. 294-303

    Clusiaceae novae madagascarienses.

      (Ex: Ann. Sci. nat. Paris, Bot. 9 sér., XI, pp. 255-285.)
                                                 IX (1910/11) pp. 569-571
Kinscher, H. Einige Rubus-Formen, (Originaldiagnosen.)
                                                 III (1906/07) pp. 209—211
- Aliquot Rubi novi. (Originaldiagnosen.) VII (1909) pp. 78-82, 341-344
Knauf. Cluvtia Rustii.
      (Aus: Knauf, Die geographische Verbreitung der Gattung Cluytia.
    I (1905) p. 58
Knuth, R. Eine neue interessante Androsace (A. Gustavi) aus Ost-Tibet.
    III 1906/07) p. 84
— Primula Bonatii nov. spec. (Originaldiagnose.)
                                                    . VIII (1910) p. 398
Köhne, E. Ligustrum sectio nova lbota speciebus quinqe novis inclusis.
     (Auszug aus der Ascheron-Festschrift [1904], pp. 189–204.)
                                                 I (1905) pp. 8—11, 18—19
- Neues von Forsythia.
     (Ex: Gartenflora LV (1906), pp. 176—180, 198—207, 226—232.)
                                                    ÍV (1907) pp. 164-166
— Ein neuer Prunus (P. Paracerasus) aus Japan. (Originaldiagnose.)
                                                          VII (1909) p. 113

    Svringa Sweginzowii Köhne et Lingelsheim nov, spec. (Originaldiagn.)

                                                          VIII (1910) p. 9
— Eine neue Cuphea von den Kleinen Antillen. (Originaldiagnose.)
                                                    VIII (1910) pp. 16-17
— Zwei neue Rosen aus Kurdistan und aus Ostasien. (Originaldiagnosen.)
                                                     VIII (1910) pp. 21-22
- Zwei Varietäten von Prunus japonica Thunb. (Originaldiagnose.)
                                                          VIII (1910) p. 23
- Lonicera Korolkowi Stapf var. aurora Köhne, nov. var. (Originaldiagn.)
                                                    VIII (1910) pp. 31—32
- Evonymus semiexserta Köhne, nov. spec. (Originaldiagnose.)
                                                          VIII (1910) p. 54
— Ulmus pinnato-ramosa Dieck Cat. 1895 (nom. nud.) (Originaldiagnose.)
                                                          VIII (1910) p. 74
- Prunus Sweginzowii Köhne, nov. spec. (Chamaeamygdalus) (Original-
                                                         VIII (1910) p. 62
   diagnose.) .
                 - Ex Herbario Hassleriano: Neue Lythraceen aus Paraguay und dem Gran
    Chaco. I. II. (Originaldiagnosen.) . VIII (1910) pp. 165—167, 196—199
- Pruni subgeneris Padi species novae describuntur ab E. Köhne. (Ori-
   ginaldiagnosen.) . . .
                                              . IX (1910/11) pp. 33—37
- Prunus serrulata Lindl. f. Veitchiana Köhne. (Originaldiagnose.)
                                                 IX (1910/11) pp. 122—128
— Philadelphi species ac varietates novae. (Originaldiagnosen.)
                                                  X 1911/12) pp. 126—127
- Prunus Mahaleb L. var. Hartmannii Koehne nov. var. (Originaldiagn.)
                                                       X (1911/12) p. 164
- Genus Sorbus s. str., speciebus varietatibusque novis auctum. I. II.
   (Originaldiagnosen.) . . . . X (1911/12) pp. 501—507, 513—518
— Prunus yedoënsis var. nudiflora nov. var. (Originaldiag.) X (1911/12) p. 507
Koidzumi, G. Plantae novae sachalinenses.
     (Ex: Journ. Coll. Sci. Tokyo. XXVII [1910], 124 pp., 3 pl.)
                                                 IX (1910/11) pp. 136—137
Komarow, W. L. Neue Arten aus: Komarow, Flora Manshuriae. II.
     (Act. hort. Petrop., XXV, 2 [1:07], pp. 335—853.) V (1908) pp. 272 279
```

— Species novae chinenses. (Originaldiagnosen.) . VII (1909) pp. 145—146

```
Komarow, V. L. Nova ex: Prolegomena ad Floras Chinae nec non
    Mongoliae. Fasc. I. 1908.
     (Ex: Act. hort. Petrop., XXIX [1908], pp. 1—176, cum 4 tab. et 2 mapp.)
                                                   VIII (1910) pp. 416-421
- Ex herbario Horti Botanici Petropolitani: Novitates Asiae orientalis.
   Decas prima. (Originaldiagnosen.)
                                              . IX (1910/11) pp 391—394
Koorders, S. H. Piperaceae novae Javanae.
     (Ex: Verh. Koninkl. Ak. Wet. Amsterdam, 2. Sect.. XIV, no. 4 [1908],
                                                . VII (1909) pp. 213—214
    pp. 1-75.)
                    Kränzlin, F. Orchidaceae novae Austro-americanae, plerumque Peruvianae.
                                                        1 (1905) pp. 85-92
    (Originaldiagnosen.)
 - Calceolariae generis species novae septem Centrali- et Austro-ameri-
    canae. (Originaldiagnosen.) . .
                                       . I (1905) pp. 82–85, 97–107
  Orchidaceae Weberbauerianae in republica Peruviana lectae. (Original-
                                                      I (1905) pp. 177-189
 - Eine neue Orchidaceae aus Süd-Brasilien. (Originaldiagnose.) II (1906) p. 57
- Eine neue Calceolaria aus Peru. (Originaldiagnose.)
                                                       . IV (1907) p. 353
- Orchidaceae quaedam Tibeticae. (Originaldiagnosen.) V (1908) pp. 196-200
- Eine neue Calceolaria aus Bolivia. (Originaldiagn.) V (1908) pp. 369-370
- Orchidaceae novae Bolivienses ex herbario Th. Herzog-Toricensis.
   (Originaldiagnosen.)
                                                    VI (1908/09) pp. 18—28
- Namensänderungen. [Bulbophyllum macrostachyum und Pleurothallis
                                                        VI (1908/09) p. 65
   Beyrodtiana 1
- Dendrobium Gerlandianum nov. spec. von den Philippinen. (Original-
                                                        VI (1908/09) p. 317
    diagnose.)
- Einige neue Orchidaceen. (Originaldiagnosen.)
                                                       VII (1909) pp. 38-41
- Eine neue Calanthe (C. Hosseusiana) aus Siam. (Originaldiagnose.)
                                                      VII (1909) pp. 82—83
- Ein neues Epidendrum aus Mexico. (Originaldiagnose.) VII (1909) pp. 114-115
Kränzlin, F. Zwei neue Orchideen von den Philippinen. (Originaldiagn.)
                                                      VIII (1910) pp. 97—98

    Calceolaria genus speciebus novis auctum.

     (Ex: Ann. Hofm. Wien, XXII [1907], pp. 191-196, tab. III-IV.)
                                                    VIII (1910) pp. 526—530
- Eine neue Cleisostoma-Art von den Philippinen. (Originaldiagnose.)
                                                          VIII (1910) p. 545
Krause, K. Oenotheraceae novae Austro-americanae, plerumque Peru-
    I (1905) pp. 167-173
- Novae species andinae Rutacearum. (Originaldiagn.)
                                                       II (1906) pp. 26—27
Krautter, Louis. Pentstemon genus speciebus novis auctum.
      (Ex: Contrib. Bot. Lab. Univ. Pennsylv., Ill, no. 2 [1908], pp. 93—206.)
                                                    VII (1909) pp. 329—330
Kükenthal, G. Cyperaceae novae. I. II. (Originaldiagnosen.)
                                              VIII (1910) pp. 7—8, 326—327
- Cyperaceae. (Siehe Lösener!) .
                                                         VIII (1910) p. 291
Kusnezow, N. Primulae generis species et varietates novae Caucasicae
    in Fl. Cauc. critica descriptae.
      (Ex: Fl. Cauc. crit., IV, 1 [1901], pp. 1—117.) IV (1907) pp. 159—162
— Plumbaginacearum species atque varietates novae Caucasicae a Kusnezow
    in Fl. Cauc. critica descriptae.
      (Ex: Fl. Cauc. crit., IV, 1 [1902], pp. 171-208, [1903], pp. 209-226.)
                                                       VII (1909) pp. 31—32
— Gentianacearum species atque varietates novae Caucasicae a Kusnezow
    in Fl. Cauc. critica descriptae.
      Ex: Fl. Cauc. crit., IV, 1 [1903], pp. 273-352, [1904], pp. 353-384,
```

[1905], pp. 385-411.)

. . . . . . IX (1910/11) pp. 259—262

```
Lakon. Drei Diagnosen aus Heldreichs "Yrugokal ngog ofrragir
    Χλωρίδος των Κυχλάδων νήσων Δήλου καὶ Ρηνείας...
     (Επετ. Παογασσοῦ. [1901], pp. 239 -255.)
                                                       IV (1907) p. 302
Leeke, Paul. Neue Arten der Gattung Pennisetum. 1.
     (Ex: Leeke, Untersuchungen über Abstammung und Heimat der Neger-
   hirse [Pennisetum americanum (L.) K. Schum.], Inaug.-Diss., Halle, 1907,
             . . . . . . . . . . V (1908) pp. 66-76
Léman. Species novae ex: Léman, Note sur plusieurs espèces nouvelles
   de Rosiers des environs de Paris.
     (ln: Journ. de Physique, LXXXVI (1818), pp. 364-367.) V (1908) pp. 47-48
Léveillé, H. Novitates sinenses. (Originaldiagnose.) Il (1906) pp. 113-115
-- Aconita duo sino-iaponica.
     (Aus: Bull. Soc. Agric., Sci. et Arts de la Sarthe, LX [1905],
   pp. 77-78.).
                                                        II (1906) p. 173

    Carices novae chinenses.

     (Aus: Bull. Soc. Agric., Sci. et Arts de la Sarthe, LX [1905],
                                                        II (1906) p. 172
   pp. 78 - 80.).
- Epilobia nova japonica.
     (Aus: Bull. Soc. Agric., Sci. et Arts de la Sarthe, LX [1905].
                                                        II (1906) p. 173
   pp. 72-77.) .
                             . . . . . . . .
- Species novae japonicae atque sinenses generis Rubi.
     (Aus: Bull, Soc. Agric., Sci. et Arts de la Sarthe, LX [1905],
(Aus: Bull. Soc. Agric., Sci. et Arts de la Sarthe, LX [1905],
                                                  Il (1906) pp. 157—160
                                 . . . . .
    pp. 35-45.) .
                                                  III (1906/07) pp. 17-19
- Novitates sinenses et japonicae. (Originaldiagn.)
- Pieris genus novis speciebus chinensibus auctum.
     (Ex: Bull. Soc. Bot. France, Llll [1906], pp. 202-207.)
                                                III (1906/07) pp. 262-263
                                               III (1906/07) pp. 349—351
- Novitates sinenses, (Originaldiagnosen.) . .
- Carices novae chinenses.
     (Ex: Bull. Soc. Bot. France, Llll [1906], pp. 315-318.)
                                                III (1906/07) pp. 351—353
- Amaryllidaceae atque Liliaceae novae chinenses.
     (Ex: Mem. Pontif. Acc. Rom. Nuov. Linc., XXIV, 23 pp.)
                                                III (1906/07) pp. 369 - 372
                                                1V (1907) pp. 65-67
- Nouveaux Ficus chinois. (Originaldiagnosen.)
- Ficus genus speciebus chinensibus auctum.
     Ex: Mem. R. Ac. Cienc. y Art Barcelona, 3 ser., VI, no. 12, 17 pp.)
                                                     IV (1907) pp. 82-86

    Melastomataceae novae chinenses.

     (Ex: Mem. Soc. nat. Sci. nat. et math. de Cherbourg XXXV [1906],
                                                   IV (1907) pp. 94-59
   pp. 391—398.) .
- Commelinaceae novae chinenses.
     pp. 381 - 391.)
- Decades plantarum novarum. 1-LXXXVIII. (Originaldiagnosen.)
                                         IV (1907) pp. 225—227, 330—334
                            V (1908) pp. 8-12, 99-101, 194-195, 279-284
                              VI (1908/09) pp. 110-114, 263-266, 330-333
           VII (1909) pp. 20-23, 97-103, 197-200, 230-232, 257-259,
                                                      337 - 340, 383 - 385
         VIII (1910) pp. 58-61, 138-141, 168-171, 258-259, 280-286,
       358-360, 401-402, 421-426, 449-452, 549-550
IX (1910/11) pp. 19-21, 76-79, 218-224, 245-248, 324-380, 441-468
             X (1911/12) pp. 145-149, 348-352, 369-378, 431-444, 478-476
```

Léveillé, H. Epilobia nova. (Originaldiagnosen.) V (1908) pp. 98-99 - Gesneraceae novae chinenses. (Ex: C. R. Assoc. Franç. Av. Sci. Congr. de Cherbourg, [1905], V (1908) pp. 221—224 V (1908) pp. 239—241 pp. 422-429.) Carices novae Coreanae. (Originaldiagnosen.) Florilegium chinense. (Ex: Bull, Soc. Agric. Sci. et Arts de la Sarthe [1904], pp. 316-326.) VI (1908/09) pp. 372-378 VII (1909) pp. 103-104 Carices sachalinenses. (Originaldiagnosen.) - Generis Brassicae novae combinationes. (Ex: Le Monde des Plantes, VII [1910], pp. 24-25.) IX (1910/11) pp. 128-129 - Plantae novae sandwicenses. I. II. (Originaldiagnosen.) X (1911/12) pp. 120-124, 149-157 Lindau, G. Plantae nonnullae novae andinae. (Originaldiagnosen.) I (1905) pp. 156-159 - Acanthaceae novae Bolivienses. (Originaldiagnosen.) (cf. Herzog!) VII (1909) pp. 67—68 Lindman, C. A. M. Eine neue nordische Art des Typus der Poa pratensis: Poa irrigata C. A. M. Lindman, in Bot. Not. [1905] p. 88, fig. 1-6. III (1906/07) pp. 82-83 Lingelsheim, A., Pax, F. und Winkler, H. Plantae novae bolivianae. II. III. (Originaldiagnosen.) Vergl. Fedde, Rep., V (1908), p. 225. VII (1909) pp. 107-114, 241-251 Litwinow, D. Plantae Turcomaniae (Transkaspiae) novae. (Ex: Trav. Mus. Bot. Ac. lmp. Sci. St. Pétersbourg, III [1907], . VI (1908/09) pp. 102—104 pp. 94-125.) - Plantae novae turkestanicae. I. II. (Ex: Trav. Mus. Bot. Ac. Imp. Sci. St. Pétersbourg, VII [1909], IX (1910/11) pp. 554-564 X (1910/11) pp. 265-270 Loesener, Th. Celestraceae et Hippocrateaceae Andinae novae. (Ori-I (1905) pp. 161—164 ginaldiagnosen.) - Aquifoliaceae Andinae novae. (Originaldiagnosen.) I (1905) pp. 164-167 - Aquifoliaceae novae Bolivienses. (Originaldiagnosen.) (cf. Herzog!) VII (1909) pp. 61-62 - Mexikanische u. zentralamerikanische Novitäten. I. II. III. (Originaldiagn.) VIII (1910) pp. 291—299, 306—311 IX (1910/11) pp. 355--367 Lojacono Pojero. Plantae novae Siculae. I. II. V (1908) pp. 23-29 (Ex: Malpighia XX [1906], pp. 180-216.) . VI (1908/09) pp. 85-89 Lützelberg. Lentibulariaceae Bolivienses. (Originaldiagn.) (cf. Herzog!) VII (1909) p. 356 Luisier, G. Neue Arten aus: G. Sampaio, Notas criticas sobre a Flora Portugueza. (Ex: Ann. Sci. Nat. Porto X [1906], pp. 8-77.) IV (1907) pp. 382-384 Macloskie, George. Plantae novae Patagonicae. I. II. (Auszug aus: George Macloskie, Flora Patagonica, Sect. 1-4, in: Reports of the Princeton University Exped. to Patagonia 1896-1899, Vol. VIII, Botany, Part. V, pp. 139-594, Pl. XII-XX.) IV (1907) pp. 113-115 IV (1907) pp. 137-144 Maiden, J. H. Plantae novae in New South Wales indigenae. (Ex: Proc. Linn. Soc. New South Wales XXXI, [28. XI. 1906], part. IV, . IV (1907) pp. 280—284 pp. 731 -- 742.) Eucalypti generis species novae. I. II. (Ex: Proc. Linn. Soc. New South Wales, XXIX [1904]. pp. 469-478, 751—780. XXX [1905], pp. 190—202, 886—388, 502—516.)

V (1908) pp. 48-54, 143-146

```
Maiden, J. H. Species novae tres generis Pultenaeae in Victoria Austra-
    liensi indigenae.
      (Ex: The Victorian Naturalist, XXII [1905], pp. 98-100.)
                                                      VII (1909) pp. 210-212
Maiden, I. H. et Betche, E. Species novae in Horto Botanico Sydneyano. I.
      (Ex: Proc. Linn. Soc. New South Wales, XXIX [1904], pp. 734—750.)
V (1908) pp. 54—57

    Species novae in Horto Botanico Sydnevano. Il.

      (Ex: Proc. Linn. Soc. New South Wales, XXX [1905], pp. 354—375.)
V (1908) pp. 81—87
Maire, R. et Petitmengin, M. Nova ex: R. Maire et M. Petitmengin.
    Etude des Plantes vasculaires récoltées en Grèce (1904).
      (Ex: Mat. p. servir à l'étude de la Flore et de la Géogr. bot. de
    l'Orient, facs. 2 [1907], 46 pp.)
                                    . . . VI (1908/09) pp. 2-5
Makino, T. Plantae novae Japonicae. I. Il.
      (Ex. Tokyo Bot. Mag., XIX [1905], pp. 6-22, 23-30, 63-74, 86-90,
                                                  VI (1908/09) pp. 283-290
    VIII (1910) pp. 107-113
Malme, Gust. O. A:N. Oxypetali Asclepiadacearum generis species novae
    sex Austro-americanae.

    Mitostigmatis atque Amblystigmatis generum Asclepiadacearum species

    novae.
      (Ex: Ark. f. Bot. III, no. 1, 24 pp.) . . . I (1905) pp. 137—141

    Gentianaceae novae Mattogrossenses.

      (Ex: Ark, f. Bot. III, no. 12 (1904), 23 pp.) . I (1905) pp. 124—125
- Dahlstedtia gen. nov.
      in Ark. f. Bot. IV, no. 9 (1905), p. 4. . . .
                                                      I (1905) pp. 122-123
 - Aristolochiaceae novae Austro-americanae.
      (Ex: Ark. f. Bot. I [1904], pp. 521-552.) . . II (1906) pp. 27-30
- Asclepiadaceae novae Austro-americanae.
(Ex: Ark. f. Bot. IV, no. 3 et no. 14 [1905].) . Il (1906) pp. 102-110
 - Bauhiniae Mattogrossenses novae.
nascentia.
      (Ex: Ark. f. Bot. III, no. 13 (1904), 22 pp.) . II (1906) pp. 151—156

    Vochysiaceae Mattogrossenses novae.
    (Ex: Ark. f. Bot. V, no. 6 [1905].)
    Xyrides Austro-americanae novae. I. II. (Originaldiagnosen.)

                                                  . II (1906) pp. 187—189
                             III (1906/07) pp. 111-113, V (1908) pp. 101-103
— Asclepiadaceae in E. Hassler, Novitates paraguarienses. I.
                                                    VI (1908/09) pp. 346-349
— Generis Pterocaulon Ell. nova species paraguayensis. (Cf. Hassler!)
VIII (1910) pp. 78—74
Maly, Karl. Opaske uz Ranunculus croaticus Schott (Bemerk. über R. c.)
      (Ex: Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, XIX [1907],
str. 9 14, 1 tabl. [cyrillisch].) . . . . VI (1908/09) pp. 290

— Nove biljke iz Bosne i Hercegovini, (Neue Pflanzen aus Bosnien und
                                              . VI (1908/09) pp. 290—291
    der Herzegowina).
      (Ex: Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, XVIII [1906],
    str. 445 418 [cyrillisch]) . . . .
                                                   VI (1908/09) pp. 292—294
de Mariz, Joaquim. Verbasceae novae Lusitanicae.
     (Ex: Bol. Soc. Broter. Coimbra, XXIII [1907], pp. 23-50.)
                                                     VIII (1910) pp. 486-487
Marloth, R. Species novae austro-africanae Euphorbiae generis. I.
      (Ex: Trans. R. Soc. South Africa, I, 1 (1909) pp. 315-319, fig. 1 4.)
                                                   IX (1910/11) pp. 567—568
```

VIII (1910) pp. 300-302

Masters, M. T. Coniferae Chinenses novae. (Ex: Journ. Linn. Soc. Bot., XXXVII [1906], pp. 410-424.) IV (1907) pp. 108-111 Matsumura, J. et Hayata, B. Novae species ex "Enumeratio Plantarum in Insula Formosa sponte crescentium", ed. J. Matsumura et B. Hayata. (Ex: Journ. Coll. Sci. Tokyo, XXII [1906], 704 pp., 18 tab.) VI (1908/09) pp. 192 -199 Mattei, G. E. Piuttia, novum Ranunculacearum genus. . V (1908) pp. 76-77 (Ex: Malpighia, XX [1906], p. 332.) - Plantae novae italo-somalienses. I. II. III. (Ex: Boll. Ort. Bot. Giard Colon Palermo, VII [1908], pp. 85-112, IX (1910/11) pp. 250-254, 318-320, 346-349 Mayr, H. Neue Arten aus: Fremdländische Wald- und Parkbäume für Europa. (Berlin 1906.) . . . . . . VIII (1910) pp. 90 –92 Menezes, Carlos A. Species novae madeirenses a Carlos A. Menezes descriptae. (Aus: Ann. Sci. Nat. Porto, VIII [1901], pp. 95-99.) IV (1907) pp. 43-44 Plantae novae Maderenses. (Diagnoses in lat. transtulit A. Luisier.) . V (1908) pp. 116-117 - Scrophulariae maderenses. (Ex: C. A. Menezes, Notice sur les espèces madériennes du genre Scrophularia. - Funchal 1908, 11 pp.) . . V (1908) pp. 213 -216 Merino, R. P. Species novae ex: R. P. Merino, Flora descriptiva é illustrada de Galicia II. 1906. VII (1909) pp. 362-368 VIII (1910) pp. 62-66, 296-289 Mez, Carl. Additamenta monographica 1906. I. Bromeliaceae. (Original-Millspaugh, C. F. Plantae novae Bahamenses. I. (Ex: Field Columb. Mus. Publ. no. 106 - Bot. Ser, II [1906], no. 3 pp. 137—184.) . . . . . . VII (1909) pp. 279-286 Misczenko, P. Juncacearum varietates novae Caucasicae a P. Misczenko in Fl. Cauc. crit. descriptae. (Ex: Fl. Cauc. crit., IV, 2 [1906], pp. 1-64.) IX (1910/11) pp. 254-255 Moeser. Pseudobotrys Moeser, genus novum leacinacearum. (Original-X (1911/12) pp. 310-311 Moore, A. H. Plantae novae Bermudenses ab A. H. Moore descriptae. (Ex: A List of Plants collected in Bermuda in 1905; Cambridge, Mass., 12. 3. 1906, 22 pp., with 3 pl.) . . . . . . III (1906/07) pp. 86 – 87 - Genus Spilanthes revisum. (Ex: Contr. Gray Herb. Harvard Univ., N. S., XXXIII in: Proc. Amer. Ac. Sci. XLII [1907], pp. 521—570.) . . . V (1908) pp. 321—329 Murbeck, Sv. Rumicis vesicarii species novae affines. (Ex: Lunds Univ. Arsskr., N. F., Afd. 2, Bd. 2, n. 14; Kgl. Fys. Sällsk. Handl., N. F., Bd. 17, n. 14; 30 pp., 2 tab.) IV (1907) pp. 251—255 - Species novae Africae boreali-occidentalis, imprimis Tunesiae. (Aus: Lunds Universitets Arsskrift, N. F., Afd. 2, Bd. 1, no. 4; Bd. 2, no. 1; Kgl. Fysiografiska Sällskapets Handlingar, N. F., [1905], Bd. 16, no. 4: Bd. 17, no. 1.) V (1908) pp. 200–213 Muschler, R. Beiträge zur Flora Nordostafrikas und der Nachbargebiete. I. (Originaldiagnosen.) Plantae novae sinaïcae. (Ex: R. Muschler, Beitrag zur Kenntnis der Flora von El-Tor, in: Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg, XLIX [1907], pp. 66-146.)

```
Muschler, R. Vernonia De Wildemaniana Muschler, nom. nov. (Original-
                                                           IX (1910/11) p. 384
    Nakai, T. Eriocaulon novum Japonicum. (Originaldiagn.) IX (1910/11) p. 466
Navás, Longin. Plantae editae a Carolo Pau
      in "Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales"
    Zaragoza 1902.
                                                      III (1906/07) pp. 321—324
(Bol. Soc. Arag. Cienc. Nat, II [1903], p. 279 et seq. III (1906/07) p. 325

— Plantae novae ex Hispania. Descripsit Carolus Pau
    in "Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales", II [1903], p. 65 et seq. . . . . . . . . . III (1906/07) pp. 32
                                                       III (1906/07) pp. 325-327
Ex flora gallaecica (Hisp.) plantas edidit R. P. Balthasar Merino, S. J. (Bol. Soc. Arag. Cienc. Nat., Ill [1904], p. 185.) Ill (1906/07) pp. 327—328

— Plantas de la Sierra de Aitana (Alicante). Por D. Carlos Pau.
      (Bol. Soc. Arag. Cienc. Nat., III [1904], p. 279 et seq)
                                                      III (1906/07) pp. 328-329
-- Nuevas formas españolas de plantas. Auctore Carolo Pau.
      (In: Bol. Soc. Arag. de Cienc. Nat. [1904], p. 288 et seq.)
                                                      III (1906/07) pp. 330-331
Nelson, Aven, et Kennedy, P. B. Species novae ex "Great Basin"
    (Nevada et California).
      (Ex: Proc. Biol. Soc. Washington, XIX [1906], pp. 155 à 158.)
                                                         IV (1907) pp. 284-286
— — Plantae novae Montrosenses.
      (Ex: Proc. Biol. Soc. Washington, XIX [1906], pp. 35-40.)
                                                          V (1908) pp. 285 – 289
Nelson, Aven. Plantae novae occidentali-americanae.
      (Ex: Proc. Biol. Soc. Washington, XX [1907], pp. 33-40.)
                                                          V (1908) pp. 216-220
Niedenzu, F. Novae species Hiraeae Malpighiacearum generis.
      (Aus: De genere Hiraea in Verz. Vorl. Lyc. Hosianum, Braunsberg,
    [1906], pp 3-17.)
                                                          V (1908) pp. 58-61
- Novae species Mascagniae generis. I. II.
      (Ex: Arb. bot. Inst. Kgl. Lyc. Hosianum in Braunsberg [1908], 29 pp.)
                                           IX (1910/11) pp. 199-205, 267-273
Oborny, Adolf. Neue Hieracien aus Mähren, beschrieben von A. Oborny.
      (In: Verh. Naturf. Ver. Brünn, XLIII [1905], pp. 135 276)
                                                       III (1906/07) pp. 155-156
Ostenfeld, C. H. Utriculariae duae novae Siamenses. (Originaldiagn.)
                                                            II (1906) pp. 68-69
Pascher, A. Neue Arten und Varietäten der Gattung Gagea. (Original-
                                               I (1905) pp. 190—192, 193—196
    diagnosen.)
- Tres novae species asiaticae generis Gageae. (Originaldiagnosen.)
                                                            II (1906) pp. 57—59
II (1906) pp 67—68
- Novae Gageae. (Originaldiagnosen.) .
- Novae Gageae ex stirpe: Gagea bohemica s. ampl. (Originaldiagn.)
                                                                 II (1906) p. 166
- Species novae generis Physochlainae. (Originaldiagn.) VII (1909) pp. 166-167
- Zwei neue Arten der Gattung Anisodus (Solanaceae.) (Originaldiagn.)
                                                         VII (1909) pp. 226--227
Pau, Carolus. Fritillaria Boissieri Costa.
      (Corrigit Carolus Pau in: Bull. de la Institució Catalana d'Historia
    Natural, Barcelona [1907], p. 9.)
                                                              IV (1907) p. 212
- Plantae novae huescanae.
      (Ex: Carlos Pau, Plantas de la Provincia de Huesca [6.—18. Julio 1903]
    — Bol. Soc. Arag. Cienc. nat, IV [1905], pp. 183—184, 288—296; V [1907], pp. 174—181; VII (1908), pp. 108—115.) VII (1909) pp. 83—86
```

Pau, Carolus. Pyrethrum pallidum atque varietates explicatae (= P. hispanicum Willk.). (Bull. Inst. Catalana Hist. Nat. [1906], pp. 2-6.) (VII 1909) pp. 349-35
— Nova ex: Mi segunda visita á Sierra Nevada. (Ex: Bol. Soc. Acag. Cienc. Nat, VIII [1909], pp. 104—129.) VIII (1910) pp. 132-13
Paulsen, Ove. Plantae Olufsenianae ex Asia Media et Persia denuo descriptae.
(Ex: Ove Paulsen, Plants collected in Asia Media and Persia, III. IV, in: Bot. Tidsskr., XXVII [1906], pp. 127—151, 209—219.)  IV (1907) pp. 45-4
Pavolini, A. F. Plantae novae ex Hupeh Chinae a P. Silvestri adlatae. (Ex: Nuov. Giorn. Bot. Ital., XV [1908], pp. 390-443.)  IX (1910/11) pp. 317-318
Pax, F. Euphorbia Schoenlandii in Jahrb. Schles. Ges. vaterl. Kult. LXXXII, 1904 (1905), Il Zoolbot.
<ul> <li>Die von Alfred Meebold im Westhimalaya (Kashmir) gesammelten</li> <li>Primeln. (Originaldiagnosen.)</li> <li>Il (1906) pp. 115-110</li> <li>Einige neue Pflanzen der bolivianischen Flora. (Originaldiagnosen.)</li> </ul>
Plantae novae bolivianae. IV. (Originaldiagn.) Von A. Cogniaux, A. Lingelsheim, F. Pax und H. Winkler. VIII (1910) pp. 1-6
<ul> <li>Einige neue Euphorbiaceen aus Amerika. (Originaldiagnosen.)</li> <li>VIII (1910) pp. 161—163</li> <li>Ein verkannter Phyllanthus aus Neu-Guinea.</li> <li>VIII (1910) p. 323</li> </ul>
<ul> <li>Zwei Coelodiscus-Arten aus Neu-Guinea. (Originaldiagnosen.)</li> <li>VIII (1910) pp. 481-483</li> <li>Plantae novae bolivianae. V. Piperaceae, auct. C. de Candolle.</li> </ul>
Originaldiagnosen.)
Originaldiagnosen.)
(Ex: Transact. South Afric. Phil. Soc., XV, pt. 4 [1905], pp. 175-182.) IV (1907) pp. 25-27
Penther, Arnold, et Zederbauer, Emerich. Neuheiten von der Reise nach dem Erdschias-Dagh (Kleinasien), 1902.  (Ex: Ann. k. k. Naturh. Hofm, Wien, XX [1907], pp. 359—464.)  VI (1908/09) pp. 144—153
Perkins, J. Monimiaceae andinae. (Originaldiagnosen.) I (1905) pp. 153-156  Styracaceae americanae novae. (Originaldiagnosen.) II (1906) pp. 16-26  Ein neues Alniphyllum (A. Fauriei) und einiges über die systematische
Stellung der Gattung. (Originaldiagnosen.)
Petitmengin. Lysimachia genus novis speciebus chinensibus auctum. (Ex: Le Monde des Plantes, IX, no. 47 [1. VII. 1907], pp. 30-31.)  1V (1907) pp. 317-318
Petrak, Fr. Cirsii generis hybridae et varietates novae. (Originaldiagn.) V (1908) pp. 329-333
Cirsium Sommieri, eine neue Art aus Türkisch-Armenien. (Originaldiagn.) IX (1910/11) pp. 166—169
<ul> <li>Über eine neue Art der Gattung Cirsium aus Nord-Mexiko. (Original-diagnosen.)</li> <li>IX (1910/11) pp. 177-178</li> <li>Über eine neue Art der Gattung Cirsium aus dem nördlichen Indien.</li> </ul>
(Originaldiagnosen.) IX (1910/11) pp. 198—199
Pilger, R. Gramineae andinae. l. Bambuseae. (Originaldiagnosen.) 1 (1905) pp. 145—152

Pilger, Ein neuer andiner Podocarpus. (Originaldiagnose.) 1 (1905) pp. 189–190  – Ein neues Antiphytum (A. Bornmülleri) aus dem südlichen Brasilien. (Originaldiagnose.)
(II [1910], pp. 360-373.) VIII (1910) pp. 151-152 <b>Piper,</b> C. V. Neues aus: Charles V. Piper, Flora of the State of Was-
hington. I—V. (Ex: Contr. Unit. St. Nat. Herb., XI [1906], 637 pp.)
VI (1908/09) pp. 73—79, 168—173 VII (1909) pp. 215—220 VIII (1910) pp. 13—16, 158—161, 267—275
Pitard, J. Novae species atque formae ex: J Pitard et L. Proust, Les Iles Canaries (Paris 1908.) I. II. III. IX (1910/11) pp. 206—210, 274—281, 379—382
Pittier, H. Plantac Colombianae et Centro-americanae 1908-1910. VIII (1910) pp. 465-480, 531-539
Porta, P. Plantae novae Tridentinae. (Atti Acc. Sci., Lett. ed Arti Agiati Rovereto, Ser. 3, XI, fascic., 2 [1905], pp. 1-8.) VIII (1910) pp. 482-486
Prain, D. et Burkill, J. H. Dioscoreae generis species novae septem.  (Ex: Journ. Asiat. Soc. of Bengal. LXXIII [1904], part. II, no. 4 et Supplement.)
Prain, D. Meconopsis, Papaveracearum genus, speciebus nonnullis novis aucta.
(Ex: Ann. of Bot., XX [1906], pp. 323—370. Plate XXIV and XXV.) IV (1907) pp. 217—224
Preuss, Hans. Plantae novae Borussiae orientalis et occidentalis. (Originaldiagnosen.) VII (1909) pp. 105-106
Pritzel, E. Beitrag zur Flora von West-Australien. (Originaldiagnosen.) X (1910/11) pp. 133—134
Pulle, A. Plantae novae Surinamenses ab A. Pulle descriptae.  (Ex: Pulle, Enumeration of the vascular plants known from Surinam.  Leiden 1906; ferner in Rec. Trav. Bot. Néerl., II [1906], pp. 195—208.)  III (1906/07) pp. 285—290
<ul> <li>Plantae novae Surinamenses. I – III.</li> <li>(Ex: Rec. Trav. Bot. Néerl., IV [1907], pp. 119–141.) IV (1907) pp. 373–376</li> <li>X (1911/12) pp. 282–288, 407–413</li> </ul>
Radlkofer, L. Sapindaceae Bolivienses. (Originaldiagn.) (cf. Herzog!) VII (1909) pp. 354-356
<ul> <li>Sapindaceae. (cf. Hassler!)</li> <li>Sapindaceae novae Indicae et Malaicae ex Herbario Calcuttensi.</li> </ul>
(Ex: Rec. Bot. Surv. India, III, no. 3 [1907]. pp. 341–355.)  VIII (1910) pp. 185–196  — Sapindaceae novae Surinamenses. (Originaldiagn.) IX (1910/11) pp. 374–377  — Meliacea nova Surinamensis. (Originaldiagnose.) IX (1910/11) pp. 372–373
Rechinger, Karl. Plantae novae pacificae. 1–VI. (Originaldiagnosen.)
VI (1907) pp. 228-233 V (1908) pp. 130-133 VI (1908/09) pp. 49-51, 325-328 VII (1909) pp. 17-18, 168
Rehder, A. Nonnullae species novae generis Aceris. (Wiedergabe der Diagnosen aus: Sargent-, Trees and Shrubs I [1905]
p. 178 ff.)
- Lonicerae generis species varietatesque asiaticae novae vel recentius alio loco ab auctore descriptae. (Originaldiagn.) VI (1908/09) pp. 269-276

```
Rehder, A. Viburni generis species varietatesque asiaticae nuper pro
    novis anglice descriptae. . . . . IX (1910/11) pp. 179 – 186
Rendle, A. B. Nomina commutata ex: "List of British Seed-plants and
    Ferns". 1907.
                                         . . VIII (1910) pp. 436—437
Robinson, B. L. Eupatorieae novae Americanae. I. II.
      (Ex: Proc. Am. Ac. Arts and Sci. XLI, no. 9. July 1905, pp. 271-278;
    XLII. no 1, May 1906, pp. 1–48; Contrib. Gray Herb. Harvard Univers. N. S. no. XXXI, II; XXXII, I–IV.)
                                  I (1905) pp. 38–42, IV (1907) pp. 144–155
- A well marked species of Sparganium.
      (Aus: Rhodora VII [1905], p. 60.) .
                                           · · · · · 1 (1905) p. 28
Rohlena, J. Neue Pflanzen aus Montenegro.
      (Aus: Sitzb. d. Kgl. Böhm. Ges. d. Wiss. Prag. 1902 no. XXXII
    und XXXIX, 1903 no. XVII, 1904 no. XXXVIII, I (1905) pp. 22-28, 33-38
- Beitrag zur Flora von Montenegro. (Originaldiagn.) III (1906/07) pp. 145-149
Roland-Gosselin, R. Cactaceae novae a cl. Weber descriptae, sed
    nondum editae.
    (Auszug aus: R. Roland-Gosselin, Ocuvres posthumes de M. le Dr. Weber. in: Bull. Mus. hist. nat. Paris 1904, no. 6, pp. 382-399.)
                                                         II (1906) pp. 72 –80
Rose, J. N. Umbelliferae novae Georgianae.
      (Ex: Proc. Unit. Stat. Nat. Mus. XXIX [1905] pp. 441—442 with pl. III.)
                                                             IV (1907) p. 99

    Viciaceae novae mexicanae atque centrali americanae.

      XXX-XXXIV.)

    Caesalpiniaceae novae mexicanae.

      (Ex: I. c. X pt. 3 [1906] pp. 97–98, pl. XXIX.) V (1908) pp. 110–112
- Dasylirion genus atque affinia novis speciebus mexicanis et centrali-
    americanis aucta.
      (Ex: I. c. X. pt. 3 [1906] pp. 87–92, pl. XXIII—XXV, cf. Fig. 1—6.)
                                                       V (1908) pp. 113-114

    Rosaceae novae mexicanae.

      (Ex: I. c. X. pt. 3. [1906] pp. 95—96 pl. XXVI—XXVII.) V (1908) pp. 155—156

    Species sessiliflorae mexicanae Parasolae generis generice commutatae

    atque novae.
      (Ex: l. c. X, pt. 3 [1906], pp. 103-107.) . VI (1908/9) pp. 249-252
— Gerania nova.
      (Ex: I. c. X, pt. 3 [1906], pp. 108 – 109.) VI (1908/9) pp. 252 – 253

    Krameria speciebus novis aucta.

      (Ex: l. c. X, pt. 3 [1906], pp. 107—108.) . VI (1908/9) pp. 253—254

    Oxalidaceae novae mexicanae.

      (Ex: 1. c. X. pt. 3 [1906], pp. 109-117, pl. XXXV.)
                                                     VI (1908/9) pp. 254—262
Rosenstock, E. Filices novae I-VI. (Originaldiagnosen.)
                                                  IV (1907) pp. 2—6, 292—296
V (1908) pp. 13—17
                                                      VI (1908/9) pp. 175—179
                                                       VII (1909) pp. 146—150
                                            VIII (1910) pp. 163-164, 277-279
- Filices novae a Dre. O. Buchtien in Bolivia collectae. I-III. (Original-
   diagnosen.) . . . . . . .
                                                       V (1908) pp. 228-239
                                                     VI (1908/9) pp. 308-316
                                                    IX (1910/11) pp. 342-344
- Filices novoguineenses novae. I. II. (Originaldiagnosen.)
                                               V (1908) pp. 33 –44, 370 –376
```

0
70
6
3 27
. 1
13
71
ır
18
25
1/1
23 )6
)4
38
58
77
11
4
4
74 39
4
74 39
74 19
74 89 86
74 89 86
74 89 36
74 39 36 17 .2
74 39 36 17
74 19 19 10 11 3
74 39 36 17 .2
74 19 19 17 2 10 11 36
74 19 19 10 11 3
74 19 19 17 2 10 11 36
74 19 19 10 11 13 16
74 39 36 47 1 36 47 1
74 19 19 10 11 13 13 13 14 14

Schneider, C. K. Nonnullae species generis Corni asiaticae. (Original-diagnosen.) VII (1909) pp. 228—229  — Species et formae novae generis Syringa. (Originaldiagnosen.)
IX (1910/11) pp. 79-82  - Eine neue Fraxinus aus Kleinasien. (Originaldiagnose.) X (1911/12) p. 163
Schnetz, Jos. Neue Rosenformen aus der Gegend von Münnerstadt in Unterfranken I.  (Ex: Mitt. Bayr. Bot. Ges., II (1907, no. 3, p. 45 –47; no. 4, pp. 61 –62.)  VII (1909) pp. 330 – 332
— Rosae generis varietates novae. (Ex: Mitt. Bayr. Bot. Ges., II [1908], no. 6, pp. 93—95.) VII (1909) pp. 351—354
Schönland, S. Crassulaceae novae Austro-africanae a. S. Schönland descriptae.
(Aus: Rec. Albany Mus., I [1904] pp. 114-119) II (1906) pp. 178-181 - Liliaceae novae Austro-africanae a. S. Schönland descriptae. (Aus: 1. c. I [1904] pp. 120-124. [1905] pp. 283-295.) II (1906) pp. 181-185
Schott, Peter Carl. Rassen der gemeinen Kiefer (Pinus sylvestris L.) VII (1909) pp. 87—90
Schröter, C. Neue Pflanzen aus der Schweiz. (Ex: Ber. Schweiz. Bot. Ges. Bern, XIV [1904] pp. 114—122.) II (1906) pp. 148—151
Schulz, O. E. Ein neues Citharexylum (C. Urbanii) aus Jamaika. (Original-
<ul> <li>Erythroxylaceae in E. Hassler, Novitates paraguarienses. I VI (1908/9) p. 352</li> <li>Erythroxylaceae novae Bolivienses. (Originaldiagnosen.) (cf. Herzog!)</li> </ul>
- Erythroxylaceae. (Siehe Lösener!)
Schuster, J. Drei neue Bastarde aus der Sektion Omphalospora der Gattung Veronica.  (Aus: Mitt. Bayr. Bot. Ges. München n. 36, 1905. pp. 455-459.)
Novitates Florae Bavaricae
Schweinfurth, Georg und Muschler, Reno. Eine neue Convolvulacee aus dem südlichen Algerien: Convolvulus Trabutianus nov. spec. (Originaldiagnose.)
Schwertschlager, Jos. Diagnosen neuer Rosenformen Bayerns. VIII (1910) pp. 99-107
Seemen, O. von. Eine neue Weide aus Japan: Salix Makinoana O. v. Seemen, nov. spec. ♀ (Originaldiagnose.)
Zwei neue Eichen (Quercus cathayana und Qu. Wilsonii) aus China. (Originaldiagnosen.) III (1906,07) pp. 53—54 — Quercus Sundanae novae.
(Aus: Bull. Dép. Agric. Ind. Néerland., no. 1 [1906], pp. 1–14.) III (1906/07) pp. 173-175
<ul> <li>Salices novae. (Originaldiagnosen.)</li></ul>
— Eine neue Weide (Salix Pilgeriana ♀) aus Japan. (Originaldiagnose.)  VII (1909) p. 134
Simmons, H. G. Plantae novae vasculares Florae Ellesmerelandicae.  (Ex: Rep. II. Norweg. Arctic Exp. "Fram" 1898—1902, no. 2 [1906], 197 pp.) VIII (1910) pp. 74—79

```
Simmons, H. G. Neue lappländische Phanerogamen.
     (Aus: Ark. f. Bot., VI [1907], no. 17; 40 pp)
                                                VIII (1910) pp. 181-184
Simonkai, Lud. Novae species atque formae Rhamnorum hungaricarum.
     (Ex: Növ. Közl., VI [1907], pp. 39-58, Beibl., pp. 11-13.)
                                                        V (1908) p. 105
- Acera Hungariae atque terrarum Balkani septentrionalis adjacentium nova.
     (Ex: Növ. Közl., VII [1908], pp. 141-182, fig. 1-12.)
                                                 VII (1909) pp. 272-273
Sireitschikov, D. Neue Formen aus der Illustrierten Flora des Gouverne-
    ments Moskau.
     (Band I-III.) . . . . . . . VIII (1910) pp. 226-227
Small, John K. Plantae novae in Florida subtropica indigenae ab John K. Small descriptae. I. II.
     (Ex: Bull. New York Bot. Gard. III [1905], pp. 420-440.)
                                      III (1906,07) pp. 264-272, 291-294
Smith, J. J. Orchidaceae Javanae.
   (Ex: J. J. Smith, Die Orchideen von Java. 1. Nachtrag. [Bull. Dep. Agric. Indes Néerl., XIII (1907), pp. 1–78].) V. (1908) pp. 289
                                                 V. (1908) pp. 289 – 305
- Neue papuanische Pflanzen. I. (Originaldiagnosen.)
                                                X (1911/12) pp. 486-488
Sodiro, A. Piperis generis species novae quattuor Ecuadorenses a Sodiro
    descriptae.
     (Aus: Sertula Florae Ecuadorensis, auctore A. Sodiro. [1905], pp.
           13-16.

    Acrosticha Ecuadorensia nova.

     (Ex: An. Univ. Quito, XIX, n. 135; Sertula Fl. Ecuador. auct. Al.
   Sodiro, 1905, 12 pp.) . . . . .
                                          . VI (1908,09) pp. 276-282
Sommier, S. Additamenta Florae Italianae.
     (Ex: Bull. Soc. bot. ital., 1902, p. 208–213; 1907, p. 38.)
                                                    V (1908) p. 258-259
Sprague, T. A. Plantae novae austro-americanae, imprimis in Columbia
   indigenae.
     (Auszug aus: Transact. Bot. Soc. Edinburgh XXII part. 4 [1905] pp.
   Stadlmann, Josef. Nonnullae plantae novae, quas collegit Dr. E. Zeder-
   bauer in itinere suo ad Argaeum (Erdschiasdagh) anno 1902 suscepto
                       . . . . . . . . II (1906) pp. 164–165
   (Originaldiagnosen.)
- Urobotrya gen. nov. Olacacearum O. Stapf.
     (Contributions to the Flora of Liberia, in: Journ. Linn. Soc. XXXVII
   - Androsiphonia nov. gen. Passifloracearum O. Stapf.
     (Contributions to the Flora of Liberia, in: Journ. Linn. Soc. XXXVII
    [1905], p. 101.)
                                                 . III (1906/07) p. 85
- Plantae novae ex Liberia enascentes modo secundum materialia Her-
   barii Regii Kewensis descriptae et in Sir Harry Johnston's "Liberia".
   Appendix IV (1905), pp. 570-669 publicatae.
                                              . V (1908) pp. 353—355
Steiger, Emil. Neuheiten aus der Flora der Adula-Gebirgsgruppe.
     (Aus: Verh. Naturf. Ges. Basel, XVIII [1906]. pp. 131-370.)
                                                III (1906/07) pp. 234 — 355
— Neuheiten aus der Flora der Adula-Gebirgsgruppe II.
     (Aus: Verhandl. Naturf. Ges. Basel XVIII [1906], pp. 465-755.)
                                                    IV (1907) pp. 67—71
Terracciano, Achille. Gageae novae Lusitanicae.
     (Ex: Bol. Soc. Brot. XX [1905], pp. 200 –206) II (1906) pp. 177–178
```

Terracciano, Nic. Normulae formae sen varietates Ornithogali montani Montis Pollinis Calabriae descriptae. (Ex: Rend. R. Acc. Sci. fis. e math. Napoli XLV [1906], pp. 529-530.) IV (1907) pp. 303—305 - Plantae novae vasculares in agro Murensi sponte nascentes. (Ex: Nuov. Giorn. Bot. Ital., XIV [1907]. pp. 117-220.) V (1908) pp. 136-143 Thellung, A. Species novae. I. (Originaldiagnosen.) III (1906,07) pp. 281-284 — Acanthocardamum erinaceum (Boiss.) Thellung, als Vertreter einer neuen Cruciferengattung aus Persien. (Ex: Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich LI [1906] pp. 221—225.) IV (1907) pp. 162—164 - Neues von den afrikanischen Arten der Gattung Lepidium. (Ex: Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich, XXVI, in: Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich, LI [1906], pp. 144—192.) V (1908) pp. 87—95, 122—127 — Neuheiten aus der Adventivflora von Montpellier. (Originaldiagnosen.) V (1908) pp. 161-163 Neues aus der Adventivflora der Schweiz (Ex: Beiträge zur Kenntnis der Schweizer Flora (VIII). 1. Beiträge zur Adventivflora der Schweiz. — Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich, XXXVI, in Vierteljahrsschrift. Naturf. Ges. Zürich, LlI [1907], pp. 434-473.) V (1908) pp. 360—369 . . . . . - Ein neues adventives Geranium [G. peregrinum] aus Baden. (Original diagnose.) . . . . . . . . . . . . IX (1910/11) pp. 589—550 — Combinationes novae. (Originalarbeit.) . . X (1911/12) pp. 289—291 Tieghem, Ph. van. Rhaptopetalaceae novae. (Ex: Ann. Sci. nat. Paris, 9 sér., 1 [1905], pp. 321—388.) V (1908) pp. 118-122 - Irvingiaceae novae (Ex: Ann. Sci. nat. Paris, 9 sér., 1 [1905], pp. 247-320.) V (1908) pp. 146—155 - Ochnaceae novae. (Ex: Ph. van Tiegliem, Supplément aux Ochnacées. - Ann. Sci. nat., Paris, Bot., 9 sér., V [1907], pp. 157—192.) VI (1908,09 pp. 7—16 — Ailanthus et Pongelion specie nova auctum. (Ex: Ann. Sci nat. Paris, Botanique, 9 sér., IV [1906], pp. 272—280.) VI (1908/09) pp. 191-192 Agialidaceae novae. (Ex: Ann. Sci. Nat. Paris, Bot., 9. sér., IV [1906], pp. 223-260.) VII (1909) pp. 115-121 Balanophoraceae novae vel generice commutatae. (Ex: Ann. Sci. Nat. Paris, Bot., sér. 9. t. VI [1907], pp. 141—213.) VII (1909) pp. 265—272 Toepffer, Ad. Formae novae Salicum Bavariae descriptae ab Ad. Toepffer. Trelease, William. Additions to the Genus Yucca: Species novae. (Ex: Rep. Missouri Bot. Gard., XVIII [1907], pp. 225-230.) V (1908) pp. 245 -246 Agaves species mexicanae zapupiferae. (Ex: W. Trelease, The Mexican fiber Agaves known as zapupe in Trans. Acad. Sci. St. Louis, XVIII, p. 29-37, pl. 1-6, 18 May 1909.) VII (1909) pp. 332—333 Tutcher, W. J. Dunnia, gen. nov. Rubiacearum W. J. Tutcher in Journ. Linn. Soc. London XXXVII (1905) pp. 69-70. . II (1906) pp. 111-112

(Éx: Növ. Közl., VII, 1908, pp. 207-218, Beibl., pp. [34]-[38].)

VII (1909) pp. 179 – 180

Tuzson, J. Potentilla rupestris L. revisa.

Ulbrich, E. Leguninosae andinae I. (Originaldiagnosen.) II (1906) pp. 1−13  — Eine neue, sehr bemerkenswerte Varietät von Ophioglossum vulgatum: var. Englerianum E. Ulbrich, nov. var., ans der Provinz Brandenburg. (Originaldiagnosen.) VIII (1910) pp. 49−52  — Ein für Mitteleuropa neuer Calamagrostis-Bastard: ★ Calamagrostis Conwentzii Ulbrich (= C. neglecta ★ lanceolata S. Almqvist.) (Originaldiagnose.) VIII (1910) pp. 52-54  — Sida confusa Hassler. VIII (1910) pp. 289−290  — Elaeocarpaceae. (Siehe Lösener!) IX (1910/11) p. 356  Urban, Jgn. Turneraceae novae Uleanae. (Originaldiagnosen.)
Vaccari, L. Plantae novae ex: L. Vaccari, Catalogue raisonné des Plantes vasculaires de la Vallée d'Aoste. 1904. I. II. VIII (1910) pp. 327-333, 360-364  — Plantae novae ex: L. Vaccari, Catalogue raisonné des Plantes vasculaires de la Vallée d'Aoste. III. (1911), Bg. 29-40.
Valeton, Th. Die Arten der Gattung Aphanomyrtus und ihre Synonymik.  (Originalarbeit)
Vandas, C. Heliosperma Rohlenae, nov. spec. (Originaldiagnose.) Vill (1910) p. 300.
— Plantae novae Formanekianae. (Ex: Vandas, Reliquiae Formanekianae. 1909, 612 pp.) IX (1910/11) pp. 524-534
Vaniot, Eug. Boraginaceae novae chinenses.  (Aus: Le Monde des Plantes. VII, no. 35-36, [1905] pp. 42-43.  II (1906) pp. 156-157.
Velenovsky, J. Plantae novae Bulgaricae.  (Auszug aus: Sitzungsberichten der Kgl. Böhm. Gesellsch. d. Wissenschaft; mathnaturw. Klasse: Prag 1903, no. XXXIII.)
Vierhapper, Fritz. Neuheiten von der Balkan-Halbinsel. (Ex: Mitt. Naturw. Ver. Univ. Wien, IV [1906], pp. 36-64, 65-76.)  III (1906,07) pp. 57-58
<ul> <li>Plantae novae Arabiae meridionalis atque Sokótrae insulae. I. II.</li> <li>(Ex: Denkschr. MathNaturw. Kl. Kais. Akad. Wissensch., Wien,</li> <li>LXXI [1907], pp. 321-490. Mit 17 Tafeln und 35 Textabbildungen.)</li> <li>VII (1909) pp 140-143, 158-165</li> </ul>
Viguier, Réné. Verzeichnis der neuen Namen und Beschreibung der neuen Gattungen aus: Réné Viguier, Recherches anatomiques sur la classification des Araliacées.  (Ex: Ann. Sci. Nat. Paris, Bot., 9. sér., IV [1906], pp. 1—210.)
VI (1908,09) pp. 45-48 Vollmann, F. Euphrasia minima × picta nov. hybr. F. Vollm. in Mitt.
Bayr. Bot. Ges. n. 36 (1905) p. 465
VIII (1910) pp. 55-57 VIII (19 0) p. 79.
Wangerin, W. Cornaceae novae. IIII. (Originaldiagnosen.) IV (1907) pp. 335—337. VI (1908/09) pp. 97—102. X (1911/12) p. 273  — Alangium genus novis speciebus auctum. (Originaldiagnosen.)  IV (1907) pp. 338—340.
Warburg, O. Drei neue Ficus-Arten aus dem nichttropischen Vorderasien. (Auszug aus der Ascherson-Festschrift 1904, pp. 369-370.)
<ul> <li>Myristicaceae Costaricenses. (Originaldiagnosen.)</li> <li>Neu-Caledonische Ficus-Arten. (Originaldiagnosen.)</li> <li>Australische Ficus-Arten. (Original-Diagn.)</li> <li>I (1905) pp. 71-72</li> <li>I (1905) pp. 78-82</li> <li>I (1905) pp. 72-78</li> </ul>

Wein, K. Neue Hybriden aus der Gattung Festuca. I–II. (Originaldiagn.) VI (1908/09) pp. 353—354, VII (1909) pp. 18—19
Rosa rubiginosa I., var. Beckeri K. Wein. (Originaldiagnose.) IX (1910/11) p. 126
<ul> <li>Papaver rhoeas × strigosum (× P. Feddeanum) K. Wein, nov. hybr.</li> <li>Originaldiagnose.) IX (1910/11) p. 172</li> <li>Papaver Osswaldii K. Wein, nov. spec. (Originaldiagnose.)</li> </ul>
Beiträge zur Kenntnis der deutschen Mohnarten. (Originaldiagnosen.)
IX (1910/11) pp. 225—229, 241—244  Papaver spurium K. Wein, nov. spec. Originaldiagnose.)
— Rosa dumetorum Thuill, var. Lebingii K. Wein. (Originaldiagnosen.)
- Rosa Jundzilli Bess. var. Jacobsii_K. Wein. Originaldiagnose.)
Bromus erectus Huds. var. pubiculmis K. Wein. (Originaldiagnose.)
IX (1910/11) p. 377  — Poa nemoralis × palustris (P. intricata K. Wein.) (Originaldiagnose.)
IX (1910/11) p. 378  — Glyceria fluitans R. Br. var. fallax K. Wein. (Originaldiagnose.)
— Einige neue Formen von Papaver rhoeas. (Originaldiagnosen.)
IX (1910/11) pp. 463—464  — Rosa canina L. var. Petryi K. Wein. (Originaldiagnose.)
IX (1910/11) pp. 497—498  — Rosa tomentosa Sm. var. Quellei K. Wein. (Originaldiagnose.)
X (1911/12) pp. 56-57
Westerlund, Carl Gustaf. Neue Abarten und Formen aus der Flora von Helsingland.  (Ex: Bot. Not., 1906, p. 1–40.)
(Ex: Redog. f. Allm. Lärov. i Norrköping och Söderköping [1906 bis 1907], 1907, 31 pp V (1908) pp. 310—311
De Wildeman, E. Plantae Thomerianae Congolenses novae, I. II. (Ex: De Wildeman, Plantae Thomerianae Congolenses, Series II, Juli 1911. 465 pp. 20 tab.) X (1911/12) pp. 423—431, 523—529
Winkler, H. Neue Diagnosen aus "Comptes Rendus de l'Académie des sciences de Paris" CXL (1905.)
Eine neue Struthiola aus Ostafrika. (Originaldiagnose.) IX (1910/11) p. 524
Witasek, J. Solani generis species et varietates novae. (Originaldiagnose.) V (1908) pp. 163-166
Witte, Hernfried. Einige neue Pflanzenformen aus der schwedischen Alfarvegetation
Wolf, Egbert. Eine neue Weide (Salix anomala nov. spec.) aus Süd-Rußland. (Originaldiagnose.)
zu St. Petersburg.  (Ex: Mitt. Kaiserl. Forstinstitutes St. Petersburg, VIII [1905], Sep. pp. 1–13.)  — X Salix turgaiskensis (= S. repens rosmarinifolia Koch × caspica Pall.), nov. hybr. E. Wolf. (Originaldiagnose.)  X (1911/12) p. 477
Wolff, Hermann. Eryngium Buchtienii Wolff nov. spec. (Originaldiagn.) VI (1908/09) p. 24
Species novae generis Eryngii Americae centralis et australis. (Originaldiagnosen.)

Wolff, Hermann. Eryngium affine nov. spec. (Originaldiagnose.)
VII (1909) pp. 345-346
- Eryngia nova americana duo. (Originaldiagn.) . VIII (1910) pp. 414-415
Umbelliferae novae. I, II, III. (Originaldiagnosen.) VIII (1910) pp. 524—526 IX (1910/11) pp. 417—422, 565
Yabe, Y. Trichomana Formosana et Liukiuensia. (Ex: Tokyo Bot. Mag., XIX [1905], pp. 31—35.
VI (1908/09) pp. 282—283
Zahlbruckner, A. Plantae Pentherianae (austroafricanae) novae. (Ex: A. Zahlbruckner, Plantae Pentherianae in: Ann. k. k. Hofmuseum Wien, XX [1905], pp. 1–58. Mit 2 Tafeln.)
III (1906/07) pp. 191—199, 254—258, VI (1908/09) pp. 358—371
- Ein neues Dialypetalum aus Madagaskar. (Originaldiagn.) IV (1907) p. 7
Zahn, Carolus, Hermannus. Hieracia caucasica nova a. D. Litwinow, Petropolitano, annis 1905 et 1906 in Caucaso boreali lecta. (Original-diagnosen.) . IV (1907) pp. 179-194, 236-251, 257-266, 321-330. Register hierzu pp. 329-330 Hieracia Montenegrina nova a J. Rohlena in principatu Cerna Gora lecta.
(Originaldiagnosen.) VI (1908/09) pp. 225—241
Zobel, August. Neues aus dem "Verzeichnis der im Herzogtume Anhält und in dessen näherer Umgebung beobachteten Phanerogamen und Gefäßkryptogamen." Teil II., 1907

## Index specierum.

Die mit Sternchen versehenen Pflanzen sind im Repertorium neu beschrieben (Originaldiagnosen), die eingeklammerten Pllanzennamen sind Synonyme.

## A.

Aberemoa brevipedunculata R. E. Fries II, 189.

Abies recurvata Mast. IV, 111.

- squamata M. T. Mast. IV, 370. Abronia Bigelowii Heimerl VIII, 302.

- Colvillei Heimerl VIII, 302.

(Abutilon amplissimum O. Ktze.) IX, 491. (-- var. subpeltatum O. Ktze.) IX, 505.

\*- Balansae Hassl. VII, 376.

- Bedfordianum (Hook.) St. Hil. et Naud. subsp. I concolor R. E. Fries VIII, 387.
- - subsp. 2. discolor R. E. Fries VIII, 387.
- — var. γ grandiflorum R. E. Fries VIII, 387.
- - var.  $\beta$ . hirsuta R. E. Fries VIII, 387.
- — var. α. tomentella R. E. Fries VIII. 387.
- (- contractum Sweet) IX, 506.
- discissum Schlechtd.) III, 90. (- glechomifolium St. Hil.) IX, 511.
- Hassleranum Hochr. forma \*pilcomayensis Hassl. VIII, 120.
- — forma \*Johnsonii (Ekm.) Hassl. VIII, 120. (- hernandioides Sweet) IX. 491.
- Itatiaiae R. E. Fries VIII. 386.
- var.  $\beta$ . hirsuta R. E. Fries VIII, 387.
- var. α. tomentella R. E. Fries VIII. 386.
- (- Johnsonii Ekm.) VIII, 120. (- laxiflorum Guill. et Perr.) IX, 491. (- - var. paritioides Guill. et. Perr.) IX, 491.
- (- Lechenaultianum Sweet) IX, 506.
- (- leucanthemum St. Hil.) IX, 506. longipes Mattei IX, 412.
- (- Lucianum Sweet) IX 506.

- Abutilon Malmeanum R. E. Fries VIII,387.
- (- mucronulatum A. Gray) IX, 491.
- (- Nealleyi Coult.) IX, 491.
- (- parviflorum St. Hil.) IX, 491. (- parvifl. var. β. luteum St. Hil.) IX,
- 491.
- (- periplocif. Don β. albicans Gris.) IX, 506.
- (- periplocif. var. caribaeum G. Don) IX, 491.
- (- polyanthum Sweet) IX, 491.- pseudostriatum Hochr. VII, 14.
- rotundifolium Mattei IX, 347.
- (- spicatum H. B. K.) IX, 476.
  (- verbascoides Turcz.) IX, 506.
  (- vissadifolium Gris.) IX, 506, 511.
- Acacia accola Maiden et Betche IV, 282. — doratoxylon Cunn. var ovata Maiden et Betche V, 83.
- (- elephantina Burch.) VIII, 489.
- (- elephantorrhiza [Burch.] DC.) VIII, 489.
- \*- Fiebrigii Hassler VIII, 553.
  - fuliginea Baker V, 159. - Gnidium Benth. var. latifolia Maiden
  - et Betche V, 83.
- (— hostilis Mart.) IX, 1. Macalusoi Mattei IX, 250.
  - Mackeyana Ewart and White IX, 63.
- \*- pseudo-adhaerens Hassler VIII, 554.
- \*- Rojasii Hassler VIII, 553. - sambesiaca Schinz V, 338.
- Acaena Albofii Macl. I, 114.

   argentea R. et P. X, 492.
- \*- Buchanani Hook. fil. forma eru-
- bescens Bitt. X, 499. – subsp. \*longissime filamentosa.
- Bitt. X, 499. - cadilla Hook, fil. X, 493.
- (- capitata Phil.) X, 490.
- denudata Reiche X, 493
- elongata L. f. var. \*incisa Bitt. X. 489.
- fissistipula Bitt. IX, 495.

Acaena fissistipula Bitt. var. \*rubristigma Bitt. X, 496.

- integerrima Gill. X, 490.

- macrocephala Poepp. X, 491. - var. Negeri E.Duse III, 127. macrostemon Hook, fil. X, 491.

 magellanica Vahl subsp. 3. laevigata (Ait.) Bitt. X, 491.

- multifida Hook, fil. X, 491.

- ovalifolia R. et P. X, 494.

- - var. \*chamanthera Bitt. X, 495. – var. \*subsexjuga Bitt. X, 495.

- pumila Vahl var. acrocoma Bitt. X, 489.

- rubescens Bitt. X, 493.

- sanguisorbae Vahl. subsp. \*antarctica (Cockayne) Bitt. X, 498.

(- - var. antarctica Cockayne) X, 498. (- - var. aucklandica Bitt.) X, 498. — – var. paucidens Bitt. X, 497.

– var. pilosa Kirk. X, 497.

 – subsp. profunde incisa Bitt, var. \*diminuta Bitt. X, 496.

sericea Jacq. X, 490.tasmanica Bitt. X, 490.

Acalypha australis L. var. lanceolata Hayata I, 57.

\*- Baenitzii Pax V, 227. \*- Buchtieni Pax V, 227.

\*— cuprea Herzog VII, 60. \*— humilis Pax et K. Hoffm. VIII, 162.

\*- mapirensis Pax VII, 110. \*- stachyura Pax XII, 110.

- subcastrata Areschoug X, 303. Acanthephippium splendidum J. J. Sm.

X, 69. Acanthocardamum Thellung nov. gen. IV, 162.

— erinaceum (Boiss.) Thell. IV, 162, 163. Acantholimon Fominii Kusnezow VII, 31.

- langaricum O. et B. Fedtsch. IV, 320.

— lepturoïdes Bunge var. graminifolia Kusnezow VII, 32.

- microstegium Bornm. VIII, 547. - Trautvetteri Kusnezow VII, 31.

Acanthopanax acerifolium Schelle VIII, 347.

- Bockii (Harms) Viguier VI, 45. - Davidii (Franchet) Viguier VI, 45. - Delavayi (Franchét) Viguier VI, 45.

- Rosthornii (Harms) Viguier VI, 45. Acanthophyllum Borsczowi Litw. IX, 554

- squarrosum Boiss, var. hirtum Litwinow VI, 102.

Acanthus latifolius Hortul. V, 210. (- lusitanicus Hortul. The Gard. Chron.) V, 210

- mollis Ball) V, 210.

(— — subsp. platyphyllus Murbeck V, 210.

- var. Viciosi Pau VII, 95.

- Perringi Siehe IV, 120.

\*Acer Bodinieri Léol. X, 433.

(- Boscii Dippel) VII, 272. - Campbellii Hiern var. yunnanense Rehder I, 6.

(— campestre var. varbossanium Maly) VII, 273.

caudatumWall, var.PrattiiRhederl, 7.

\* Cavaleriei Lévl. X, 432.

\*- coriaceifolia Lévl X, 433. - coriaceum Bosc. et Tausch f. creticum

(Ettingsh.) Simk. VII, 272. (— creticum Ettingsh.) VII, 272. (- creticum Tratt.) VII, 272.

\*- Dielsii Lévl. X, 432. - Fargesii Franchet I. 7. - flabellatum Rehder I, 7.

- laetum C. A. Mey. var. tricaudatum Rehder I, 5.

— — var. tomentosulum Rehder I, 6. X — Lángi (illyricum 
 X tataricum) Simk. VII, 272.

- longipes Franchet I, 6. (- montanum Láng) VII, 272.

(- neapolitanum Ten.) VII, 273. - neglectum var. Annae v. Schwerin VIII, 348.

— — var. Friderici v. Schwerin VIII, 348. (- Negundo × californicum Simk.)

VII, 272. (— — var. violaceum Kirchn.) VII, 272.

(- obtusatum Neilr.) VII, 273.

- obtusatum Kit. var. anomalum Pax

f. opuloideum Maly VI. 292.

- - f. pseudopopulus Maly VI, 292. forma neapolitanum (Ten.) Simk. VII. 273.

- Opalus Mill. var. ambiguum Fiori III, 208.

(- opulifolium Posp.) VI, 292.

(- opulus β obtusatum Rchb.) VI, 292. - parvifolium Tausch) VII, 272.

\*- Prainii Lévl. X, 432.

- Pseudo-platanus L. f. Ditrichii (Ortm.) Simk. VII, 273.

forma microcarpum Schwerin et

Bornm. VIII, 348; IX, 143. (- - var. subalpinum Beck) VII, 273. (- - var. subobtusum DC.) VII, 273.

 – var. tricuspidatum Schwerin et Bornm. VIII, 348; IX, 144.

– var. truncatus Loj. Poj. V, 27.

(- - var. vitifolium Tausch) VII, 273. - subobtusum (DC.) Simk. VII, 273. × - tetramerum Pax var. \* lobulatum

Rehder I, 174.

× — varbossanium (campestre × Lobeli) Simk. VII, 273.

— violaceum (Kirclin.) Simk. VII, 272.

— Wilsonii Rehder I, 6.

Aceras longibracteata × anthropophora Terracciano VIII, 493.

Achaenipodium T. S. Brandegee nov. gen. III, 379.

- discoideum T. S. Brandegee III, 379. Achillea atrata Wulf var. monocephala Heimerl IV, 71.

- var. pleiocephala E. Steiger IV, 71. – – forma densiflora E Steiger,

IV, 71.

— — forma densiflora E. Steiger subf. multiflora E. Steiger IV, 71. – – – subf. pauciflora E. Steiger

IV, 71.

— — formalaxiflora E. Steiger IV, 71. — — forma laxiflora E. Steiger subf. multiflora E. Steiger IV, 71.

— — forma laxiflora E. Steiger subf.

pauciflora E. Steiger IV, 71.

— Clavenae L. β intercedens Heimerl f. monocephala Traverso VI, 118.

X — Correvoniana (A. Eu-Herbarota var. Haussknechtiana X nana L.) Vacc. VIII, 363.

- crithmifolia W. K. var. tubiflora

Rohl. I, 36.

× - Evelinae (A. pedemontana Vacc. et Wilcz. α supermacrophylla × Morisiana) Vacc. et Wilcz. IX, 407.

Innulosa Nutt. var. arachnoidea
J. Lunell IX, 404

- macrophylla L. b. exilis Bolzon VIII, 255.

— β hirtella Vacc. VIII, 362.

(- macr. × herbarota All. var. Morisiana [Rchb. fil.]) IX, 407.

- millefolium L. forma perrubriflora

C. G. Westerlund IV, 15.

- nana L. β laxiuscula Heimerl f. platyphylla Wilczek VIII, 363. - Neilreichii Kern. forma villosa

Vandas IX, 527.

- pedemontana Vacc. et Wilcz IX, 407. santolinoides Lag. var. brevifolia Pau III, 326; VII, 348.

— speciosa v. Hayek VI, 148.

× - Suendermanni (A. pedemontana Vacc. et Wilcz.  $\beta$  supermorisiana  $\times$ macrophylla × Wilcz. IX, 407.

× — Wilczekiana (A. Eu-Herbarota var. ambigua × nana) Vacc. VIII, 363.

 forma media Vacc. et Wilcz. VIII, 363.

- forma superambigua Vacc. et Wilcz. VIII, 363.

 forma supernana Vacc. et

Wilcz. VIII, 363.

- Zederbaueri A. v. Hayek VI, 148. Achyrocline luzuloides (Schultz) Vatke B alpina Mattei IX, 415.

– α typica Mattei IX, 414.

 satureoïdes DC. var. discolor Dusén VII, 263.

(Achyrophorus coronopifolius Sch. Bip.) IV, 143.

(- leucanthus Speg.) IV, 143. - magellanicus Schultz) IV, 143 - odoratus Walp.) IV, 143.

- palustris Phil.) IV, 143. (— tenerifolius Remy IV, 143. (Acianthus viridis Hk. f.) IX, 250. Acicarpha laxa R. E. Fries IV, 202.

( - sacchariflora Raddi) IV, 273. (Acmella lanceolata Lk. var.) V, 323.

(- Nuttalliana Raf.) V, 327. (- occidentalis? Nutt. V, 327.

- repens (Wall.) Rich. V, 327. \*Aconitum arizonicum Greene VII, 5.

(- Beckianum Gáyer) VIII, 820. - caucasicum Busch subsp. 2 pubi-

ceps (Rupr.) Busch var. genuinum Busch f. ramosum Busch VII, 28. - var. tuscheticum Busch VII, 28.

- Càvaleriei Lévl. et Vnt. II, 174.

\*- cheirophyllum Greene VII, 4. \*- coreanum Lévl. VII, 101.

\*- coriaceum Lévl. VII, 257. \*- Duclouxii Lévl. VII, 99.

- Fauriei Lévl. et Vnt. II, 178. \*- geranioides Greene VII, 2.

\*- gracilentum Greene VII, 1.

\*- Hanseni Greene VII, 3. \*- Helleri Greene VII, 3 \*- infectum Creene VII, 5.

\*- insigne Greene VII, 5

(- Koelleanum Strobl) VIII, 319. var. pygmaeum Vest.) VIII, 819.

(- laxum Rchb.) VIII, 819. \*- Leibergii Greene VII, 1. (- Lycoctonum Hay.) VIII, 320.

β Beckianum (Gáyer) Hay. VIII, 320.

 L. var. \* circinatum Lévl. VII, 258. ( - Hay. var. puberulum Sér.) VIII, 320.

\*- Mogollonicum Greene VII, 5.

(- multifidum Strobl) VIII, 320. - Napellus L. var. \* alimbum Lévl.

VII, 102.

(? - - var. nanum Baumg.) VIII, 319. \* - napiforme Lévl. et Vant. V, 9.

\*- neo-sachalinense Lévl. VII, 101. - neubergense × rostratum Hay. VIII, 319.

\*- obtusiflorum Greene VII, 4.

( - orientale var.  $\beta$  ponticum Rapaics)X, 306.

platysepalum Greene VII, 2.

- Ponticum Hand.-Mzt. X, 306. puberulum (Sér.) v. Hayek VIII, 220.

(- ranunculifolium Beck) VIII, 320. \*- Robertianum Greene VII, 6.

- septentrionale Kölle var. lutesceus Simmons VIII, 182.

- - var. maculatum Simmons VIII, 182.

\*Aconitum (Stoerkeanum Maly) VIII, 319. \*- subcaesium Greene VII, 4.

- tauricum Koelle y pygmaeum Hay. VIII, 319.

\*- tricorne Greene VII, 3.

(- variegatum Lomak.) VII, 28. (- var. Cammarum Trautv. VII, 28. \*- vestitum Greene VII, 6.

\*- Vilmorinianum Komarow VII, 145.

\*- viviparum Greene VII, 2.

Acoridium anfractum O. Ames. IV, 76.

Copelandii O. Ames IV, 82.
cucullatum O Ames IV, 81. - graciliscapum O. Ames IV, 81.

- graminifolium O. Ames IV, 72. longilabre O. Ames IV, 80.

 Merrilli O. Ames IV. 80. ocellatum O. Ames IV, 79. oliganthum O. Ames IV, 78.
parvulum O. Ames IV, 74.

philippinense O. Ames IV, 77.
recurvum O. Ames IV, 77. - strictiforme O. Ames IV, 76.

tenue O. Ames IV, 74. - tenuifolium O. Ames IV, 73. turpe O. Ames IV, 78.

- venustulum O. Ames IV, 75.

 Williamsii O. Ames IV, 72.
 Acriopsis javanica Reinw. X, 190. Acrodiclidium coppenamense Pulle X,286 Acrolasia desertorum Davidson VII, 42.

– micrantha var. stricta Davidson VII, 41.

 montana Davidson VII, 42. (Acronychia melicopoides F. Muell) V,

- serrata Hochr. VII, 10.

- trifoliata Zoll. var. pauciflora Th. Val. V, 381.

Acrostichum actinolepis Sodiro VI. 281. Angamarcanum Šodiro VI, 277.

- aureum L. var. \* corallina Rosenst. X, 342.

- Christii Sodiro VI, 276.

- cladotrichium Sodiro VI, 279.

 Hieronymi Sodiro VI, 281. Litanum Sodiro VI, 281.

- longissimum Sodiro VI, 276.

- oleandropsis Sodiro VI, 279. Pangoanum Sodiro VI, 278. pellucidum Sodiro VI, 278.

- pteropodum Sodiro VI, 279. subsessile Sodiro VI, 278,
trichophorum Sodiro VI, 279.

(Acrotaphros bibracteată Hochst.) VI,165. Acrotriche serrulata var. ventricosa A. J. Ewart VII, 388.

Actaea asplenifolia Greene V, 320.

 californica Greene V, 397. - caudata Greene V, 320.

- spicata f \* interrupta H. Preuss, VII, 106.

Actinodaphne pedicellata Havata VI, 198. Actinostemma lobatum Maxim. f. a. longiloba Komarow V, 274.

f. b. subintegra Komarow V, 274. Actinotus Gibbonsii F. v. M. var. Baeuer-

lenii Maiden et Betche V. 84. - Paddisoni R. T. Baker V, 158. (Acustelma Grandidieri Baillon) VIII, 443. Adansonia rubrostipa Jumelle et Perrier de la Bathie X, 224.

(Addisonia virgata Rusby) IV, 147. Adelia globularis Small III, 272.

- pinetorum Small III. 271.

Adenocarpus foliosus Ait. var.  $\delta$  Gomeraeus Pitard IX, 210.

\*Adenoncos celebicus Schltr. X, 192. \*- nasonioides Schltr. X, 193.

Adenophora liliifolia (L.) Bess. b. angustifolia Pamp. VIII, 255.

- marsupiiflora Fischer var. jaluensis

Komarow V, 274. (Adenosacme longifolia [Wall.?] King et Gamble) IX, 312.

Adesmia Schikendantzii Gris. IV, 22. Adiantum aneitense Carr. var. \* incisa Rosenst. X, 158.

\*- Baenitzii Rosenst. V, 230.

\*- boliviense Christ et Rosenst. V, 230. formosum R. Br. var. \* leptophyllum Domin IX, 551.

\*- orosiense Christ VIII, 17.

- pedatum L. var. laciniatum L. S. Hopkins VIII, 491.

Schmalzii Rosenst. VIII, 277. \*Adina Fauriei Lévl. VIII, 283. Adinandra formosana Hayata VI, 194. Adolphia infesta Meisn. VIII, 299. Adonis castellana Pau III, 330.

Aechmea lavandulacea C. H. Wright III. 186.

Aegiphila anomala Pitt. VIII, 533. (Aegle decandra Naves) VIII, 489. - marmelos L.) VIII, 488.

- Marmelos Corr. var. subglobosa Hochr. VII, 10.

(Aerides sulingi Bl.) X, 197.

Aerva microphylla Moqu.-Tand. var. humilis Vierh. VII, 143.

\*Aeschynanthus Dunnii Lévl. IV, 453. \*Aeschynomene grandistipulata Harms VIII, 355.

\*- Kassneri Harms VIII, 357.

\*- leptophylla Harms VIII, 356. \*- megalophylla Harms VIII, 855.

\*- oligophylla Harms VIII, 356. pratensis Small III, 265.

\*- rhodesiaca Harms VIII, 356.

(Aetheilema? Moritzi Cat. Pl. Zoll.) IX,

Aethionema Armenum Boiss, var. \* papillosum (Hausskn.) Bornm. X, 175.

Levandowskyi Busch X, 584.

\*Aethionema pallidiflorum Hausskn. et Bornm. X, 176.

\*- recurvum Hausskn. et Bornm. X,176. \*- Sintenisii Hausskn, et Bornm, X, 174. Aframomum Thonneri De Wild. X, 423. \*Aganosma Schlechterianum Lévl. IX,

325.

\*Agapetes Hosseana Diels I, 16. - speciosa W. B. Hemsley VI, 319. Agave aboriginum Trelease VII, 332.

- carchariodonta Pamp. VIII, 399. - Deweyana Trelease VII, 333. - Endlichiana Trelease VII, 332. - Lespinassei Trelease VII, 332.

 littaeaoïdes Pamp. IX. 832. Wrightii J. R. Drumm. VIII, 337.)
 Zapupe Trelease VII, 332.

(Agelaea pinnata King) X, 243. Ageratella Palmeri Robinson I, 38. (Ageratum paniculatum Hort.) IV, 155. (- sessilifolium Schauer IV, 149.

Agialida abyssinica v. Tiegh. VII, 116.

— arabica v. Tiegh. VII, 117.

— Barteri v. Tiegh. VII, 118.

— Chevalieri v. Tiegh. VII, 119.

— cuneifolia v. Tiegh. VII, 116.

— ferov (Poir.) v. Tiegh. VII, 110. ferox (Poir.) v. Tiegh. VII, 119.
glomerata v. Tiegh. VII, 118.

- Idifolia v. Tiegh. VII, 115.
- Idifolia v. Tiegh. VII, 117.
- membranacea v. Tiegh. VII, 115.
- nigra v. Tiegh. VII, 117.
- palestinaca v. Tiegh. VII, 117.
- rotundifolia v. Thiegh. VII, 117.
- Schimperi v. Tiegh. VII, 116. - senegalensis v. Tiegh. VII, 118.

- tombouctensis v. Tiegh. VII, 118. Agiella nov. gen. v. Tiegh. VII, 119. - angolensis (Wellw. mss.) v. Tiegh.

VII, 119. var. superreticulata v. Tiegh.
 120.

 Welwitschii v. Tiegh. VII, 120. Aglaia elaeagnoidea Benth. var. glabrescens Valeton VII, 13.

elliptica Bl. var. grandifolia Valeton

VII, 13.

 var. lanceolata Valeton VII, 13. Agoseris australis (Phil.) Macl. IV, 143.

- glauca (Nutt.) Macl. IV, 144. - - var. aspera (Rydberg) Piper VIII, 269.

– var. scorzoneraefolia (Schrad.) Piper VIII, 269.

Agoseris heterophylla var. califormia (Nutt.) Piper VIII, 269.

(- - var. cryptopleura Greene) VIII, 269. — var. glabra Howell VIII, 269.

— var. glabatra (Suksdorf) Piper VIII, 269.

 subsp. normalis Piper) VIII, 269. - leontodon var. asperum Rydberg) VIII, 269.

Agoseris pterocarpa (Fisch. et. Mey.) Macl. IV, 144.

- pumila (DC.) Macl. IV, 144.

(- scorzoneraefolia Greene) VIII, 269. Agriophyllum Paletzkianum Litwinow IX, 585

(Agropyron dasystachyum var. subvillosum Scribn. u. Smith) VI, 75.

- litorale (Host) Dum. b. lucanum Terracciano V, 142.

- repens P. B. b. murense Terracc.

V, 141. - saxicolum (Scribn. u. Smith) Piper

VI, 75. — spicatum var. puberulentum Piper

VI. 75.

(-- var. pubescens Elmer) VI, 75. - subvillosum (Hook.) Piper VI, 75. (Agrostis aenea Spreng.) V, 359.

(- aenea Trin.) V, 359. × - alba L. var. \* aurea Domin I, 4. - c. murensis Terraçc. V, 142.

 – var. prorepens A. Fl. Br. m. fasciculata Zobel IV, 800.

 alpina L. var. glaucescens E. Steiger III, 234.

 alpina Scop. forma major Murr III, 137.

( - altissima Tuckerm.) V, 359. - ampla Hitchc. V, 357.

- Biebersteiniana Claus var. densior Hack. VI, 151.

\*- bogotensis Hack. VIII, 518. breviculmis Hitche. V, 357. \*- Buchtienii Hack. II, 69.

(— canescens Gris) IV, 341. (— canina aenea Trin) V, 359. (- - melaleuca Trin.) V, 359.

 castellana Boiss, et Reut, a. communis Menezes V, 117.

densior Grecescu) VI, 151.diegoensis Vasey) V, 357. ( - exarata aenea Griseb. V, 359.

( – foliosa Vasey) V, 357. ( – geminata Trin.) V, 358.

- Hackelii R. E. Fries IV. 88. - - forma viridiflora Hackel IV, 310. - Hallii Vasey var. Pringlei (Scribn.)

Hitchc. V, 357.

- hiemalis (Walt.) B. S. P. subsp. geminata (Trin.) Hitchc. V, 358.

 – subsp. subrepens Hitchc. V, 358. \* - Jürgensii Hack. VII, 318.

- longiligula Hitchc. V, 359.

\*- macrothyrsa Hack. VII, 318. - melaleuca (Trin.) Hitchc. V, 359.

( – nana Kunth) V, 357. ( – nardifolia Gris.) IV, 341.

(- pallens Trin. var. foliosa (Vasey) Hitchc.) V, 357.

perennans (Walt.) Tuckerm, var. elata (Pursh) Hitchc.) V, 359.

(Agrostis Pringlei Scribn.) V, 857.

(- radiata L.) X, 289. \*- Rockii Hack. X, 167. (- rosea Gris.) IV, 278.

- spica venti L. forma macra Hackel IV, 301.

- Thurberiana A. S. Hitchc, V. 356. \*Agrostophyllum celebicum Schltr. X. 40. - megalurum Reichb. f. IX, 96.

(- Reineckeanum Krzl.) IX, 96.

\*- simile Schltr. X, 39. Aichryson Mollii Pitard IX, 275. (Ailanthus excelsa Bennett) VI, 191. - Giraldii Dode VII, 8.

(- grandis Prain) VI, 192. - sutchuensis Dode VII, 8. (- Vilmoriana Dode (VI, 191. - Wightii van Tieghem VI, 191. Ainsliaea elegans Hayata VI, 25. (Aira arctica Trin.) VIII, 78.

(- brevifolia Lange) VIII, 78. (- caespitosa forma alpina Krunse) VIII, 78.

 – var. arctica (Trin.) Simmons VIII. 78.

- - var. borealis Trauty VIII, 78. - - var. brevifolia Gelert) VIII, 78.

indica L.) V, 306.spicata L.) V. 306.

Aizoon glabrum A. J. Ewart VIII, 409. Rodwayi A. J Ewart VIII, 410.

\*Ajuga Chaneti Lévl. et Vant. VIII, 258. \*- devestita Lévl. et Vant. VIII, 259.

\* - Fauriei Léol. et Vant. VIII, 259. - formosana Hayata VI, 197.

(- humilis Miq.) VIII, 111.

- genevensis L. f. stolonifera Semler II. 100.

Akebia Chaffanjoni Lévl. VI, 372. Alafia Perrieri Jumelle IX, 576.

Alangium bogoriense Wangerin IV, 338.

( - costatum Wang.) IV, 338. - Mezianum Wang. IV, 338. - myrianthum Wang. IV, 339.

Albizzia adianthifolia (Schum.) W. F. Wight VIII, 488.

\* - macradenia Harms X, 128. \* - tenuispica Harms X, 128.

Albuca acuminata Baker II, 194. affinis Baker III, 59.

 bifolia Baker II, 193. - brevipes Baker II. 194. - circinata Baker II, 194. concordiana Baker III, 59.

 Dalyae Baker II, 193. - Iongifolia Baker II, 194. - Iongipes Baker II, 195. - micrantha Baker II, 195. - Schlechteri Baker II, 195.

- Schoenlandi Baker II, 195. - semipedalis Baker II, 194.

- zebrina Baker II, 194,

Alchimilla abchasica Buser VI, 142.

- acutangula Bus. forma multicaulis Westerlund X, 866.

 acutiloba Stev. subsp. arvanica Buser VI, 63.

 – var. hirsutiflora Buser VI. 138. alpina L. subsp. amphisericea (Buser) var. amphiargyrea (Buser) Maire et Petitmengin VI, 3.

(- amphiargyrea Buser) VI, 8.

arvensis L. f. pygmaea Witte II, 121.
Brachetiana Buser VIII, 211.

 divaricans Buser VI, 138. - Ducis Aprutii Cortesi VI, 189.

 dura Buser VI, 138. elata Buser VI, 141.

 filicaulis Buser subsp. hyrcana Buser VI, 140.

- flabellata Buser var. semicuneata Buser VIII, 212.

 – var. taurica Buser VI, 63. flavicoma Buser II, 150.

 glomerulans Bus. f. dasycalyx Westerl. V, 310.

- - f. glabrior Westerl. V, 311. - hybrida L. form. Guarensis Pau

– forma macroclada Pau VII, 85.

- languida Buser VI, 137.

- minusculiflora Buser VI, 143.

 opaca Buser III, 236. pastoralis Bus. f. praticola Westerl. V, 311.

pilicincta Buser VI, 140.
procumbens Rose V, 155.
pubescens Willd.) VI, 135.

radiisecta Buser IV, 127.

(- rigida Buser) VI, 136.- Roccatii Cortesi VI, 190.

 sericata Rchb. subsp. I. eu-sericata Buser VI. 135.

- - - f. angustiloba Buser VI, 136. – – f. latiloba Buser VI, 186.

- - subsp. II. Tephroserica Buser VI, 136.

 – subsp. III. Rigida Buser VI, 136. - sericea W. subsp. chlorosericea Buser VI, 64.

– subsp. Raddeana Buser VI. 64.

Steveni Buser VI, 63.

- subalpestris Rose V, 156.
- subglobosa Westerl. V, 310.
- subsplendens Buser VI, 142.

- tridentata Cortesi VI, 190. - truncatula Buser VI. 139.

 Vaccariana Buser IV, 127. - valdehirsuta Buser VI, 140. Vetteri Buser var. eusericea Buser

VIII, 803.

 vulgaris δ Biebersteinii Boiss. VI, 135. (- - var. caucasica Beck) VI, 135. \*Alchornea sclerophylla Pax VII, 242.

Alectorolophus arvensis Semler var α purpureostriolatus Semler II, 100.

- - var.  $\beta$  sudeficoideus Semler II. 100.

Brigantinus Gross III, 96.

-dubius Poeverl. I, 144.

- eumaior Sterneck var. leucodon Semler II, 100.

– – f. gracilis Semler II, 100.

- pseudolanceolatus Semler II, 100. (Alectra striata Benth.) X, 348.
\*Aletris Fauriei Lévl. et Vant. V, 283. (Aleurites cordata Muell.-Arg.) V, 260.
- Fordii Henisl. V, 260. (Aligera mamillata Suksdorf VIII. 269.

(Alisma arcuatum Mich. var. angustissimum [Aschers. et Graebn.] Lunell VIII, 244.

(-- var.)lanceolatum [Buchenau]

Lunell) VIII, 244.

\*- coreana Lévi. VIII, 286.

- Geyeri Torr. var. angustissimum Lunell VIII, 244.

- - var. lanceolatum Lunell III, 244. - superbum Luneil VIII, 244.

\*Alixia myrtillae folia (Gray) Lévl. X,

(- olivaeformis Gaud. var. myrtillaefolia Gray) X, 155.

\*Allenia Ewart nov. gen. IX, 64.

- Blackiana Ewart and Rees IX, 64. - - var. microphylla Ewart and Rees IX, 64.

Alliaria alliacea (Salisb.) Rendle et Britten VIII, 321, 436.

Alliaria A. Kern.) VIII, 321.
officinalis Andrz.) VIII, 321, 436. Allionia hirsuta Pursh var. rotundifolia Lunell VIII, 244.

Allium Ampeloprasum L. var. commu-

tatum Sommier VIII, 494.

- var. haemisphaericum Sommier VIII, 494.

Argyi Lévl. III, 370.

(- commutatum Parl.) VIII, 494. - gulczense B. Fedtsch. IV, 320.

- hyacinthoides B. F. Bush IV, 213. - isphairamicum B. Fedtsch. IV, 820.

Jatasen Lévi. III, 371.

\*- Mairei Lévl. VII, 339, 384.

- paniculatum L. var. parvum Pau III, 329.

(- peninsulare Jones) IV, 13.
- praecox T. S. Brandegee IV, 13.
- pskemense B. Fedtsch. III, 56.

- roseum L. subsp. (vel. var.) Javorjense Rohl. 1, 38.

(- rotundum Guss.) VIII, 494.

- Ruhmerianum Ascherr. IX, 473.

- sessile R. E. Fries IV, 86. \*- Taqueti Lévl. et Vant V, 283. \*- Tchongchanense Lévl. VI, 263. (Allium tenuiflorum Rouy) III, 329. \*- trilophostemon Bornm. X, 288.

(Allocarya humistrata Greene VIII, 267. - subglochidiata (A. Gray) Piper VIII, 267.

\*Allomorphia Bodinieri Lévl. V, 100.

- Cavaleriei Lévl. et Vant. IV, 94. Allophylus Cobbe Cooke, non Bl. VIII.85.

serrulatus Radik. VIII, 185.
subfalcatus Radik. VIII, 186.

\*Alniphyllum Fauriei Perkins IV, 1.

Alnus Alnobetula Hart, var. Foucaudii Briquet III, 121.

(- - (Ehrh) Hartig var. stenophylla H. Winkler) X, 227.

× - Aschersoniana (A. rugosa × incana) Call. var. \*pomeranica Call. X, 232. (- brembana Fouc. non Rota III, 121. cordata Desf. var. genuina (Regel)
 H. Winkler forma \*parvifolia Call. X, 228.

– – forma \*vulgaris Call. X, 228.

(- dubia Requ.) X. 231,

×\* – fallacina (A. rugosa × serrulata) Call. X, 232.

(-- var. macrocarpa Requ.) X, 230

(— var. sublobata Zapal.) X, 230 (— var. subserrata Zapal.) X, 231 (— var. tenuifolia Call.) X, 231

(- - formalobulata Brenner) X, 231

(- - - forma pilosa Brenner) X, 231

(- - f. subpilosa Brenner) X, 231 — var. vulgaris forma \* bosniaca

(Beck) Call. X, 230

— — forma \* cuneata Call. X, 280

— — forma \* dubia (Requ.) Call. X, 231

- - forma imberbis Call, subforma \* microphylla Call. X, 231

— — forma \* macrocarpa (Regu.)

Call. X, 230 — — forma parvifolia O. Ktze. sub-

form. \* Iobulata (Brenner) Call. X, 281 — — — subforma minuticarpa Call.

— — forma pilosa (Brenner) Call. X, 231

— — forma puberula Call. subforma \* subpilosa (Brenner) Call. X, 231

- - forma \* subimberbis Bornm. X, 230

— — forma \* sublobata (Zapal.) Call. X, 230

— — forma \* subserrata (Zapal.)

Call. X, 230

 fruticosa Rupr, var. mandschurica Call. forma \* grandifolia Call. X, 227.

- - forma \* normalis Call. X, 227. - - var typica Call. forma \* macrophylla Call. X, 226.

– – forma vulgaris Call. X, 226.

40 (Alnus glauca Michx.) X, 235. (- glutinosa Gaertn. var. bosniaca Beck) X, 230. ( — — var. cylindrostachya H. Winkler) X, 230. (- var. japonica Matsum.) X, 229. ( - - × incana Krause) VI, 242. ( − − − forma media Brenner) X. 320. — — forma tenuifolia Call. X, 233 - hirsuta Turcz forma \* typica Call. X, 233 — — forma \* macrophylla Call, X, 233 - -- var. vulgaris Call. forma \* typica Call. X, 233 – glutinosa × rugosa var. \* ma-crocarpa Call. X, 232 — — X — var. \* vulgaris Call. X, 232 X— hybrida (A. glutinosa X incana) A. Br. var. \* viridior Call. X, 232 (- japonica Sieb. et Zucc. VIII, 347 — — var. \* arguta (Regel) Call. X. 229 - var. \* formosana (Burkill) Call. X, 228 var. \* genuina Call. X, 228
var. \* koreana Call. X, 229 - var. \* latifolia Call. X, 228 - incana Moench X, 234 (-- var. argentata form. subsericea Call.) X, 235 var. borealis forma \* acutiloba
 Call. X, 237 -- - forma \* Blyttiana Call. X, 287 — — forma \* cordifolia Call. X, 237 -- - forma \* flavescens (Kihlm.) Call. X, 237 — — forma \* vulgaris Call. X, 237 — var. \* Bornmülleri Call. X, 236 (— — var. emarginata Matsum.) X, 234 (-- var. flavescens Kihlm.) X, 237 — — var. \* glauca (Michx.) Call. X, 235 - - var. glaucophylla Call. forma \* brachyphylla Call. X, 236 -- - forma \* crataegifolia Call. X, 236 — — forma \* microconus (L. M. Neumann) Call. X, 237 - - forma \* oxyloba Call. X, 236 — — forma \* pinnatisecta Call. X, 236 ——— forma \* subcordifolia Call. X, 236 - - forma \* typica Call. X, 235 - - var. hypochlora Call. forma \*microconus (L. M. Neumann) Call. X, 237 — — forma \* normalis Call. X, 237 - - var. nana Brenner X, 320 var \* obtusifolia Call. X, 236
var. \* ovalis Call. X, 235 – var. \* pseudospuria Call. X, 237

( - - × rotundifolia v. Hayek VI, 242

- - var. subsericea Appel) X, 235

Alnus incana var. subrotunda Call. forma \* argyrophylla Call. X, 285 — — forma \* microcarpa Call. X, 235 - - forma \* normalis Call. X, 235 - - var. vulgaris Spach forma dubia subf. \* subargentea Call. X, 234 — — forma \* microphylla Call. X, 234 — — forma \* subargentea Call. X, 234 - - forma \* subcordata Call. X, 234 — — forma subsericea (Appel) Call, X, 234 ( - maritima Nutt. var. argula Regel) X, 229 (-- var. formosana Burkill) X, 228 \* Matsumurae Call. X, 234 - Maximowiczii Call. var. \* parvifolia Call. X, 227 - - var. \* typica Call. X, 227 (— oblongifrons Borbas) X, 237 — orientalis Decne var. Weissii H. Winkler forma \* puberula Call. X, 228

— — forma \* Winkleri Call. X, 227 (- pubescens Tausch) VI, 242 rhombifolia Nutt. var. \* typica Call. X, 229 \*— Schneideri Call. X, 229 \*— serratuloides Call. X, 229 - silesiaca Fiek X, 231. — sinuata Rydb. var. \* stenopliylla (H. Winkler) Call. X, 227 Spaethii Callier VIII, 347 (- spuria Callier) VI, 242 (— — subsp. Beckii var. ambigua Beck forma viridior Call.) X, 232 (— subcordata C. A. Mey.) VIII, 347 — var. \* typica Call. X, 228 tinctoria Sargent var. \* glabra Call. X, 233 - - var. \* mandschurica Call. X, 233 — — var. \* obtusiloba Call. X, 233 — — \* typica Call. X, 233 - viridis DC. var. Brembana (Rota) Call. forma \* pilosa Call. X, 226 — — forma \*typica Call. X, 226 — — var. microphylla Call. forma \* hirtella Call. X, 226 - - forma \* typica Call. X, 226 - - var. \* repens (Wormskj.) Call. X, 226 — — forma\*macrophylla Call. X, 226 — — forma \* pubescens Call. X, 226 — — forma \* typica Call. X, 226 — — var. subvestita Zapal. forma grandifolia (Beck) Call.subforma\*glabra Call. X, 227 — — — subforma\*hirta Call. X,225 - - var. typica Beck forma subvestita (Zapalow.) Call. X. 225.

Alnus tinctoria var. forma \* vulgaris Call. X, 225 — Yasha Matsum. var. \* macrocarpa Call. X, 227 - - var. \* microcarpa Call. X, 227 - var. \* typica Call. X, 227 Aloe bamangwatensis Schönl. II, 182 - Chabaudii Schönland IV, 170 - Davyana Schönl. II, 184 - decora S. Sch. IV, 177 - Dyeri Schönl. II, 184 - Greatheadii Schönl. II, 181 laxiflora N. E. Brown IV, 865
 Orpenae S. Schönland IV, 176 - parvispina Schönl. II, 184 -- Peglerae Schönl. II, 181 Alomia dubia B. L. Robinson IV, 147 Alopecurus aristulatus Michx. var. natans (Wahlenb.) Simmons VIII, 181 (— arundinaceus Poir.) V, 360 \*— Bornmülleri Domin I, 4 - creticus Trin. var. submuticus Rohl. (- fulvus subsp. perennaus [Norm.] Hagld.) VIII, 181 (— geniculatus γ fluitans Blytt) VIII, 181 (- - ssp. intermedius Blytt) VIII, 181  $(--\beta)$  natans Wahlenbg.) VIII, 181 — — forma Normani Simmons VIII, 399 - Gerardi Vill. var. Pantocsekii Rohl. I, 28. \*-- heleochloides Hack. X, 166 (- hordeiformis Willd.) V, 70 (− myosuroides × pratensis A u. G.) V, 360 (- nigricans Hornem.) V, 360 (- pratensis × agrestis Brügger) V, 360 - prat. ssp. ventricosus (Pers. pro. spec.) Thellung V, 360 (— rubicundus Ham.) V, 67 (— turicensis Brügger) V, 360 Alsine Aucheriana Boiss. var. glandulosa Litw. VI, 103 (- austriaca Wahlenb.) VII, 33 (- banatica Bluff et Fingerh.) VII, 33 (— Bauhinorum Gay) VII, 34 (— cataractarum Janka) X, 305 - Cherleri var. ciliata Wohlf.) VII, 34 - condensata Fenzl) X, 305. - eurytanica Boiss.) X, 305 - falcata Griseb.) X, 305 - frutescens var. Verschetzensis Simk.) X, 305 (-- Gerardi Wahlenb.) VII. 33 glutinosa Heller IV, 61 (- heterosperma Guss.) IX, 350 (- hirsuta Fenzl) X, 304 (- - var. vestita Fenzl) X, 304

(— laricifolia β glandulosaKoch) VII, 34

(- liniflora Heg.) VII, 34

- pinifolia Fenzl) X, 305

- pulvinaris Boiss.) X, 305

(Alsine recurva Hal.) X, 30 (-- β condensata Halácsy.) X, 305 - - c. glandulifera Vacc. VIII, 328  $(--\beta)$  hirsuta Boiss.) X, 304, 305  $(--\alpha \text{ nivalis Boiss.}) X, 304, 305$ (- setacea M. K.) VII, 33  $(--\beta)$  banatica Heuff.) VII, 33 (- striata Cr.) VII, 33 - tenuifolia Whlnbg. c. congestillora Terracc. V, 136 (- Thevenaei Reuler) X, 305 - Velenowskyi Rohl. I, 22 (- verna β alpina Koch) VII, 33 - - c. pubescens Terracc. V, 136 (Alsinella ciliata Greene) VI, 169 (Alsodeia mongalaensis De Wild.) X, 430 (- Thonneri De Wild.) X, 523 Alsophila aquilina Christ var. \* Maxoni Rosenst. VI, 179 atrovirens Presl var. \* elongata Christ VI, 349 \*- biformis Rosenst. IX, 423 \* canelensis Rosenst. VII, 290 \*- Francii Rosenst. X, 158 \*— Kuhnii (Hieron.) C. Chr. X, 213 \*— phalaenopsis C. Chr. X, 213 \*- tarapotensis Rosenst. VII, 291 -- tomentosa H. K. var. \* novoguineensis Rosenst. V. 34 Alstroemeria Radula Dusén VII, 264 \*Altensteinia Fiebrigii Schltr. X, 445 (- pilifera H. B. K.) X, 481 Alternanthera microphylla R. E. Fries IV, 36 - Moquinii (Webb) var. villosa Dusén VII, 262 Alysicarpus Macalusoi Mattei IX, 320 Alyssum diffusum Ten. var. corymbosum Pau VIII, 182 — montanum var. magnum Wildt V, 190 - myriophyllum Loj. Poj. III, 333 (- Vesicaria L.) VI, 128 \*Alyxia Schlechteri Lévl. IX, 453 Amarantus chlorostachys Willd. var. pseudo-reflexus Thell. V, 362 - retroflexus L. var. Delilei (Richter et Loret) Tell. V, 362 - Delilei Richter et Loret) V, 362 Amberboa leucantha (Cosson in herb.) Batt. X, 218 maroccana Barratte et Murbeck V, 208 \*Amblostoma holochilum Schltr. X, 387 \*Amblyanthopsis philippinensis Mez III, 100 Amblystigma pilosum Malme I, 141 Ambrosia artemisiaefolia subsp. diversifolia Piper VIII, 270 (Ambulia trichophylla Kom.) V, 273 Amelanchier alnifolia Nutt. var. elliptica (Nels.) C. K. Schn. III, 182

Amelanchier alnifolia var florida (Ldl.) C. K. Schn. III, 182

— var. pumila (Nutt.) C. K. Schn. III. 182

asiatica (S. et Z.) Endl. var. sinica
C. K. Schn. III, 181

(- denticulata var. nervosa C. K Schn.)
III, 183

(- - var. psilantha C. K. Schn.) III, 183

Jonesiana C. K. Schn. III, 182
mormonica C. K. Schn. III, 182

-- siskiyouensis C. K. Schn. III, 181 -- vulgaris Mch. var. grossedentata Rohl. I, 35

Ammodenia peploides var. major (Hook.)

Piper VI, 169

(Ammogeton scorzoneraefolium Schrad.) VIII, 269

\*Amonum Vignaui Rech. IV, 228

Amphidoxa adscendens O. Hoffm. III, 258, VI, 371

Amphipogon strictus R. Br. var. \* desertorum Domin X, 119

(Anabasis articulata Webb) III, 325 — hispanica Pau III, 325

(Anacyclus Alexandrinus Batt. et Trab.) IX. 467

— Willd. var. β cyrtolepidioides
 (Pomel) Durand et Barr. IX, 467
 (— cyrtolepidioides Pomel) IX, 467
 Anagallis uruguayensis Arechav. IX, 492

Anaphalis Nagasawai Hayata VI, 26 Anastraphia cuneifolia Greenman VI, 249 (Anatropa tenella Ehrenberg) VI, 104 Anchusa calcarea Boiss. var. γ nana

P. Cout. VI, 187

(- glabrescens f. nana Maritz) VI, 187

(- Granatensis Boiss.) VI, 189 (- hybrida Ten.) VI, 188

italica Retz var. sublanata Thell.
 V, 366

(- nana Samp.) VI, 187

(— undulata Brot.) VI, 188 (— undulata Ficalho) VI, 188

(- undulata Gren. et Godr.) VI. 188 - var. δ granatensis P. Cout.

VI, 189

- var. γ hybrida P. Cout. VI, 188
- var. α subvelutina P. Cout.

VI, 188

- var. β typica P. Cout. VI, 188
 Ancistrochilus Rothschildianus J. O'Brien VI, 318

Andira coriacea Pulle X, 286

\*Andrachne Esquirolii Lévl. IX, 327

Gruvelii Daveau V, 190
 Androcymbium albanense Schönl. II, 183
 (Andromeda myrsinites Lam.) IV, 138
 Andropogon Barteri Hack. var. Menyharthii Hackel V, 335

(- capense Houttuyn) X, 289

(Andropogon circinatus A. Terracc.) VI, 7 (— condensatus Kth. var. elongatus Hack.) IV, 306

(- crassipes Steudel) X, 289 (- fasciculatum L.) X, 289

fasciculatum (L.) Thell. X, 461
 Hassleri Hack. var. \* aristatus Hack.
 VI. 341

\*— Herzogii Hack. VII, 49

( — imberbis var. α genuinus Hack.) VI 341

 $(-- \text{ var. } \beta \text{ muticus Hack.}) \text{ VI, } 341$ 

(- insulare L.) IV, 29 - Jeffreysii Hack, VI, 324

— Jeffreysii Hack. VI, 324 — mobukensis Chiov. VI, 179

paniculatus Kunth var. elongatus
 Hackel IV, 306

\*- Salzmanni (Trin.) Hack. VI, 341

\*— — var.  $\beta$  aristatus Hack. VI, 841 \*— — var.  $\alpha$  genuinus Hack. VI, 841

\*Andropus A. Brand nov. gen. X, 281
\*— carnosus (Wooton) Brand X, 281
Androsace aurata Petitmengin IX 334

Androsace aurata Petitmengin IX, 334 (— Chamaejasme auct. americ., non Willd.) IX, 488

\*- - Host var. \* tibetica Kunth II, 66

(— Gormannii Greene) X, 511 \*— Gustavi Knuth III, 84

(— longifolia Turcz) II, 66

— septentrionalis L. fórma apoda Litw. IV, 10

— var. Gormannii (Greene) C. H. Ostenfeld X, 511

Androsiphonia Stapf n. gen. III, 85

— adenostegia Stapf III, 85

Andryala integrifolia L var. 4. divisa Merino VIII, 287

Aneilema Bodinieri Lévl. et Vant. IV, 115

— Cavaleriei Lévl. et Vant. IV, 115

coreanum Lévl. et Vant. IV, 115
Keisak Hassk. f. \* minor. Kom. IX, 392

\*— nutans Lévl. IX, 450 \*— Taquetii Lévl. VIII, 284

Aneimia anthriscifolia Schrad var.

\* simplicior Christ VI, 351 \*— sessilis (Jeanpert) C. Chr. I

\*— sessilis (Jeanpert) C. Chr. IX, 371 (— tomentosa Sw. var. sessilis eanpert) IX, 371

\*Anelytrum Hack. nov. gen. VIII, 519

\*— avenaceum Hack. VIII, 519

Anemone albana Stev. subsp. 1. flavescens (Regel) Smirn.form. angustisecta Busch VII, 28

\*— Bonatiana Lévl. VII, 98

 debilis Fisch var. soyensis (de Bois.) Makino VIII, 107

\*— Esquirolii Lévl. et Vant. VIII, 58 IX. 446

- Hepatica L. IV, 155

— — forma candida J. Holmboe IV, 156

Anemone Hepatica forma ciliata J. Holmboe IV, 155

 forma divergens I. Holmboe IV, 157

- - forma hirta J. Holmboe IV, 155 forma lilacina J. Holmboe IV, 156

- - forma marginata J. Holmboe IV, 156

– – forma spectabilis J. Holmboe IV, 156

 forma tridactylites J. Dyring IV, 157

- lus. biloba J. Holmboe. IV, 157 -- lus, feminea I. Holmboe IV, 157 - nemorosa L. var. biflora Zobel

VIII, 349

Anemone nemorosa forma flavescens C. G. Westerlund IV, 19

 forma quadrifoliata C. G. Westerlund IV, 19

\* - saniculifolia Lévl. VII, 383 - Siuzewi Komarow V, 278

(- soyensis de Bois.) VIII, 107 (Anemopaegma decorum Sp. Moore) IX, 49

 grandiflorum T. A. Sprague II, 141 - Mirandum A. DC. var. \* hirsuta Hassler IX, 54

Angianthus axiliflorus (W. F. Fitzgerald in ed.) Ewart and White IX, 174

 strictus var. lanigerus Ewart IX, 134 Angraecum filicornoides De Wildem. III, 164

\*— hologlottis Schltr. III, 82

Anguillicarpus Burkill nov. gen. V, 250 - Bulleri Burkill V, 250

Anguria limonensis Pittier VIII, 535 Magdalenae Pittier VIII, 535

- Treslingiana Pulle X, 413 \*Aniba foeniculacea Mez III, 65 (Aniseia cernua Meissn., haud Moric.) IX, 156

(- cernua Moric.) IX, 156

— var. ambigua Meissn.) IX, 156 - syringifolia Dammer) VIII, 235 (Anisocalyx limnanthiflorus Hance) VI, 196 (Anisocarpus madioides Nutt.) VIII, 271 \*Anisodus Fischerianus (? A. luridus × tanguticus) Pascher VII, 226

(- luridus Link et Otto) VII, 167 \*- Mariae Pascher VII, 227

\*- sinensis Pascher VII, 167 \*- tanguticus Pascher VII, 167

(- - var. umbrellula Pascher) VII, 227 \*Anisopappus candelabrum Lévl VIII, 451 \*Anisosciadium isosciadium Bornm. X, 468

\*Anoectochilus insignis Schltr. X, 13

\*-siamense Schltr. II, 83

(Anona crotonifolia Warm.) II, 192 \*- nano-fruticosa Herzog VII, 51 - tonientosa R. E. Fries II, 192

Anotites picta Greene V, 319

Antennaria acuminata Greene VI, 162 - aprica Greene var. rosea Lunell VIII, 247

- athabascensis Greene VI, 28

- callilepis Greene VI, 162 - chlorantha Greene VI, 163 - concolor Piper VIII, 274

- Greenei B. F. Bush. IV, 216 - lanulosa Greene VI, 164

- maculata Greene VI, 164

- neodioica Greene var. Gaspensis Fernald VII, 336

\*- obtusata Greene V, 241 - Sansonii Greene VI, 163

- sedoides Greene VI, 163 - solstitialis Lunell V, 220

- stenolepis Greene VI, 162 (Anthaenantia Hackeli Arech.) IV, 29 (Anthemis arvensis × Cotula ? Nacg. und Thell.) V, 368

- carthaginensis Pau III, 326

- Cotula L. var. canescens Thell. V, 368

 – var. latisecta Thell. V, 368 - Georgieviana Davidoff I, 126

- glareosa Durand et Barr. IX, 354

(- repens Walt.) V, 327 - riloensis Velen. I, 134

(- stipulacea Moench) VIII, 488

\*- syriaca Bornm. X, 470

- Tauberti Durand et Barr. IX, 353 - tinctoria L. var. pallescensV. Calestani VII, 386

- virescens Velen. I, 134

Anthericum ramosum L. var. bracteatum Hsm. III, 142

(- reflexum Cav.) V, 191

Anthobembix dentatus Th. Valeton V, 379, VII, 182

Antholyza Thonneri De Wildem. X, 423 Anthoxanthum odoratum L. var. longiaristatum (Celak.) A. et Gr. lusus lobatus Hackel IV, 300

Anthriscus glabra Loj-Poj. VI, 37 Anthurium Forgeti N. E. Brown IV, 367 Anthyllis Vulneraria L. var. pyrenaica Pau IX, 191

Anticharis somalensis Vierh. VII, 162 Antidesma mucronata Boerl, et Koorders X, 318

- oblongifolia Boerl, et Koorders

X, 318 – Seguini Lévl. IX, 460

(Antiphylla grandiflora Jord.) VIII, 331 \*Antiphytum Bornmülleri Pilger III. 24 - - var.\* asperior Pilger III, 25

(Antirrhinum bellidifolium var. lanceolatum Rouy) VIII, 218

(- lanigerum Brot.) VIII, 217

(- lusitanicum Brot.) VIII, 217

var. pilosum Merino VII, 363 (- microcarpum Pomel) IX, 469 Orontium L. var. γ microcarpum (Cosson) Dur. et Barr. IX. 469 (- pinifolium Poir.) X, 291 (- polygalaefolium Brot.) VIII, 217 (— reticulatum Sm.) X, 291 (— spurium Brot.) VIII, 217 (- tenellum Pursh) VIII, 267 - virgatulum Brot.) VIII, 218 (Anvillea australis Chev.) IX, 353 radiata Coss. et D.R. var. B australis (Chev.) Durand et Barr. IX, 353 Apera intermedia Hackel VI, 151 (Aphano octandra K. et V.) IV, 235 (Aphano octandra var. tetraquetra Koord.) IV, 235 rostrata Mig. IV, 234 \*— skiophila (Duthie) Val. IV, 235 \*— tetraquetra (Miq.) Val. IV, 235 Aphanomyrtus camphorata Val. IV, 235 \*Aphelandra jacobinioides Lind. I, 156 \*\_ cirsioides Lindau I, 157 \*Aphyllorchis gracilis Schltr. X, 8 (Aplopappus carthamoides A. Gr.) VIII, — — var. Cusickii A. Gr.) VIII, 270 - Greenei var. var. mollis A. Gr.) VIII, 271 (— Hallii A. Gray) VIII, 270 (— hirtus A. Gray) VIII, 270 (— lanuginosus A. Gray) VIII, 270 (— Lyallii A. Gray) VIII, 270 - mollis A. Gr.) VIII, 271 - racemosus Torr.) VIII, 270 - stenophyllus A. Gr.) VIII, 271 Apocynum androsaemifolium subsp. detonsum Piper VIII, 15 - ciliolatum Piper VIII, 15 Apodanthes surinamensis Pulle X, 285 \*Apopetalum nov. gen. Pax V, 226 \*— pinnatum Pax V, 226 Aporosa campanulata J. J. Smith VII, 181

— somalensis Mattei IX, 252 (Appendicula bracteosa Fleischm, et Rech.) IX, 96 (- bracteosa Rchb.) IX, 96 (- callifera J. J. Sm.) X, 37 (- pendula Kränzl.) IX, 96 Aquilegia alpina L. forma gracilis Chenevard et Braun III, 64 (- caerulea var. calcarea Jones) IX,402
 - Einseleana F. Schultz var. pseudothalictrifolia Pampanini III, 207 pinetorum J. Tidestrom IX, 402
 rubicunda J. Tidestrom IX, 402 - scopulorum J. Tidestrom IX, 402 – forma calcarea (Jones) Tidestr. IX. 402 Arabidopsis Huettii N. Busch IX, 133

Antirrhinum meonanthum Link et Hoffgg.

(Arabis albida & Billiardieri Boiss.) VI, 40 (-- var. dasycarpa Rupr.) VI, 39 - - var. dolichothrix Busch VI, 40 — — var. flaviflora (Bge.) Trauty. f. glabra Busch VI, 40 f. gymnostachya Busch VI, 39
f. hebecarpa Busch VI, 39 - - f. trichostachya Busch VI, 39 (— alpestris Schl.) VIII, 321 - aprica Osterh. IX, 482 (- arenosa Freyn, A. Kern.; Scop. VIII, 321  $(--\beta)$  multiceps Neilr.) VIII, 321  $(- - \alpha \text{ simplex Neilr.}) \text{ VIII, 321}$ - auriculata Lam. var. varbossania Maly VI, 292 - Austinae Greene V. 242 Billardieri DC. VI, 40
Boryi Boiss. VIII, 132 - caduca A. Nelson IX, 483 (- canescens var. latifolia S. Wats.) VI, 171 (- cebennensis DC.) IX, 48, 395 - Christiani Busch VI, 39 (- ciliata β hirsuta Koch) VIII 321 corymbiflora Vest β incaea (Gaud.) Hay., VIII, 351 \*- Covillei Greene V, 243 (- Crantziana Ehrh.) VIII, 321 - depauperata Nelson et Kennedy V, 286 Engleriana Muschler VIII, 301 \*- epilobioides Greene V, 242 \*- Fauriei Lévl. VIII, 281 (- Freynii Brügg.) VIII, 321 — Halleri L.) VIII, 322 (-- var. trachytica Fritsch) VIII, 322 - hirsuta var. dentata Lojac. III, 333 (- - var. incana Gaud.) VIII, 321 (- hispida Myg.) VIII, 321  $(--\beta)$  intermedia Freyn) VIII, 321 \*- inamoena Greene V, 243 — latifolia (S. Wats.) Piper VI, 171 \*— Leibergii Greene V, 243 (— Lemmoni S. Wats.) VI, 171 – longisiliqua Murb., non V, 200 \* - Missouriensis Greene V, 244 (- mollis Stev.) VI, 39 (— multiceps Fav. u. Rech. VIII, 321 (- neglecta Schult.) VIII, 322 - nova Vill. var. Vetteri X, 220 — var. Vetteri Thell. forma sedunensis Thell. X, 220 \*- oligantha Greene V, 243 (- ovirensis Wulf.) VIII, 322 (- pedemontana Boiss.) IX, 48, 395 \*- peramoena Greene V, 242

- perelegans A. Nelson IX, 482

(Arabis petraea M. B.) VIII, 321 IX, 133 (— — γ arenosa Neilr.) VIII, 321

(- - var. Crantziana DC.) VIII, 321 (- - α grandiflora Neilr.) VIII, 321

(-- β intermedia Neilr.) VIII. 321

 petrogena A. Kern.) VIII, 321 \*- pratincola Greene V, 244

(- pubescens var. β longisiliqua Coss.) V. 200

\*- Schweinfurthiana Muschler III, 213

(- secunda Howell) VI, 171

 serpyllifolia Vill. β brevisiliqua (A. alpestris × serpyllifolia) Pau VII, 83 - sparsiflora var, secunda (Howell) Piper, VI, 171

- stolonifera Hornem.) VIII. 322

(- tenella Host) VIII, 322 (- Thaliana Cr.) VIII, 321

× Thomasii (A. alpestris × serpyllifolia) Thell. X, 220

<mark>— Todari Loj. Poj. III, 333</mark> \*- trichopoda Greene V, 242 - tunetana Murbeck V, 200 (Arachnanthe alba Ridl.) X, 197

— annamensis Rolfe IV, 126 (— breviscapa J. J. Sm.) X, 196 (— Maingayi Hk. f.) X, 197

\*Arachnis alba (Ridi) Schltr. X. 197 \*- flosaeris (L.) Schltr. X, 196

\*- Hookeriana (Rchb. f,) Schltr. X, 197 \*— Maingayi (Hk. f.) Schltr. X, 197 Aragallus Aven-Nelsoni Lunell VIII, 245 (Aralia capitata Jacq.) VI, 46

(Araucaria Cookii pendula Hort.) IX, 140 - Rulei F. Müll. eta patens Barsali

IX, 140

— γ pendula Barsali IX, 140 (Arceuthobium campylopodum Engelm.)

(- Douglasii var. abietinum Engelm.)

VI, 168

(- occidentale Engelm.) VI, 168 \*Arctophila trichopoda Holm III, 337

\*Ardisia Bodinieri Lévl., IX, 461 \*- castaneifolia Lévl. IX, 461 X, 374

\*— Cavaleriei Lévl. X, 374

\*- Copelandii Mez III, 98 - crispa Thunb. var. Taquetii Lévl.)

X, 374 \*-- Dielsii Lévl. IX, 461

\*- discolor Lévl. X, 373 \*- elegantissima Lév. X, 373

\*- Elmeri Mez III, 100

- humilis Vahl forma grandiflora Hochr. VII, 15

\*- kteniophylla A. DC. VIII, 354

\* Labordei Lévl. X, 373 \* Meziana Lévl. X, 374

\*- perforata Lévl. IX, 462 \*- racemoso-paniculata Mez III, 99 - sublanceolata Hochr. V, 348

\*Ardisia tonkinenses A. DC. VIII, 354

\*- Weberbaueri Mez III, 97 \*- Whitfordii Mez III, 98

(Areca appendiculata Bail.) IX, 547 (Arenaria aggregata L. var. obtusifolia Pau) III, 328

(- austriaca Jacq.) VII. 33 (- Burkei Howell) VI, 169

( - capillacea All.) VII, 33 - ciliata L. form. diffusa E. Steiger

 forma glabrata E. Steiger III, 236 var. subpuberula E. Steiger III, 236

- condensata Presl) X, 305

- Fendleri var. glabrescens S. Wats.) VI, 169

(- - var. subcongesta S. Wats.) VI, 169

(- frutescens Kit.) X, 305 (- Gerardi Willd.) VII, 33

glabrescens (S. Wats.) Piper VI, 169

(- glutinosa Boiss.) VI, 145 - gregaria Heller IV, 61

(- heterosperma Guss.) IX, 350 (- hirsuta M. a. B.) X, 304

 insignis Litw. VI, 103 - Katoana Mak. VIII, 108

(— Ledebouriana  $\beta$  glutinosa Boiss.) VI. 145

(— liniflora Jacq.) VII, 33 (— liniflora L.) VII, 33

- modesta Duf. β Guarensis Pau VII, 84

(- peploides var. major Hook.) VI, 169 · Salzmanni Presl var. commutata Loj. Poj. V, 25

(- setacea Thuill.) VII, 33 sitchensis Dietr.) VI, 169
striata Vill.) VII, 34

- Tchichatcheffii Vierhapper VI, 145 (Arethusa japonica A. Gr.) X, 255

(- sinensis Rolfe) X, 256 (Aretia alpina (Lam.) Wulf.) VIII, 257

- glacialis (Hoppe) Hay. VIII, 257 \*Argemone pleiacantha Greene VI, 161 Argithamnia californica T. S. Brandegee ÍV, 14

Argophyllum cryptophlebum Marg. Zemann VIII, 447

latifolium (Viell.) Marg. Zemann VIII, 447

(- nitidum var. cryptophleba [Sayer?] VIII 447

Argyranthemum frutescens Sch. Bip. var. y foeniculaceum Pitard IX. 276 – var. δ parviflorum Pitard IX, 276

Argyreia Pierreana D. Bois IV, 31
\*- rufo-hirsuta Lévl. IV, 452

Seguini Vant. IX, 452

Argyrolobium abyssinicum Jaub. et Spach forma caespitosum Lanza IX.413 Argyrolobium abyssinicum forma diffusum Lanza IX, 413

Argythannia argentea Millsp. VII, 280
— lucayana Millsp. VII, 280
(Aria Descionana Lavall.) VIII, 174

(Aria Decaisneana Lavall ) VII, 174 (— gracilis Koehne) X, 514

(- majestica Lavall.) VII, 174

(- Mougeoti var. austriaca Beck) III, 136 (Arisaema cochinchinense Blume) VIII, 488

\*Aristida acuminata Hack. VII, 213

- Adscensionis L. var.  $\alpha$  argentina Hack. IV, 275

Hack. IV, 275

— var. breviseta Hackel IV, 308

- - var. ε coerulescens (Desf.) Hack IV, 275

— — subv. condensata Hack. IV, 275

– – subvar. typica Hackel IV, 275
– var β laevis Hackel IV, 275

— var. δ modesta Hack. IV, 275

— var. γ scabriflora Hack. IV, 275

(- caffra Bory) V. 75 - cordobensis Hack. IV, 276

hyrtigluma Steud. var. patula Hackel
V, 336

- inversa Hackel VI, 207

\*- Leichhardtiana Domin IX, 551

\*- leptochaeta Hack. VI, 344

Iongiseta var. robusta Merrill VI, 73
nigritiana Hack X, 166

pallens Cav. var. macrochaeta Hack.
 IV, 308

– var. tenuicula Hack. IV, 308
 (– plumosa L. subsp. sokotrana Vierh.)
 VII, 140

- purpurea var. robusta (Merrill) Piper VI, 73

- sokotrana Vierh. VII, 140

- Spegazzinii Arech, var.  $\beta$  abbreviata Hack. IV, 276

- - var.  $\alpha$  genuina Hack. IV, 276

– var. γ pallesceus Hack. IV, 277.
– vagans Cav. var. \*gracilipes Domin

vagans Cav. var. \*gracilipes Domin
 IX, 551

Aristolochia barbata Jacq. subsp. Benedicti Malme II, 27

- curviflora Malme II, 29

- lingua Malme II, 28

(- longa Scop.) III, 127

(- pallida Sibth. et Lindl.) III, 127 - var. istriaca R. Pampanini III, 127 Armeria alliacea Cav. var. allioides

(Boiss.) Pau VIII, 136

( allioides Boiss.) VIII, 136alpina W. b. nana Bolzon IX, 187

(- ancarensis Merino) VII, 367

(- bella Alboff) IV, 138

 Berlengensis Daveau var. 1. gracilis Merino VII, 367 Armeria Berlengensis var. 2. vestita Merino VII, 367

(- - var. villosa Merino) VII, 367 - canescens Host var. majellensis (Boiss.) f. \*dasyphylla Rohl. III, 148

( - chilensis Boiss.) IV, 138

- Duriaei Boiss. var. ancarensis Merino VII, 367

Hassleri Hack. var. \*aculeata Hack.
 VII, 373

(- macloviana Cham.) IV, 138 \*- macrantha Hack. VII, 372

maritima Willd. var. 2 glaberrima
 Merino VII, 367

(- sibirica Turcz. VIII, 74

(- vulgaris var. sibirica Rosenv.) VIII, 75\*Armodorum labrosum (Ldl. et Paxt.) Schltr. X, 197

\*— sulingi (Bl.) Schltr. X, 197 (Arnebia perennis DC.) VI, 47

(- tingens DC) IV 47

Arnica aprica Edw. L. Greene VI, 320

aspera Greene VII, 240
confinis Greene VI, 320
laevigata Greene VI, 224

\*-- Lowii Holm III, 338 (- maritima L.) IX, 137

- montana L. var. Bacorelli Mer. VIII, 65

-- paniculata A. Nelson IX, 486 Aronia arbutifolia (L.) Spach-var. \*atro-

purpurea C.K. Schn. III, 150

- var. \*Baenitziana C. K. Schn.

III, 150 — — var. \*depressa (Ldl.) C. K. Schn. III, 150

(— arb. × melanocarpa) III, 150 — atropurpurea Britt. III, 150

- floribunda Spach III, 150

- - var. \*glabrescens (Spach) C.-K.
Schn. III, 150

— melanocarpa (Willd.) Spach III, 150 — var. \*grandifolia C. K. Schn. III, 150

— var. \*subpubescens C. K. Schn. III, 151

— var. typica C. K. Schn. III, 150 (— monstrosa Zabel) III, 134

(— nigra var. grandifolia Dipp.) III, 150 \*— Arrabidaea anguillulicarpa Hassl.

\* Arrabidaea anguillulicarpa Hassl. IX, 51
(— craterophora Sprague) IX, 50

\*— decora (Sp. Moore) Hassi. IX, 49

— var. α \*genuina Hassl. IX, 49
— var. β macrophylla Hassl. IX, 49

(- praecox Hassl.) IX, 50 - rhodantha Bur. et K. Sch. var. α

\*genuina Hassl. IX, 50

 $(-- \text{ var. } \alpha \text{ typica Sprague}) \text{ IX, } 50$ 

(- - var. β elliptica Sprague forma glabrescens Sprague) IX, 50

(- - forma mollis Sprague) IX, 51

Arnica rodantha var. B \*induta Hassl. IX, 50

\_ \_ \_ forma \*mollis (Sprague)

Hassl. IX, 51

— — forma \*puberula Hassl, IX, 50 -- - forma \*subglabra Hassl. IX,50 \*Arracacia pubescens Wolff VIII, 525 (Arrhynchium labrosum Ldl. et Paxt.) X, 197.

Artabotrys likimensis De Wild. X, 527 - Malchairi De Wild. X, 527

\*Artemisia Argyi Lévl. et Vant. VIII, 138 - atomifera Greenmann VIII, 272

 ✓ — Augustana (A. glacialis × spicata) Vacc. XIII, 360

— α Cognensis Vacc. VIII, 360

— – β Ferinae Vacc. VIII, 360

- borealis Pallas subsp. nana Gaud. var. latiloba Vacc. VIII, 333

 campestris L. ε brachyphylla Vacc. VIII, 333

 ✓ — Chanousii (A. mutellina × glacialis) Vacc. VIII, 361

× -- β Carrelii Vacc. VIII, 361

× - - α Petitmengini Vacc. VIII, 361 - Dracunculus L. f. minor Komarow V, 276

\*- Feddei Lévl. et Vant. VIII, 138

- Genepi Weber e decipiens Vacc. VIII, 333

— c. densa VIII, 333

— d. integrifolia Vacc. VIII, 333

- - b. laxiuscula Vacc. VIII, 333 japonica Thunbg. β manschurica

Komarow V, 276 niitakayamensis Hayata VI, 26

(- Pallasiana Fischer, Regel) V, 276 (mutellina × nana) ×— Pampaninii Vacc. VIII, 362

(- Perrieri Petitmeng.) VIII, 362

(— — var. petiolata Petitmeng.) VIII, 362 × - Pirottae (mutellina × nana var. racemulosa) Vacc. VIII, 362

Pirottae Vacc. β Berardii Vacc.

VIII, 362

— α Wilczekii Vacc. VIII, 362

- sacrorum Ledeb. & intermedia Ledeb.

f. discolor Komarow V, 276 - - f. nivea Komarow V, 276

 $--\gamma$  minor Ledeb. f. discolor Komarow V, 276

-- - f. vestita Komarow V, 276 - scoparia Waldst. et Kit. f. sericea Komarow V, 276

\*- septemlobata Lévl. et Vant. VII, 22 × - Sylviana F. O. Wolf (A. mutellina  $\times$  spicata)  $\beta$  Galisensis Petitmengin VIII, 361

Artemisia vulgaris L.  $\delta$  integerima Komarow V, 277

- -  $\eta$  minor Komarow V, 277

 — α selengensis Komarow V. 277 - forma serratifolia Komarow

V. 277

- - C verbenacea Komarow V, 277 – ε viridissima Komarow V, 277

(- Wolfii Petitmengin) VIII, 333 (Arthrocnemum macrostachyum [Moric.]

Bunge) VIII, 257 (- virginicum [Forsk.] Fritsch) VIII, 257 (Arthrolobium ebracteatum

VIII, 437

- pinnatum Rendle et Britten VIII, 437 \*Arthropteris caudata Rosenst. VIII, 163 obliterata (R.-Br.) J. Sm. var. \*inciso-

crenata Rosenst. X, 339

Artocarpus altissima J J Smith VII, 182 - dasyphylla Miq. var. flava J. J. Smith VII, 182

\*Arundina celebica Schltr. X, 38 Arundinaria Coboni Bailey IX, 545 (- paraguayensis O. K) IV, 278

\*- rhizantha Hack. VII, 323

\* - setifera Pilger I, 145 \*Arundinella grandiflora Hack. VIII, 514 (Arundo nigricans Mérat) III, 140

(- Phragmites var. subuniflora DC) III, 140

\*Asarum arrhizoma Lévl. et Vant. V, 100 \*- Cavaleriei Lévl. et Vant. IX, 78 – var. \*Esquirolii Lévl. IX, 451

Asparagus Lujae De Wildem. Ill, 164 \* Mairei Lévl. VII, 339

\*-- meioclados Lévi. VIII, 59

sessiliflorusv. Oetting II, 138; IX, 144 \*- stachyphyllus Lévi. et Vant. V, 282 Asperula arvensis L. f. albiflora Probst

- galioides M. B. var. laetevirens

Domin I, 130

 hirsuta Desf. var. β Durand et Barr. IX, 353

– longiflora W. K. var. laevifolia Rohl. I, 26

\*— odorata L. var. \*coriacea Rohl. I, 14 \*Asphodelus Bonatii Lévl. et Vant. VI, 113

– madeirensis Eug. Simon VII, 386 (Aspidium Achalense Hieron.) VII, 169

(- affine Fisch, et Mey.) VI, 184 (-- Arechavaletae Hieron.) VII, 169

 argentinum Hieron.) VII, 169 \* - Bamlerianum Rosenst. X, 338

(— conterminum var. oligosorum Griseb.) IX, 140

(- Dryopteris Baumg.) VI, 185

(- erosum Schk.) VI, 184

( - Filix mas f. affine Aschers.) VI, 184

( - var. crenatum Milde) VI, 184

48 (Aspidium Filix mas var. lobatum Milde) VI, 184 deorso-— f. erosa Döll.) VI, 184 - f. genuina Milde) VI, 184 - - var. Heleopteris Milde) VI, 184 - - var. incisum Döll.) VI, 184 - - monstr. depastum Milde) VI, 185 (- - × spinulosum A. Br.) VI, 185. - var. Stilluppense Sabransky) VII. 188 - - var. subintegrum Döll.) VI, 184 (— – var. typica Luerss.) VI, 184 (— – Galanderi Hieron.) VII, 169 (- illyricum Borb.) VI, 186 – latifolium (Forst.) var. \*tripinnata Rosenst. X, 162 (- Iobatum × Lonchitis Murb,) VI, 186 - Lonchitis Boiss.) VIII, 137 - - (L.) Sw. var. nevadensis Pau VIII, 137 (- Lorentzii Hieron.) VII, 169 ( — molle Swartz forma Keffordii Bailey IX, 545 (- - var. glabrindusiatum Hieron.) IX. 141 (— montevidense forma genuina Hieron.) IX, 141 ( — forma imbricata Hieron.) IX, 141 (— — forma squamulosa Hieron.) IX, 141 (— oligocarpum [Willd.] Kth. var. crassistipitatum Hieron.) IX, 140 - oligophyllum Rosenst. V, 13 (- paleaceum Don) VII, 188 (- pseudomontanum Hieron.) VII, 169 (- remotum A. Br) VI, 185 — Siambonense Hieron.) VII, 169 \*Aspidopteris Cavaleriei Lévl. IX, 458 \*— hypoglauca Lévl. IX, 458 \*Asplenium anagrammoides Christ V, 11 - auritum Sw. var. \*davallioides Rosenst. V, 232 — — f. \*diversifolia Rosenst, V, 232 (— — var. recognitum Kze.) IX, 141 - Belangeri Kze. var. \*acuminata Rosenst. V, 373 \*— canelense Rosenst. VII, 293 \*- Cromwellianum Rosenst. X, 327 daghestanicum H. Christ VI, 31 \*- Daubenbergeri Rosenst. IV, 2 \*- dognyense Rosenst. X, 159

\*- floccigerum Rosenst. IV, 3 \*- Francii Rosenst. X, 161

\*- Hasslerianum Christ VI, 351

- Holmbergi Hicken VIII, 276 \*- Keysserianum Rosenst. X, 328

VII, 171

Rosenst. X, 326

\*- Lademannianum Rosenst. VI, 177

Asplenium novo-guinense Rosenst, V, 40 \* - praegracile Rosenst. VI, 177 (- recognitum Kze.) IX, 141 serratum L. var. \*caudatum Rosenst. VI, 310 \*- subemarginatum Rosenst. V, 372 — — var. \*logavensis Rosenst. X, 326 - \*subflexuosum Rosenst. X, 160 — sulcatum var. recognitum (Kze.) Hicken IX, 141 - tenerum Forst. var. \*neocaledonica Rosenst. X, 160 \*- tenuiculum Rosenst. VII, 146 - Trichomanes L. var. pseudadulterinum Rohl. I, 25 Vieillardii Mett. var. \*scoparioides Rosenst. X, 160 - — var. \*soluta Rosenst. X, 160 \*- Werneri Rosenst. V, 39, 376 Woronowii Christ VI, 31 (Astelia linearis var.  $\beta$  subulata Hook. f.) VIII, 220 subulata Cheesem. VIII, 220 (Aster Bergerianus Harv.) VI, 369 - campestris subsp. Suksdorfii Piper VIII, 271 (— canescens var. viscosus A. Gray) VIII, 271 (- capensis Less.) VI, 369 \*- Chaneti Lévl. et Vant. VII, 103 (- chinensis L.) VIII, 488 \*- coriacaefolius Lévl. et Vant. VIII, 358 - culminis A. Nelson IX, 485 (- elongatus Thunbg.) VI, 369 (- Engelmanni var. glancesceus A. Gray) VIII, 271 \*— Fauriei Lévl. VII, 102 (- Fauriei Lévl. et Vant.) VIII, 168 \*- Feddei Lévl, et Vant. VIII, 168 flaccidus Bunge var. glandulosus K. v. Keissler VII, 95 \*— Korsakoviensis Lévl. et Vant. VII, 103 (- laevigatus Lam.) V, 367 – laevis L. var. abbreviatus Lunell VIII, 247 – var. sourisensis Lunell VIII, 247 - - var. undulatifolius Lunell VIII, 247 \*- lofouensis Lévl. et Vant. VIII, 281 - erectumBory var. \*plumosa Rosenst. - micranthus Lévl. et Vant. var. -\*achilleiformis Lévl. VIII, 449 - microlonchus E. L. Greene VI, 223 novi belgii L. ssp. laevigatus (Lam.) Thell. V, 367 - - - var. ovatus Thell. V, 367
- - - var. subprenanthoides Thell. V, 368 - - var. (?) stenolepis Thell. V, 367
\*- papposissimus Lévl. VIII, 282 micropteron Baker var. minor Hicken - multilineatum Hk. var. \*dareoides (- serrulatus Harv.) VI, 369 (- staehelinoides DC.) IV, 139

Aster Tripolium L. var. acumbens Merino VIII. 63

var. pygmaeus Bég. VIII, 494
var. transiens Chiti VIII, 494

Asteriscus spinosus G. G. b. montanus Terracciano V, 138

\*Asterochlaena Balansae (Gürke) Hassler VII, 382

\*- - ssp. tenax (Hassler) Hassler VII, 382

— — forma α. \*genuina Hassler VII, 382

— — f.β \*intermedia Hassler VII, 382 — — forma γ. \*longepetiolata Hassler VII, 383

(- cuspidata Garcke) VII, 382

\*- Sect. II. Euasterochlaena Hassler VII. 382

\*— Hieronymi (Gürke) Hassler VIII, 116 – ssp. \*brevipila Hassler var. α \*genuina (Gürke) Hassler VIII, 116 - - - subvar. microphylla Hassler IV, 116

- - var.  $\beta$ . \*latiphylla Hassler VIII, 116

— — var. γ. \*pseudoapiculata Hassler VIII, 117

- - ssp. longipila Hassler VIII, 117 – – var. α. \*grandiflora Hassler VIII, 117

- - var.  $\beta$ . \*apiculata (R. E. Fries) Hassler VIII, 117

\_\_\_\_ forma \*angustiphylla

Hassler VIII, 117 — — var. γ. \*montana Hassler

VIII, 117 \*- Morongii (Sp. Moore) Hassler VII, 382

— — var. \*genuina Hassler VIII, 118 - - var. \*intermedia Hassler VIII, 118

 var. \*paraguariensis Hassler VIII, 118

 – var. \*viscosa Hassler VII, 382 - - forma \*discolor Hassler VIII, 118

— — — subform. \*viscosissima Hassler VIII, 118

\*- orbicularis (Ulbr.) Hassler VIII, 115 — — var. \*genuina (Ulbr.) Hassler VIII, 115

 var.\*decumbens Hassler VIII, 115 — — var. \*Ekmani Hassler VIII, 116

\*- platyloba (R. E. Fries) Hassler VII, 383 Sect. I. Pseudo-asterochlaena Hass-

ler VII, 382 \*- § Pseudopavonia Hassl. VII, 74

\*- sidifolia (H B. K.) Hassler VIII, 114 – ssp. \*genuina (Gürke) Hassler VIII, 114

Asterochlaena sidifolia ssp. genuina var. α \*septentrionalis Hassl. VIII, 114

- - var.  $\beta$ . \*campestris (R. E. Fries) Hassler VIII, 114

 – – – forma \*crenata Hassler VIII, 114 — — — forma \*crenato-dentata

Hassler VIII, 114 - - ssp \*diuretica (Gürke) Hassler

VIII, 114 – – var. α, \*typica Hassler VIII, 114

 – – var. β. \*paraguariensis Hassler VIII, 114

— — var. γ \*rupestris Hassl. VIII, 115 — — — forma \*polyphylla Hassl. VIII. 115

\*- tenax Hassler VII, 76

×Astilbe intermedia (A. japonica × Thunbergi) F. Knoll IX, 396

- macrocarpa F. Knoll IX, 396 - Thunbergii Miq. var. \*aethusifolia Lévl. VIII, 283

– var \*Taquetii Lévl. VIII, 282 (Astragalus adsurgensis Pall.) VII, 280 ( - adsurgens robustior Hook.) VII, 220 (- agrestis Dougl.) VII, 220

 Albertoregelia C.Winkl. et Fedtsch. III. 56

(- alpinus L.) VII, 219

 forma erectus E. Steiger IV, 67 – var. vittatus A. Notö III, 83

 Androssowi Litwinow IX, 555 \*- argyroleucus Bornm. III, 131

(- arrectus A. Gray) VII, 219 (- - var. Leibergii Jones) VII, 219

(- - var. palonsensis Jones) VII, 219 - atacamensis (O. Ktze) R. E. Fries IV, 21

australis (L.) Lamk, var, canescens Vaccari II, 151

- - var. balmaeus Beauv. II, 151 (- Beckwithii Torr. & Gr.) VII, 219

- bellus (O. Ktze) R. E. Fries IV, 21

(- Boissieri Fisch, VIII, 134 (- campestris A. Gray) VIII, 11 ( - chaetodon Torr.) VII, 219 ( - conjunctus S. Wats.) VIII, 11

- - var. oxytropidoides Jones) VII, 220

- convallarius Greene) VIII, 11 - creticus Boiss.) VIII, 134

(- creticus Lamk. var. Boissieri [Fisch | Pau] VIII, 134

- - subsp. rumelicus (Bge.) Maire VI, 2

(- - var rumelicus Bald.) VI, 2 ( - decumbens (Nutt ) A. Gray) VIII, 11 depauperatus (Phil.) Reiche) IV, 21

? - diaphanus Dougl.) VII, 218 (- dorycnioides Dougl.) VII, 219

(- filipes Torr.) VII, 219 (- Forskalei Boiss) VIII, 302

(Astragalus glareosus Dougl.) VII, 218 (- Hoodianus Howell) VII, 220 (- hypoglottis auct. Amer.) VII, 220 (- inflexus Dougl.) VII, 218 (- kentrophyta A. Gray) VIII, 11 (- Leibergii Jones) VII, 219 (- lentiginosus Dougl.) VII, 218 leptocephalus Batt. X, 218 (- leptophyllus Nutt.) VII, 219 (- Lyallii A. Gray) VII, 219 (— maximus Willd.) VIII, 400 (— microcystis A. Gray) VIII, 11 (— misellus S. Wats.) VII, 219 (- miser Dougl.) VIII, 11 (- Mortoni Nutt.) VII, 220 (- nitidus Dougl.) VII, 220 (- palousensis Piper) VII, 219 pauciflorus Lazaro III, 328 - Petunnikowi Litwinow IV, 8 polyceras K et K. IV, 8 (- pulchellus (Clos) Reiche) IV, 21 - purpureus Lam. var. Gremlii Bur-nat forma albus Porta VII, 389 (- Purshii Dougl) VII, 218 - - var. tinctus Iones) VII, 218 (- reventus A. Gray) VII, 220 (— — var. Canbyi Jones) VII, 220 (- rumelicus Bunge) VI, 2 - serotinus A. Gray) VIII, 11 (- sinuatus Piper) VII, 219 (- Spaldingii A Gray) VII, 219 - spartioides K. et K. IV, 8 (- speirocarpus A. Gray) VII, 219 spinosus (Forsk.) Muschler VIII, 302 (- stenophyllus Torr. et Gray) VII, 219 (- striatus Nutt.) VII, 220 (- succumbens Dougl.) VII, 219 (- Suksdorffi Howell) VII. 218 – Taubertianus Aschers, et Barbey IX, 351 (- tumidus Willd.) VIII, 302 (- Tweedii Canby) VII, 219 - Vaccarii Pampanini VIII, 399 (- viridis (Nutt.) Sheldon) VIII, 11 \* vulcanicus Bornm. VIII, 546 \*- Warburgii Bornm. III, 130 (- Whitedii Piper) VII, 219 \*- Zederbaueri Stadlmann II, 164. Astrantia major L subsp. elatior (Friv.) Maly var. integra Maly VI, 293 Astrotriche longifolia Benth var. glabrescens Bailey IX, 546 Asystasia Blumei Nees var. grandiflora Th. Val. V. 393 Atalantia monophylla Corr. var. gennina Hochr. VII, 10 \*Ateleia guaraya Herzog VII, 55 Athamantha Della-Cellae Aschers, et Barbey IV, 352 Athanasia Thodei Bolus VII, 128 \*Athyrium Barbae Christ VIII, 18 (- capillaris Schur) IX, 141

\*Athyrium demissum Christ V, 284 \*- flaccidum Christ V, 11 \*- paucifrons C. Chr. IV, 371 Atractylis ovata Thunbg. f. e. Iyratifolia Komarow V, 278 - f. d. pinnatifolia Kom. V, 278 - f. c. ternata Komarow V, 278 Atriplex andina R. E. Fries IV, 37 - Philippii R. E. Fries IV, 37 (Atriplex prostrata Phil.) IV, 37 (- pusilla Phil.) IV, 37 serrulata Pau III, 325 (- Sokotranum Vierh.) VII, 142 - Stocksii Boiss. forma Sokotrana Vierh. VII, 142 Atropis argentinensis Hack. VI, 208 - - forma mendozina Hack. IV, 208 (- Canbyi Beal) VI, 74 - convoluta Griseb. var. glaberrima Hack. VII, 96 - - var. mendozina Hack. IV, 346 × – elata (A. distans × suecica) Holmberg IX, 142 - - forma expansa Holmbg. IX, 142 forma gracillima Holmbg. IX, 142 - suecica Holmbg. IX, 141 – var. angustifolia Holmbg. IX, 141 - - var. capillaris (Liljebl.) Holmbg. IX, 141 forma gigantea Holmbg. IX, 141 Atroxima nov. gen. Stapf II, 31 liberica Stapf II, 31 Zenkeri Stapf II, 32 \*Aubrietia Schweinfurthiana Muschler III, 212 \*Aulacolepis Hackel n. gen. III, 241 \*- japonica lack. III, 241 \*- Treutleri Hack. III, 242 (Avena amethystina Koch) III, 138 (- Blavii) III, 139 (- Cavanillesii Koch) III, 140 (- fallax Poll.) III, 138 Fedtschenkoi Hack. VI. 51 – insubrica (Aschers, et Graebn.) Dalla Torre et Sarnthein III, 138 ( - levigata Schur var. insubrica A. et G.) III, 138 (- Loeflingiana Cavanilles) III, 140 (- lucida Bertol.) III, 138 (- mollis Michx) VI, 74 (- neglecta Bertol.) III, 140 pratensis L. var. pseudolucida Hsm. III, 138 (- pubescens var. amethystina Fcch.) III, 138 - var, colorata Dalla Torre et Sarnthein III, 138 – var. \*stenophylla Domin I, 16 (- valesiaca Nyman) III, 140 varia Hoppe III, 139

Avenastrum sesquitertium Fritsch III, 138

(Averrhoa acida L.) VIII, 488

51

\*Averrhoidium paraguaiense Radlk. VIII, 72

Avicennia alba G. Karsten, non Blume V, 390

( - eucalyptifolia Zipp. msc.) V, 390 - marina (Forsk.) Vierh. VII, 162

( - officinalis Balfour fil.) VII, 162 Th. Val. – var. eucalyptifolia V. 390

Ayenia spinulosa R. E. Fries VIII, 375 Azadirachta indica A. de Juss var. minor.

Val. VII, 13

 var. siamensis Val. VII, 13 (Azarolus heterophylla Borckh.) III, 133 Azima tetracantha Lam. var. velutina Schinz VI, 166

\*Azorella Cockaynei Diels VI, 96 (- dichopetala Benth.) V, 104 \*- ecuadorensis Dom. IV, 296

 hydrocotylifolia (Fielding et Gardn.) Macl. IV, 137

\*- prismatoclada Dom. IV, 297

## В.

Baccharis macrophylla Dusén VII, 220 - petrophila R. E. Fries III, 296

(- phylicaeformis Meyen) III, 295 Bacopa congesta Chod. et Hassl. var.
\*hirsuta Hassl. X, 348

- Monnieria (H. B. K.) Hayata VI, 196

(- radicata Benth.) IV, 139

Baeckea crispiflora F, v. M. var. tenuior A. J. Ewart VIII, 406

 Eatoniana A. J. Ewart and White VIII, 411

Balania ceracea v. Tiegh. VII, 271

— Henryi (Hemsl.) v. Tiegh. VII, 271

— japonica v. Tiegh. VII, 270

Balaniella nov. gen. v Tiegh. VII, 267 - abbreviata (Blume) v. Tiegh. VII, 267 alutacea (Junghuhn) v. Tiegh.

VII. 267

distans v. Tiegh. VII, 268

- elongata (Blume) v. Tiegh. VII, 267 fasciculata v. Tiegh. VII, 268
Forbesii (Fawcett) v. Tiegh. VII, 267

 globosa (Junghuhn) v. Tiegh. VII, 267 - Hildebrandtii (Reichenb.) v. Tiegh.

VII, 268

- Junghuhni v. Tiegh. VII, 269
- latisepala v. Tiegh. VII, 269
- Lowii (Hooker f.) v. Tiegh. VII, 267
- maxima (Jungh.) v. Tiegh. VII, 267

multibrachiata (Fawc.) v. Tiegh. VII, 268

- ramosa (Fawcett) v. Tiegh. VII, 268 - reflexa (Becc.) v. Tiegh. VII, 268 (Balanites aegyptiaca Delile) VII, 115

 – var. angolensis Oliver) VII, 119 – var. ferox A. P. DC.) VII, 119

(- - var.microphylla Perrottet) VII, 118 (- angolensis Welwitsch) VII, 119

Balanites indica v. Tiegh. VII, 120 - Jacquemonti v. Tiegh. VII, 120

- triflora v. Tiegh. VII, 120 (Balanophora abbreviata Blume) VII, 267

( – alutacea Junghuhn) VII, 267– Boni v. Tiegh. VII, 266 \*— Cavaleriei Lévl. II, 115 — dentata v. Tiegh. VII, 266 (- elongata Blume) VII, 267

\*- Esquirolii Lévl. II, 115 (- Forbesii Fawcett) VII, 267

- Forsteri v. Tiegh. VII, 265 (- globosa Junghuhn) VÍI, 267 (- gracilis v. Tiegh. VII, 266 (- Henryi Hemsl.) VII, 271

(- Hildebrandtii Reichb, fil.) VII, 268 (- involucrata var. δ Cathcartii J. Hook.) VII, 272

 $(-- \text{var. } \beta \text{ flava J. Hook.}) \text{ VII, } 272$  $(-- \text{ var. } \gamma \text{ gracilis } \text{J. Hook.}) \text{ VII, 272}$ 

 $(-- \text{ var. } \alpha \text{ rubra Hook. f.}) \text{ VII, } 271$ 

- latipes v. Tiegh. VII, 265 (- Lowii J. Hook.) VII, 267

(- maxima Jungh.) VII, 267 (- multibrachiata Fawc.) VII, 268 - pentamera v. Tiegh VII, 267

- Pierrei v. Tiegh VII, 266

(- ramosa Fawc.) VII. 268 (- reflexa Becc.) VII, 268 - trimera v. Tiegh. VII, 265

Ballota nigra L. var. sericea Vandas IX, 534

(- rupestris Vis.) IX, 534 - velutina Pospichal) IX, 534 (Bambusa edulis Carr.) IV. 31

(- Mosoo Sieb) IV, 31 \*- Munroi Hack. VII, 374

(Banistera antifebrilis Ruiz) IX, 272 (- fagifolia DC.) V, 63

- sinemariensis Aubl.) IX, 270

Banisterioides Dubard et Dop gen. IX, 535

(Barbarea barbarea Mac Millan) VI, 172

(— stricta Andrz.) VI, 171 (- vulgaris R. Br) 172

- - var. stricta A. Gray) VI, 171 Barjonia laxa Malme II, 106

Baroniella Costant, et Gallaud nov. gen. IX, 131

 camptocarpoïdes Costant. Gallaud IX, 131

\*Barthea Cavaleriei Lévl. VIII, 61

\*Bassovia platyneura H. Winkl. VII, 248

(- sylvatica Aubl.) III, 290 - tomentosa Sendtn. var. lanceolata Dusén VII, 263

(Bastardia Kth. susgen. Bastardiopsis Hassl. VIII, 40

(- densiflora (H. et A.) Hassl.) VIII, 42 – var. paraguariensis Hassl.) VIII, 42 \*Bastardiopsis Hassl. nov. gen. VIII, 40 52 \*Bastardiopsis densiflora (H. et A.) Hassl. VIII, 42
var. \* paraguariensis (Hassler) Hassler VIII, 42 Bataprine j. A. Nieuwl. nov .gen. IX, 398 - hispldula (Michx.) Nieuwl. IX, 398 uniflora (Michx.) Nieuwl IX, 398 (Batatas cissoides var. integrifolia Choisy) VIII, 230 Batrachium aquatile var. pantothrix (Brot.) Piper VII, 169 - peltatum Schranck form, terrestre Brenn. X, 320 Bauhinia Eilertsi Pulle X, 287 \*- anomala Hassl. IX, 146 \*- appendiculata Hassl. 1X, 145 - campestris Malme II, 185 chapadensis Malme II, 187 - confusa Rose V, 110 \*- estrellensis Hassler IX, 147 - Goldmani Rose V, 110 \*- Harmsiana Hoss. IV, 290 - hiemalis Malme II, 186 leptantha Malme II, 186 \*— longiflora Rose V, 110 \*— uniflora Hassl. IX, 147 Versteegii Pulle III, 287 Beaucarnea guatemalensis Rose V, 113 (- Hookeri Bak.) V, 115 inermis (S. Wats.) Rose V, 113oedipus Rose V, 113 pliabilis (Bak.) Rose 113 - Purpusi Rose V, 113 Begonia andreana T. A. Sprague II, 140 (- Bowringia hort.) VII, 176 \*- bulbosa Lévl VII, 21 cathayana Henisl. VII, 176 \*- Cavaleriei Lévl. VII, 20 - - var. \*pinfaensis Lévl. VII, 20 \*- edulis Lévl. VII, 20 – var. \*Henryi Lévl. VII, 20 \*- erubescens Lévl. VII, 21 Favargeri Rech. III, 195, VI, 362 \*— gemnirhiza Lévl. IX, 450 - Labordei Lévl. VI, 376 Martini Lévl. VI, 376 parvula Lévl. II, 113
pedatifida Lévl. VII, 21 -- - var. \*Kewensis Lévl. VII, 22 \*- Porteri Lévl. et Vant. IX, 20 \*- Wollnyi Herzog VII, 63 \*- yunnanensis Lévl. VII, 20 \*Beilschmiedia sphaerocarpa H. Winkl. VII, 108 \*Belamcanda Pampaninii Lévl. VIII, 59 Bellida nov. gen. A. J. Ewart VIII, 402 - graminea A. J. Ewart VIII, 403 Bellis perennis L, var. pappulosa Boiss.

forma discoïdea Merino VIII, 63

\*Beloperone Baenitzii H. Winkl. VII, 113

Belou glutinosa (Blanco) Skeels VIII, 489 — marmelos (L) W. F. Wight VIII, 488 (Bennettia Horsfieldii Mig.) IX, 406 leprosipes (Clos) Koord, IX, 406 Benthamantha bicolor Micheli) Rose V, 106 - Edwardsii (A. Gray) Rose V, 106 fruticosa Rose V, 106
glandulosa Rose V, 106
Grayi Alefeld) V, 106 - Greenmanii (Millsp.) Rose V, 106 - micrantha (Micheli) Rose V, 106 - pumila Rose V, 106 \*Berberis bicolor Lévl. IX, 454 \*- Bodinieri Lévl. IX, 454 - brevipes Greene VI, 120 \* - Cavaleriei Lévl. IX. 454 - Ganpinensis Lévl VI, 272 - Poireti C. K. Schn. VI, 339 \*— subcaulialata C. K. Schu. VI, 267 \*- thibetica C. K. Schn. VI, 268 \*Bergenia pacifica Kom. IX, 393 \*Berchemia alnifolia Lévl. X, 433 \*- Cavaleriei Lévl. X, 433 \*- Chaneti Lévl. X, 433 Bergenia crassifolia var. \*pacifica Kom. IX, 393 Berkheya Francisci Bolus VII, 154 — Milleriana Bolus VII, 154 \*Bernardia rotundifolia Herzog VII, 59 Berteroa Gintlii Rohl. I, 34 Berzelia abrotanoides (L.) Brogn. var. crassifolia Colozza I, 128 Dregeana Colozza I, 128 lanuginosa var. tenuifolia A. Zahlbr. VI. 358 (- rubra Schldl.) I, 128 — squarrosa (Thunbg.) Colozza I, 128 (— tenuifolia Willd.) VI, 358 Beschorneria pubescens A. Berger III, 335, V, 5 (Betonica algeriensis De Noë) VIII, 461 (- Clementei Perez Lara) VIII, 461 (- graeca B. et Spr.) IX, 533 (- hirta L.) X, 290 (- officinalis Rouy) VIII, 461  $(--\beta)$  algeriensis J. Ball) VIII, 461 (Betula alba × verrucosa Wettst.) VI. 242 Aschersoniana (B. pendula × tomentosa) v. Hayek. Vl, 242 grandifolia Litw. III, 94 - humilis forma \*cordifolia H. Preuss VII, 106 – forma \*macrophylla H. Preuss VII, 106 – var. \*subrotunda Schuster II, 100 (- hybrida Wettst.) VI, 242 (— pubescens × verrucosa A. u. G.) VÌ, 242 verrucosa Ehrh. var. pyrenaica Pau IX, 192 — wutaica Mayr VIII, 92 (Beyeria viscosa Baill.) X, 384

(— — var. uncinata F. v. Muell.) X, 384

\*Biarum platyspathum Bornm. V, 57 (Bicuculla occidentalis Rydb.) X, 315 Bidens alpina Brandegee III, 373

(- ocymifolia Lam) V, 321 - pilosa L. subvar. discoïdea (Sch.

Bip.) Pitard IX, 276

- - subvar. radiata (Sch. Bip.) Pitard IX, 276

×- radiatus Thuill. f. \*perpusillus

Domin I, 13

\*- robertianifolia Lévl. et Vant. VIII, 140 tripartitus L. f. limosa Komarow V, 276

– — var. quadriaristatus Merino VIII, 63 (Bigelovia graveolens A. Gray) VIII, 270 Bihai geniculata Griggs V, 255

\*Bileveillea granulatifolia Lévl. VIII, 449 Biscutella laevigata L. var. montene-

grina Rohl. 1, 25

- leptophylla Pau VI, 382 Bivolva nov. gen. v. Tiegh. VII, 271

— Cathcartii (J. Hook.) v. Tiegh.

VII, 272

- flava (J. Hook.) v. Tiegh. VII, 272 - gracilis (J. Hook.) v. Tiegh. VII, 272 - involucrata (Hook, fil.) v. Tiegh. VII, 271

\*Blanchetiastrum Hassler nov. gen.

VIII, 28

\* goetheoides Hassler VIII, 28 Blastus Cavaleriei Lévl. IV, 94 V, 100 \* - Dunnianus Lévl. IX, 449

Blechnum attenuatum Mett. var. oceanica

Rosenst. X, 159 australe L. var. β hastatum (Kaulf.) Hicken VII, 171

– var. γ trilobum (Presl) Hicken

VII, 171 \*- Bamlerianum Rosenst. X, 325

 blechnoides Lag. var. \*gracilipes Ros. IX, 343

\*- Buchtienii Rosenst. V, 231

- diversifolium Mett. var. \*paleaceosetosum Rosenst. IX, 75

- Floresii (Sod.) C. Chr. var. Spruceanum Rosenst. VII, 292

(hastatum Kaulf.) VII, 171 \*- hirsutum Rosenst. IX, 74 (- trilobum Presl) VII, 171

Bleekrodea tonkinensis Dub. et Eberh. VIII, 318

Blepharocalyx spiraeoides Stapf V, 78 (Bletia formosana Hayata) X, 256

(- gebina Ldl.) X, 255

(- gebinae Rchb.) X. 255 (- hyacinthina R. Br.) X, 255 (- kotoensis Hayata) X, 256

(- morrisonicola Hayata) X, 256 \*Bletilla formosana (Hayata) Schltr.X,256

\*— japonica (A. Gr.) Schltr. X, 255 \*— kotoensis (Hayata) Schltr. X, 256 \*— morrisonicola (Hayata) Schltr. X, 256

(Rolfe) Schltr. \*Bletiliasinensis 256

- striata (Thbg.) Rchb. X, 255 Blitum Korshinskyi Litw. IX, 557

\*Blumea Cavaleriei Lévl. et Vant. VII, 22 \*-- compactiflora Lévl. et Vant. VIII, 401

\*- conyzoides Lévl et Vant. VII, 22

\*- Esquirolii Lévl. et Vant. VII, 22 \*- Lecomtei Vant. et Lévl. IV, 331 \*- velutina Lévl et Vant. VIII, 401

Bocagea Asbecki Pulle X, 285 - mattogrossensis R. E. Fries II, 189 Boea Cavaleriei Lévl. et Vant. V, 224

\*- Chaffanjoni Lévl. IX, 330 \*- Feddei Lévl. IX, 449

\*Boehmeria Esquirolii Lévl. et Blin. X, 372

Boerhavia Boissieri Heimerl VII, 158 - plumbaginea Cav. var. Sokotrana Heimerl VII, 143

(— — β viscosa Boiss.) VII, 158 Bojeria nutans Bolus VII, 127

\*Bolusanthus nov. gen. Harms II, 14 \* - speciosus (Bolus) Harms II, 15

Bombax argentinum R. E. Fries IV, 104, VIII, 70

- crenulatum K. Sch. subsp. \*multiflorum Hassl. VIII, 68

— — var. \*lobatum Hassl. VIII, 68 — — var. \*subintegrum Hassl. VIII, 68

- elegans R. E. Fries VIII, 68, 464 - longiflorum K. Sch. var. \*emarginatum Hassl. VIII, 68

- - forma  $\beta$  \*elegans (R. E. Fries) Hassl. VIII, 68

 — — forma α \*multifoliolatum Hassl. VIII, 68

- marginatum K. Sch. VIII, 68

 — subsp \* α genuinum (K. Sch.) Hassl, VIII, 69

- subsp. b. \*meridionale Hassl. VIII, 69

- - - var. eta \*arboreum (Chod. et Hassl.) Hassl. VIII, 70

— — — forma 2. \*apaënse Hassl.

VIII, 70 \_ \_ \_ forma 1. rupestre Hassl.

VIII, 70 – – var. α \*intermedium Hassl.

VIII, 69

— — var. γ \*praecox Hassl. VIII, 70 \_ \_ \_ forma 2. argentinum (R. E. Fries) Hassl. VIII, 70

— — — forma 3 \*Fiebrigii Hassl. VIII, 71

— — — forma 1 paraguayense (R. E. Fries) Hassl. VIII, 70 (— — forma arborea Chod. et. Hassl.) VIII, 70

54 Bombax marginatum var. obcordatum R. E. Fr. VIII, 464 (- paraguayense R. E. Fr. VIII, 70 - Valetonii Hochr. V, 347 Bonamia Balansae Hallier f. IX, 150 (- spinosa Vierh.) VII, 161 \*- subsessilis Hassl IX, 149 \*- tomentosa Hassl IX, 148 Bonatea antennifera R. A. Rolfe IV, 179 Boopsis Itatiaiae Dusén VII, 223 \*Bootia Bodinieri Lévl. et Vant. VIII, 141 \*- Esquirolii Lévl. V, 9 \*- sinensis Lévl. et Vant. V, 10 Boronia Deanei J. H. Maiden IV, granitica Maiden et Betche V, 82
 ledifolia J. Gay var. repanda F. v M) IV, 281 - - Maiden et Betche V, 54 – repanda J. H. M. IV, 281 Borreria staurochlamys R. E. Fries IV, 204 Borzicactus Riccob. nov. gen. IX, 411 — Ventimigliae Ricc. IX, 411 Boscia flavescens Mattei 1X, 319 Botrychium Lunaria (L.) Sw. b. nana Bolzon IX, 406 obliquum Mühlbg, VIII, 20 Bouchea caespitosa Pearson IV, 25 incisa Pearson IV, 26 integrifolia Pearson IV, 26
 Krookii Gürke III, 255, VI, 367 (Bowlesia maroccana Dom.) IV, 299 oppositifolia Buch var. \*maroccana Domin IV, 299 tropaeolifolia Gill. var. \*Gayana Domin IV, 299 (Boykinia major var. intermedia Piper) VI, 172 Bracea nov. gen. N L. Britton V, 182 bahamensis Britton V, 182 \*Brachionidium parvum Cogn. VI, 307 \*— serratum Schltr, IX, 164 \*Brachistus actinocalyx H. Winkl. VII, 245 \*- Sancti Caroli H. Winkl. VII, 245 \*- virgatus H. Winkl. VII, 245 (Brachyandra macrogyne Phil.) IV, 146 Brachycome ciliaris Less. var. subintegra F. M. Reader VII, 387 - goniocarpa Sond. et F. v. M. var. longiscapa F. M. Reader VII, 387 Brachypodium distachyum (L.) P. Beauv. var. paradoxum Sommier VIII, 496 - pinnatum P. Beauv. var. villosissimum Domin I, 131 — β vulgare forma \*compositum H. Preuss VII, 105 (Brachyris paniculata DC.) VII, 139 Bragantia macrantha Valeton IX, 307 (Brassica amplexicaulis Pomel) VIII, 544

\*- antiquorum Lévl. IV, 227

\*- Argyi Lévl. IV. 227

(Brassica boetica Boiss.) VIII, 544 ( — cheiranthifolia Lge?) III, 324 (-- Colza Lévl.) IX, 129 - Erucastrum L. f. latisecta Fiori III. 207 (- fruticulosa Cyr.) VIII, 544 (- Gravinae Ten.) VIII, 544 Johnstoni Samp. IV, 382 (-- nigra Koch) VIII, 544 - oleracea L. race Napellus L. var. \* Taquetii Lévl. X, 349 — — race Napus L. var. \* Hongnoensis Lévl. X, 350 – var. \* Taquetii Lévl. et Vant. VIII, 259 (- palustre Pir.) VIII, 544 pekinensis (Lour.) Skeels VIII, 488 (- petsai Bail.) VIII, 488 puberula C. Pau III, 324 rapa L. race Napus L. var. pseudo-Colza Lévl. IX, 129 — — race Rapa L. var. Rutabaga Lévl. IX, 129 (- repanda DC.) VIII, 544 (- subhastata Willd.) V, 363 - Suttoniana Lévl. IX, 128 - - var. gemmifera Lévl. IX, 128 – var. millecapitata Lévl. IX, 129 Brazzeia acuminata v. Tiegh. V, 121 biseriata v. Tiegh. V. 120 - Eetveldiana (De Wild et Dur.) v. Tiegh. V, 120 - Klainei (Pierre mss.) v. Tiegh. V, 121 - pellucida v. Tiegh. V, 121 - rosea v. Tiegh. V, 121 - scandens (Pierre) v. Tiegh. V, 120 - Sovauxii (Oliver) v. Tiegh. V, 120 (- Tholloni Baill.) V, 122 Trillesiana (Pierre mss.) v. Tiegh. V, 121 (Bredia Bodinieri Lévl.) V, 100 Cavaleriei Lévl. et Vant. IV, 94 \*- soneriloides Lévl. IX, 21 (Breweria Hassleriana Chod.) IX, 195 Breynia accrescens Hayata I, 56 stipitata Müll. Arg. var formosana Hayata I, 57 (Brickellia Hartwegi Gray) IV, 155 - paniculata B. L. Robinson IV, 154 Bride lia Mildbraedii Gehrm. VIII, 575 Brittonastrum mexicanum (Ktze) Brig. -- pallidum (Lindl.) Briq. VIII 308 (Briza bipinnata L ) VIII, 300 – media L. var. Horákii Rohl. I, 24 Brochoneura Dardaini E. Heckel IX, 188 (Brodiaea bicolor Suksd.) VI, 77 (- Douglasii S. Wats.) VI, 77 (- grandiflora Sm.) VI, 77 (- Howellii S. Wats.) VI, 77 (Bromus brevis Steud.) IV, 280

VIII, 123

VIII, 124

Hassler VIII, 124

ler VIII, 123

Bromus cappadocicus Boiss. et Bal. var. argaeus Hack. VI, 153 (- ciliatus var. glaberrimus Suksd.) VI, 74 erectus Huds, var. \*pubiculmis K. Wein IX, 377 - - var. uninodis Hack. VI. 52 - eximius (Shear) Piper VI, 74 — — var. robustus (Shear) Piper VI, 75 - var. umbricatus Piper VI, 75 - fasciculatus Presl var. \*alexandrinus Thell. V, 161 macrantherus Hack. III, 29 unioloïdes H. et K. var. brevis (Steud.) Hack. IV, 280 - var. major Zobel IV, 301 var. montanus Hack, IV. 280 — — var. typicus Zobel IV, 301 - variegatus M. B. var, laxior Hack. VI, 152 – – var. subhirsuta Hack. VI, 153 (- vulgaris Shear) VI, 75 (-- var. eximius Shear) VI, 74 (-- var. robustus Shear) VI, 75 Brownleea Pentheriana Kränzlin 191, VI, 358 Bruguiera eriopetala W. et Arn. var. exsetata Th. Val. V, 386 Brunella vulgaris L. VIII, 309 - - f. pygmaea Witte II, 122 Brunfelsia Hopeana (Hook.) Benth. var. macrocalyx Dusén VII, 264 (Brunia rubra Willd.) I, 128 (— squarrosa Thunbg.) I, 128 (Bryanthus aleuticus A. Gr.) VIII, 112 \*Bryonia Haussknechtii Bornm. IV, 354 \*- Helleri Lévl. X, 155 Buchenroedera griquana Schlechter III, 192, VI, 359 Buddleia americana L. IX, 358 boliviana Pax V, 227
Hieronymi R. E. Fries III, 863
Humboldtiana R. et S. IX, 359 \*- ligustrina Loes. IX, 359 – marrubiifolia Benth. IX, 359 \*— monticola Loes. IX, 360 - nivea Duth. IV, 175

X, 92 \*— anguipes Schltr. X, 183 IX, 106 IX, 165 Betchei F. v. M. IX, 106 (- - Fleischm. et Rech.) IX, 106 - Burkillii A. T. Gage VII. 95 \*- cochleatum Schltr. VIII, 455 \*- codonanthum Schltr. X, 177 \*- - var. minor Schltr. VIII, 569 IX, 165 crenulatum Rolfe III. 185 \*- cyrtopetalum Schltr. IX, 165 elaphoglossum Schltr. X, 181 fascinator Rolfe VII, 175
 fenestratum Sm. V, 297 V, 296 \* Gustavi Schltr. IX, 165 \*- hastiferum Schltr X, 184 pendula R E. Fries IV, 206perfoliata H. B. K. IX, 359 \*— § Hyalosema Schltr. X, 181 \*— § Hybochilus Schltr. X, 96 \*— jamaicense Cogn. VII 122 - scordioides H. B. K. IX, 359 similis R. E. Fries IV, 207
Ulei Dusén VII, 264 \* Incarum Kränzl. I, 86 \*- klabatense Schltr. X, 93 verticillata H. B. K. IX, 359 \*- Korthalsii Schltr. III, 320 (Buechnera gesnerioides Willd.) VII, - laxiflorum Ldl. var. Schltr. X. 178 (- orobanchoïdes R. Br.) VII, 163 \*- § Lepidorrhiza Schltr. X, 93 \*- lokonense Schltr. X, 94 Büttneria asperrima R. E. Fries VIII, 123, 374 \*- longerepens Schltr. X, 95 celebica Hochr. V, 349 VI, 65 - filipes Mart. var. \*puberula Hassl. VIII, 124 \*- Mac Gregorii Schltr. X, 252 - salpellata Pohl ssp. \*meridionalis \*- macrostachyum Kränzl. VI, 65 Hassl. VIII, 123 \*— masarangicum Schltr. X, 96

Buffonia mauritanica Murb. V, 203 Bulbinella Gibbsii Cock. VIII, 220 \*Bulbophyllum aberrans Schltr. X, 183 \*- adenocarpum Schltr. VIII, 568 \*— agapethoides Schltr. X, 179 \*— amblyoglossum Schltr. X, 95 \*— amplebracteum Teysm. et Binnend. \*- § Aphanobulbon Schltr. X, 177 (- atroviolaceum Fleischm, et Rech.) (— aurantiacum Hk. f., non F. v. M.) (- ciliatum Schltr., non Lindl.) IX, 165 \*- § Codonosiphon Schltr. X, 178 \*- corticicola Schltr. VIII, 568 (- crassifolium J. J. Sm., non Thw.) (- densiflorum Ridl., non Rolfe) IX, 165 (— flavescens Lindl. var. triflorum Sm.) (- longispicatum Kränzl., non Cogn.)

Büttneri salpellata Pohl var. α \*asper-

- - var.  $\beta$  \*glabrescens Hassl.

— — — — forma \*glabra (Ekm.) Hassl.

- - - forma \*scabra (Ekm.)

— — var. γ \*rigida (Ekman) Hass-

- - ssp. rigida Ekm. VIII, 123

rima (R. E. Fries) Hassl. VIII,

Bulbophylium masarangicum var. \*nanodes Schltr. X, 96
\*— microstele Schltr. VIII, 569

\*— microstele Schltr. VIII, 569 \*— Minahassae Schltr. X, 92

mutabile Ldl. var. \*ceratostyloides
 Schltr. X, 179

\*- mygrianthum Schltr. X, 178

\*— obliquum Schltr. X, 182 \*— obligoblepharon Schltr. X, 182

\*— Osyricera Schltr. IX, 165 \*— pachyneuron Schltr X, 93 \*— § Pahudia Schltr. X, 93

\*- perpendiculare Schltr. X, 179

\*- § Polyblepharon Schltr. X, 177

- praealtum Krzl. IX, 107

(— Prenticei Krzl.) IX, 106

\*— pubiflorum Schltr. X, 184
— puntjakense J. J. Sm. V, 296

\*— remotum J. J. Sm. X, 488 \*— rhynchoglossum Schltr. VIII, 569

\*— samoanum Schltr. IX, 107 \*— sapoetanense Schltr. X, 181 \*— § Saurocephalum Schltr. X, 184

\*- savaiense Schltr. IX, 106 (- sciadanthum F. v. M.) IX 98

semperflorens Smith V, 296
singaporeanum Schltr. IX, 165
Stathmocaulos Schltr. X, 180
subcubicum J J. Smith X, 487

\*— subuliferum Schltr X, 91 \*— trilobum Schltr. VIII, 455

\*— tylophorum Schltr. X, 180 \*— § Uncifera J J. Smith X, 488 \*— Weberbauerianum Kränzl I, 85

(Bulbostylis subaphylla Clarke) VIII, 94 Bumelia Bahamensis N. L. Britton V, 181

- loranthifolia (Pierre) N. L. Britton V, 181

- pseudo-lanuginosa Hollick IV, 104 (- retusa var. loranthifolia Pierre) V, 181

Bupleurum aciphyllum Webb var. \*robustum Burch. VIII, 552

- angulosum L. var. neriifolium Pau VII, 85

— forma Montserratense Pau VII, 85

- atlanticum Murb. V. 205

X— longifolium L. var. \*atropurpureumDom. l, 12

\*- Muschleri Wolff. IX, 265

(— oligactis J. Ball) V, 205 — ranunculoïdes L. d. pygmaeum

Vacc. VIII, 332
(— var. minor Beauv.) VIII, 832

- stellatum f. maximum Ch. et Br.

Burbidgea schizocheila C. H. Wright III, 188

\*Burmannia Gjellerupii I. I. Sm. X, 487 Bursera Inaguensis N. L. Britton V, 180 Butomus umbellaius L. b. minor Bolz. IX, 187

\*Buxus cephalantha Lévl. et Vnt. Ill, 21 Byrsocarpus Baumannii (Gilg) Schellenberg X, 244

Buchholzii (Gilg) Schellenbg. X, 245
 cassioides (Hiern) Schellenbg. X, 243

- Foenum graecum (De Wild.) Schellenbg. X, 244

monticolus (Gilg) Schellenbg. X, 244
niveus [Gilg] Schellenbg. X, 245
ovalifoliolatus (Gilg) Schellenbg.

X, 244

parviflorus (Gilg) Schellenbg. X, 245
Poggeanus (Gilg) Schellenbg. X. 245
pseudobaccatus (Gilg) Schellenbg. X, 245

usaramensis (Gilg) Schellenbg,

X, 244

— viridis (Gilg) Schellenbg. X, 246 Byrsonima volubilis DC.) IX, 270 Bystropogon maderensis Webb V, 116

var. ambiguus Menez. V, 116
var. genuinus Menez V, 116
var. Schmitzii Menez. V, 117

- var. valdehirsutus Menez. V, 116
- punctatus L'Herit V, 116

 $-\beta$  disjectus Menezes V, 116

- - α pallidulus Menezes V, 116

## C.

Cacalia auriculata DC. var. kamtschatica (Max.) Koidzumi IX, 136

Cactus Maxonii Rose VII, 288. VI, 300 (Caesalpinia Dinteri Harms) VII, 389

microphylla Mart. rubsp. \*Fiebrigii
 Hassler VIII, 208

— — forma  $\beta$  \*brachythyrsa Hassler VIII, 209

– – – forma.  $\alpha$  \*floribunda Hassler VIII, 209

obovata Schinz VII, 389
ovalifolia Urban) VI, 245

reticulata N. L. Britton VI, 245
(— Watsoni Fisher) V, 112

\*Cakile Arabica Velen. et Bornm. lX, 114. \*Calamagrostis boliviensis Hack. VI, 156

- canescens (Weber) Gmelin X, 290 - chilensis (Desv.) R. E. Fries IV, 89

\*- chrysostachya Hack. X, 169

\* - Conwentzii (C. neglecta × lanceolata S Almquist) Ulbrich VIII, 52.

- Huttoniae E. Hackel III, 64

lanceolata Roth X, 290
Lilloi Hackel IV, 340

malamalensis Hack. IV, 341
montevidensis Nees var. \*linearis

Hack. VI, 157
— nardifolia (Gris.) Hack. IV, 341

(- nigricans Mérat) III, 140

\*Calamagrostis nitida Hack. X, 168

— rosea (Gris.) Hack. IV, 278 - - var. macrochaeta Hack VI, 207

var. viridula Hack, IV, 342

spiciformis Hack, IV, 342
tenuifolia (Phil.) R. E. Fries IV, 89
turkestanica Hack, VI, 52

× - villosa Mutel var. \*pseudolanceolata Domin I, 15

Calamintha acinos (L.) Clairo. f. nana Witte II, 122

\*- Argyi Lévl. VIII, 423

(- ascendens Jord.) VIII, 460 \*- Cavaleriei Lévl. et Vant. VIII, 424 - chinensis Benth. var. grandiflora Max. f. umbrosa Komarow V, 272

— var. \*Souliei Lévl IX, 246 ( — Clinopodium Spenn.) III, 284 \*— Esquirolii Lévi VIII, 450

\*- Fauriei Lévl. et Vant. VIII, 259 - grandiflora Mch. var. glabrata Vandas IX, 534

- - a) oblongifolia Rohl I, 23 \*- - b) rhombifolia Rohl I, 23 (- koreana Lévi. IX, 246

- menthaefolia Ficalho) VIII, 460

(— menthaefolia Gr. et Godr.) VIII, 460 (- montana Hoffgg. et Linck) VIII, 460 (— montana var. prestantior Gris.) VIII, 460

(- Nepeta Ficalho) VIII. 460

 Nepeta Link et Hoffm. var. confusa Reynier VIII, 213
(— officinalis Bth.) VIII, 460
\*— Taquetii Lévl. et Vant. VIII, 423

\*— tsacapanensis Lévi VIII, 423 umbrosa Benth, var, \*shibetchensis Lévl. 1X, 322

Calandrinia punae R. E. Fries IV, 33 \*Calanthe anocentrum Schltr. IX, 98

\*— bigibba Schltr. IX, 99 \*— cardioglossa Schltr. II, 85 - celebica Rolfe X, 69

(- clavata Krzl.) IX, 100 \*- coelogyniformis Kränzl. V, 196

\*- Hattorii Schltr. II, 169 - Hennisii Loher VIII, 384 \*- Hosseusiana Kränzl. VII, 82

- Intescens Fleischm. et Rech. IX, 99

\*- Matsumurana Schltr. II, 168 \*- nephroglossa Schltr. IX, 99

- triplicata (Willem.) Ames X, 69 Vaupeliana Krzl. IX, 100 veratrifolia R. Por. IX, 101

\*Calathea Buchtieni Pax VII, 107 \*Calceolaria anagalloides Kränzl. I, 84 \*- brachiata (Sodiro Ms.) Kränzl. I, 106

\*- Buchtieniana Kränzl. V, 369 \*— Cajabambae Kränzl. I, 102 \*— callunoides Kränzl. I, 103

\*- Catamarcae Kränzl. I, 98 - costaricensis Kränzl. VIII, 526 \*Calceolaria cypripedii flora Kränzl. I, 101 \*- delicatula Kränzl. I, 102

\*— Engleriana Kränzl. l, 106 — epilobioides Kränzl. VIII, 530 - fallax Kränzlin VIII, 529

\*- Fiebrigiana Kränzl. I, 84 \*- Grisebachii Kränzl. I, 98 - Halliana Kränzl. I, 85

\*- heterophylloides Kränzl. I, 100

\*- inaudita Kränzl. I, 104 \*- Incarum Krzl. I, 103

\*- Lehmanniana Kränzl. I, 100 \*- lepidota Kränzl. I, 83

\*- lysimachioides Kränzl. I, 84 \*- macrocalyx Kränzl. I, 99

 malacophylla Kränzl. VIII, 526 \* - Martinezii (Sodiro mss.) Kränzl. I, 105 microbefaria Kränzl.

\*- Moyobambae Kränzlin IV, 353

\*- myrtilloides Kränzl. I, 99 \*- polyclada Kränzl. I, 105 \*- ramosissima Kränzl. I, 107

\*- ranunculoides Kränzl. I, 97 \*- rivularis Kränzl. I, 83

\*- sarmentosa Kränzl. I, 97

\*- Schickendantziana Kränzl. I, 104 - stenophylla Kränzl. VIII, 528

\*- urticina Kränzl. I, 82

\*- Weberbaueriana Kränzl. I, 101 - Witasekiana Kränzl. VIII, 527

\*- zanatilla Kränzl. I, 107

\*Calea anomala Hassler VII, 356

Calendula arvensis L. var. hydruntina Lacaita VII, 390

(- fulgida Groves) VII, 390

 officinalis ε hydruntina Fiori) VII, 390 \*Caleopsis Fedde nov. gen. VIII, 325

\*- sarmentosa (Greenm.) Fedde VIII, 326

Calibanus nov. gen. Rose V, 114

- caespitosus (Scheidw.) Rose V, 114 Calliandra brevicaulis Micheli, emend. Hassler VIII, 555

 – var. \* d genuina (Micheli) Hassl. VIII, 556

– var. α \*glabra (Chod. et Hassl.)

Hassler emend. VIII, 555 — — forma \*grandiflora

VIII, 555

— — – forma \* parviflora Hassler VIII, 555

— — var. β\*puberula Hassl. VIII, 555 - - forma hirsutula Hassler VIII, 556

– var. γ \*pubescens Hassler VIII,

 – – forma intermedia Hassler VIII, 556

 – var. ε \*tomentosa Hassl. VIII, 556

Calliandra brevicaulis var. f robusta (Chod. et Hassl.) Hassl. VIII, 556

portoricensis Benth var. major Sprague V, 79

\*Callicarpa Bodinieri Lévl. IX, 456

\*- Cavaleriei Lévl IX, 455

\*- Dunniana Lévl. IX, 456 \*- elegans Havek II, 88

\*- Esquirolii Lévl. IX, 325, 456. X, 64

\*- Feddei Lévl. X, 439 - lancifolia Millsp. VII, 285

\*- Léveilléana Fedde X, 64

\*- Lyi Lévl X, 439

\*- Martini Lévl. IX, 455

\*- panduriformis Lévl. IX, 455

\*- Seguini Lévl IX, 455

Callipeltis muralis (L.) Moris forma calvescens Sommier VIII, 495

Callistemma chinensis (L.) Skeels VIII,

(Callistephus chinensis Nees) VIII, 488 Callitris arenosa A Cunn. IX, 127

- Morrisonii R. T. Baker V, 166; IX, 128

Schwarzii Marloth IV, 286

 Tasmänica R. T. Baker IX, 127 (Callopisma cordifolium Lhotsky) I, 124 Calocephalus Knappii (F. M.) Ewart and White IX, 175

- Skeatsiana Ewart and White IX,

Calochortus subalpinus Piper VI, 77 (Calonyction campanulatum Hallier. f.) VIII, 231

(- Payoni Hallier f.) VIII, 231

Calophyllum recedens Jum. et Perr. de la Bathie IX, 571

(Caloptilium lagascae Hook et Arn.) IV, 141

Calotriche pedunculata DC. var. 1 genuina Merino VIII, 289

 var. 2 terrestris Merino VIII, 289 Caltha elata Duthie IV, 123

 palustris L. forma \* gigas Lévl. VII, 102

Calyceria crenata R E. Fries III, 357 Calypso bulbosa Makino non Reichb VI, 287

- - (L.) Reichenb. f. var. japonica (Maxim.) Makino VI, 286

(— japonica Maxim et Komar.) VI, 287 (Calystegia pubescens Lindl.) V, 365 \*Camaridium costaricense Schltr. III, 250

\*— pulchrum Schltr. X, 251 \*— Tonduzii Schltr. VIII, 571

\* - Türckheimii Schltr. X, 296

(Camassia Suksdorfii Greenm.) VI, 77
\*Camelia Costei Lévl. X, 148
Camelina Alyssum Thell. VIII, 870

(- dentata Pers.) VIII, 370 (Campanula afra Cav.) VII, 95

- andia Rupr. var. Alexeenkoi Fomin IX, 266

Campanula anomala Fomin IX, 265 ardonensis Rupr. var. latifolia Fomin IV. 266

(- Aucheri Alb.) IX, 265

- var. compacta Fomin IX, 265 - Bayerniana Rupr. var. Trautvetteri Fomin IX, 266

(- - var. andina Trautv.) IX, 266

- Beauverdiana Fom. IV, 33 (- bellidifolia Radde) IX, 265

- - Adam var. longisepala Fomin IX. 265

(- Biebersteiniana Meyer) IX, 265 cervicaria L. α albiflora Sireitsch.

VIII, 227

\*— Chanetii Lévl. IX, 450

- circassica Fomin IX, 265

- cochleariifolia Lam. var. Hänke forma polyphylla E. Steiger IV, 70

- daghestanica Fomin IX, 264

dichotoma L. var afra Pau VII, 95

finitima Fom. VI, 34

- Gieseckiana Vest) VIII, 182

(- Gisleri Brügger) X, 221

 glomerata L. forma hispida J. Witasek VI, 145

(- Hohenackeri Fisch, et Mey. IX, 263

\* - lamioides Witasek X, 398 - longestyla Fomin IX, 263

(- macrorhiza Willk.) VIII, 135

— Massalskyi Fomin IX, 266 (— Meyeriana Rupr.) IX, 265 — nevadensis Pau. VIII, 135 — Ortleppi Lévi V, 251

(- parviflora Lam.) IX, 264

- patula L B albiflora Sireitsch. VIII, 227

- petrophila Rupr. var. angustiflora Fomin IX, 266

(- rotundifolia Boiss.) VIII, 135

- - L.var.Gieseckiana (Vest)Simmons VIII, 182

— var. lapponica (Wit.) Simmons VIII, 182

(— — forma lapponica (Wit.) Simmons) VIII, 182

(-- rupestris Rupr.) IX; 265

- sarmatica Ker var. gracilis Fomin

— — forma ramosissima (Somm. et Lev) Fomin IX, 264

(- saxifraga Alb.) IX, 265

- - M. B. forma stenophylla Fomin IX, 265

(- - var. tridentata Rupr.) IX, 265 Scheuchzeri forma macrocalyx Thellung X, 221

 $(--\times \text{rhomboidalis}) X, 221$ 

- - Vill. var. umbrosa E. Steiger IV, 70

- sibirica Becker IX, 264

(Campanula sibirica var. Trautv.) IX, 264 caucasica

- - var. divergens Tranty, form. corymbosa Fomin IX, 253

- - forma elatior Fomin IX, 263 - var. Hohenackeri (Trautv.) Fomin

IX, 263

- - - forma nana Fomin IX, 264 — — forma parviflora Fomin IX, 264

 – var. imeretina Trautv. IX, 263  $(--\beta)$  major Albow) IX, 263

 $(--\beta)$  major Boiss.) IX, 263

 var. major Somm. et Lev. IX, 264 (- - var. parviflora Trauty) IX, 264

(- - var. typica Trautv.) IX, 263 - stricta L. forma adpressa J. Witasek VI, 145

 suanetica Rupr. forma appendiculata (Somm. et Lev.) Fomin IX, 266

 tridens Rupr. var. δ ciliata Rupr ) IX, 264

(- tridentata Alb.) IX, 264

(- tridentata Radde) IX, 265

 Schreb. var. barbataFomin IX, 264 (- - var. gracilis Fomin) IX, 264

(- - L. var. rupestris Trautv.) IX, 264 (-- var. saxifraga Trautv.) IX, 264

(— ursaria Brügger) X, 221 — Witasekiana Vierhapper III, 58 Campanumena Labordei Lévl. VI, 376 Campe barbarea (L.) W. F. Wight VI, 172

- stricta (Andrz.) W. F. Wight VI, 171 Camphorosma Lessingii Litw. III, 93

- monspeliacum M. B.) III, 98

(— — Georgi) III, 94 (— — Pall.) III, 93

 monsp. L var, hirsutissimum Litw. III, 93

— — var. pilosum Litw. III, 93

— — var. ruthenicum Trautv.) III, 94 - - var. typicum Trautv.) III, 93

(- ruthenicum C. A. M.) III, 93 (- ruthenicum M. B.) III, 93

Campnosperma acutiauris Boerl. et Koord, X, 319

Camptocarpus Bojeri Jum. et Perr. de

la Bath. IX, 297 — longifolius Cost. et. Gall. IX, 130

 mauritianus var. madagascariensis Cost. et Gall. IX, 129

Campylanthus salsoloides Roth var. penduliflorus Pit. IX, 379

\*Campylocentrum stenanthum Schltr. X, 486

\*— Türckheimii Schltr. X, 363 Campylochnella pungens v. Tiegh. VI, 16 \*Campylotheca rutifolia Lévl. X, 123 Canarium amboinense Hochr. VII, 11 (— decumanum Engl.) VII, 12

- Englerianum Hochr. VII, 12

Canarium hispidum Bl. forma minor Hochr. VII, 12

- longissimum Hochr. VII, 11

 patentinervium Miq. var. genuinum Hochr, 11

— — var. meizocarpum Hochr. 11 - pseudocommune Hochr. VII, 11

 var. subelongatum Hochr. VII, 12 - pseudodecumanum Hochr. VII, 12

- Rooseboomii Hochr. VII, 12 —? sumatranum Boerl, et Koord, X, 317

- Valetonianum Engl. VII, 12

Canavalia bahamensis N. L. Britton VI. 246

\*Canthium Cavaleriei Lévl. X, 434 \*- Dunnianum Lévl. IX, 324

(Capnoides brachycarpum Rydb.) X, 315

- hastratum Rydb.) X, 315 \*Capparis Bodinieri Lévl. IX 450 \*— brachybotrya Hallier II, 59

\*- - var. angustifolia Hallier II, 61

\*- myrioneura Hallier II, 60

\*- - var. latifolia Hallier II, 61 - sepiaria L. var. trichopetala Th.

Val. V, 380 (— trichopetala Th. Val.) V, 380 (Capraria montevidensis (Spr.) O. K.

var. intermedia O. K.) IV, 120 Capsella bursa pastoris (L.) Mnch. d annua Hay. VIII, 370

— — var. \* coreana Lévl. VII, 384

– — — f. trigona Pau VII, 84 Caragana arborescens L. f. Lorbergi

Koehne VI, 337 – sericea Pamp. VIII, 400

Cardamine amara L. forma hirta W. et Gr. subf. ramosa C. G. Westerld.

(- arenosa Roth) VIII, 321 (- Boryi Boiss.) VIII, 132

Clusiana (Rchb.) Hay. VIII, 368
digitata O. E. Schulz) VIII, 398

\*- Fauriei Lévl. X, 350

flaccida Loj. Poj. III, 333
glauca Spr. var. \*scutariensis Rohl. III, 145

(— Halleri Prantl) VIII, 322 (— heterophylla Bory) VIII, 132 — Forst. f.) O. E. Schulz var. uniflora [Hook, f.] Cock. VIII, 221

(- hirsuta L. var. uniflora Hook. f.) VIII, 221

(- Huetii Boiss.) IX, 133 macrocarpa Br. III, 374

- maritima Portensch. var. C. \* Maglicensis Rohl. III, 145

\*- Nakaiana Lévl. X, 350

(- petraea Prantl) VIII, 321

pratensis L. f. paludosa Knaf subf. seminuda C. G. Westerld. IV, 19 (- stolonifera Scop.) VIII, 322

\*- Taquetii Lévl. et Vant. VIII, 259

Cardaminopsis (C. A. M.) Hay, nov. gen. VIII, 321

- arenosa (L.) Hay. VIII, 321

— -- b. intermedia (Neilr) Hay. VIII, 321 - - a simplex (Neilr.) Hay. VIII. 321

- Halleri (L.) Hay. VIII, 322

— — b. trachytica (Fritsch) Hay. VIII, 322

 hispida (Myg) Hay. VIII, 321 - neglecta (Schult.) Hay, VIII, 322 (? Cardiospermum Schmidelia Dalz. et

Gibs.) VIII, 185

Carduncellus matritensis Pau III. 331 (- pinnatus var. acaulis Cutanda) III. 331

(Carduus arenarius Desf.) IX, 468

(- Balansae Bonnet V, 207

- blepharolepis Chiov. VI, 183

-- boeocephalus Webb var. β glaber Pit. IX, 278

 – var. α tomentosus Pit. IX, 277 - carlinoides Gou. var. nevadensis

Pau VIII, 135

- Gayanus Dur. var. spinosissimus Mer. VIII, 66

Macounii Greene V, 398
opistolobus Pau VII, 86

— palousensis Piper VIII, 275

×— peisonis (C. nutans L. ×mamulosus Ehrh.) Teyber VIII, 94; IX. 189

- pteracanthus Dur. var. tunetanus Murb. V, 207

rhodopeus Vel. I, 134vittatus Small III, 294

(Carex acuminata Willd.) VII, 206 — acuta L. var. prolixa (Fries) Husn. VII, 207

- var. tricostata (Fries) Husn. VII, 207

alajica Litw. X, 269

×- albidula (C. canescens L. × loliacea L.) Holmb. VIII, 490

×— — forma subcanescens VIII, 490

×— — forma subloliacea Holmbg. VIII, 490

– Alexeenkoana Litw. X, 268

— andina Phil, var. \* subabscondita Kükenth. VIII, 7

(— aperta var. angustifolia Boot.) VI, 75

(- Appeliana Zahn) VII, 208 Argyi Lévl. et Vnt. II, 172

(- argyroglochin Hornm.) VII, 205

Arsenii Kükenth. VIII, 326
 aterrima Hoppe) VII, 205

– atrata L. var. aterrima (Hoppe) Husn. 205

(- Bastardiana DC.) VII, 207

 Bernardina S. B. Parish VII, 42 - blepharicarpa Franch. f. distenta Kükenth. VII, 104

- Blinii Lévl. et Vant. III, 352

Carex bordabensis Litw.) X, 270

(— borotalicola Rgl.) X, 269 - brachypoda Holm IV, 51

- brunnea Thunbg. var.\*subleiogyna Kükenth. VIII, 8

(- brunnescens var. silvatica [Meinsh.] Holmb. × Ioliacea [L.] Holmbg.) VIII. 489

 Buxbaumii Whlbg, var. ovata Zobel VIII, 305

 caespitosa L. var. \* rubra Lévl. et Vant. VII, 104

campylocarpa Holm IV, 53

 $(-\text{ canescens } \beta \text{ subloliacea Hartm.})$ VIII, 489, 490

— × Ioliacea (O. Hagström) Grütter VIII, 490

(- Cardouei Lévl.) VII, 104

- caryophyllea Lat. subsp. nervata Franch. et. Sav. forma dissita Franch.

— — var. pskowiensis Litw. IV, 10 - caucasica Stev. var. abbreviata Litw. IX, 563

— — var. bracteata Litw. IX, 563 - Cavaleriei Lévl. et Vnt. II, 172

\*- Cavaleriensis Lévl. et Vant. III, 349

(- Chevalieri Corb.) VII, 207 - Chorda Lévl. et Vant. III, 352

(— clavaeformis Reich.) VII, 206 – conglobata Kit, var. acuta Litw. X, 269

\* - crassibasis Lévl et Vant. V, 194

- cryptochlaena Holm IV, 53 – curvula All, var, longe-aristata E. Steiger III, 234

 czarwakensis Litw. X, 268 \*- dahurica Kükenth, VIII, 326

\*- Debeauxii Lévi et Vant. VI, 264 depressa Link var. eutina Woron. et Marc. VIII, 184

– var. transsilvanica (Schur) Husn.

VII, 207

\*- diamantina Lévl. et Vant. IV, 226 digitata L. var. compactior Kükenth. III, 141

– var. leiocarpa Hsm. III, 141
– lusus picta Hsm. III, 141

(— dioica × echinata ? C. de Gaudin) VII, 205

 $--\times$  - Murray var. grypos (Schk.)

J. Vetter VI, 115

f. laxa Junge V, 188

 dispalata Boott. forma Kükenth. VII, 104

— disticha Huds. var. longibracteata Husn. VII, 204

– – var. modesta (Gay) Husn. VII, 204 \*— Dunniana Lévl. VII, 231

— duriuscula C. A. M. var. interupta Litwin. IX, 562

(— echinata var. exelsior Fern.) VI, 76

Carex echinata Murr. var. Grypus (Schk) Husn. VII, 205

- war. ormantha Fernald) VI, 76 \* egena Lévl. et Vant. IV, 227

- elatior Beck. var.\* Perrieri Lévl. VII, 340

\*— Élmeri Kükenth. VIII, 326

 elongata L. var. Gebhardii (Willd.) Husn. VII, 205

× - Emmae (C. remota × divulsa) L Gross III. 125

\*- Endlichii Kükenth. VIII, 291

(- eriandrolepis Lévl.) VII, 104 ericetorum Poll. var. membranacea (Hoppe) Husn. VII, 207

\*- erythrobasis Lèvl. et Vant. V, 240 - Esquirolii Lévl. et Vant. III, 351

eurycarpa Holm IV, 52

- extensa Goodn, var. nana Husn. VII, 207

\*- Fedtschenkoana Kükenth. VIII, 327 (— festiva var. Horneri Piper) VI, 75 -- - var. stricta Bailey) VI, 75

fimbriata × sempervirens Kükenth.

V, 157

- flacca Schreb. var. chlorocarpa R. Keller II, 148

- flava L. var. lepidocarpa (Tausch) Husn. VII, 208

var. vulgaris forma brevirostris P. Junge IV, 288

formosensis Lévl. et Vant V, 31

(- frigida Rgl.) X, 266

- frigida All. var. debilis Favrat X, 220

(- fulva Goodn.) VII, 207

- furva (Bailey) Piper VI, 75 (- Gaudiniana Guthn.) VII, 205 (- Gebhardii Willd.) VII, 205

(— glareosa forma elegantissima Kük.) VII, 103

- Wahl var. Soriofkensis Lévl. et

Vant. VII, 103 glauca Murr var. acuminata (Willd)

Hus. VII, 206 Scop. forma aristolepis (Kükenth.) Gross III, 125

- Murr var Reichenbachiana Husn. VII, 206

- - b murensis Terracc. V, 141 - – var. serrulata (Biv.) Husn. VII, 206

- globularis L. var. \*mitsurickensis Lévi. et Vant. VII, 104

- Goodenoughii Gay var. curvata Aschers. et Graebn. forma brachystachys E. Steiger III, 234 — f. proterandra E. Steiger III, 235

— — var. subrigida Kükth. V, 157

— gracilenta Litw. X, 266

- lusus longepedunculata Litw. X, 267

– lusus rhyzogyna Litw. X, 267

(Carex gracilis Ledeb., non Schkuhr) VIII, 489

- Curt. f. aterrima Zobel VIII, 305 — lusus basigyna forma ramulosa Zobel VIII, 305

forma fuliginosa Zobel VIII, 305

(- Grypus Schk.) VII, 205

- haematostoma Nees forma \*minor Kükenth. VIII, 8

\* - Hallaisanensis Lévl. et Vant. V. 240 hangtongensis Lévl. et Vant. IIÎ, 352
Hayatae Lévl. V, 240

- heleonastes forma \*subtilis Abrom. VII, 105

- hirta L. var. hirtiformis (Pers.) Husn. VII, 208

 — — subv. erythrostachys Lévl. et Vant. III, 208

( - hirtiformis Pers.) VII, 208

 hispida Willd. var. Soleirolii (Dub.) Husn. VII, 206

\*- Hongnoensis Lévl. VIII, 426

(- Hordii var. nervosa Bailey) VI, 75 - - var. neurocarpa Piper VI, 75 - Hornschuchiana Hoppe var. Appeli-

ana (Zahn) Husn. VII, 208 - - var. discolor Vollm, II, 102 - - var. fulva (Goodn.) Husn. VII, 207

 – var. xanthocarpa (Degl.) Husn. VII. 207

\*- Husnotiana Lévl. IX, 444

(- inconspicua Saut.) VII, 205 incurva Lightf. var. inflata Simmons VIII, 77

\*- indistinctum Lévl et Vant. V, 194

(- intermedia Miég.) VII, 206 - intricata Tin.) VII, 206

(- - var. Bructeri Meyer) VII, 206 Jamesonii Boott var. \*subfulva Kiikenth. VIII, 7

 kenkolensis Litw. IX, 562 (- Kochiana DC) VII, 208

(- Korsakoviensis Lévl.) VII, 104 Koshewnikowi Litw. X, 265

X – Laestadii (C. brunnescens [Pers.] Poir. X Ioliacea L.) Holmbg. VIII, 489 

Holmbg. VIII, 489

— Holmbg. forma subloliacea

Holmbg. VIII, 489
\*— latitans Lévl. V, 240

(- lepidocarpa Tausch) VII, 208

− − × Hornschuchiana Chev. VII, 207 (- leporina L. var. americana Olnev) VI, 75

 var. argyroglochin (Hornm.) Husn. VII, 205

– var. \*Gavei Husn. X, 248

limnacea Holm IV, 50
ludibunda Gay (C. paniculata × canescens) f. supercanescens lunge V, 189

Carex ludibunda Gay (C. paniculata X canescens) f. superpaniculata Junge V, 183

- luzulaefolia W. Boott var. strobilantha Holm IV, 54

\*- Lyi Lévl. et Vant. III; 349 - macilenta Fr. H. N. VIII, 489

( - macilenta Nyl. VIII, 489

 Fr. H. N. forma subloliacea Holmbg. VIII, 490

 forma subsilvatica Holmbg, VIII. 490

\*- macrandrolepis Lévl. V, 241

magnifica Dewey VI, 75
Mairii Coss. et G. var. pseudo-Mairii (G. Cam.) Husn. VII, 208

\*- meiocarpa Levl. et Vant. IV, 226 - melanantha C. A. M. IX, 563 - - var. & baicalensis Turcz. IX, 563

 – forma pallida Litw. IX, 563 (- melanocephala Kar. et Kir.) IX, 563

— membranacea Hoppe) VII, 207

\*- Merrillii Kükenth. VIII, 7 \*- metallica Levl. V, 239

- microstachya Ehr. var. Gaudiniana (Guthn.) Husn. VII, 205

( — multifiliculmis Lévl. et Vant.) VII, 104 - muricata L. var. virens (Lmk.) Husn. VII, 204

 nardina Fries var. \*atriceps Kükenth. VIII, 7

(- nemorosa Willd.) VII, 205

\*- neokükenthaliana Lévl. et Vant. III,

(- - var. melanantha Regel) IX, 563 (- nitida Host) X, 269

- norvegica Willd. VII, 103

( - nudata var. angustifolia Bailey) VI,75

 – var. versuta Piper VI, 75 (- obesa Meinsh.) X, 269

 ontakensis Lévl. V, 31 oxycarpa Holm IV, 52 pachystoma Holm IV, 51

(- pallescens var. alpestris Kohts) III, 141

- - var. leiopsis Dalla Torre et Sarnthein III, 141

paludosa Goodn, var. Kochiana

(DC.) Husn. VII, 208 pauciflora Light var. elatior Kükenth.

et Schuster II, 101

- paucimascula Lévl. et Vant. III, 351 - pediformis C. A. M. var. nana Litw. X, 270

forma \*parviflora Kükenth, VIII, 7

- Petunnikowi Litw. IX, 562 - phaeocephala Piper VI, 75

 physodes M. B. forma globosa Litw. IV, 10

 forma elliptica Litw. IV, 10 pilulifera L. var. Bastardiana (DC.) Husn. VII, 207

Carex pisiformis Boott var. sachalinensis (Fr. Schm.) Kük. VII, 104

( — praetutiana Parl.?) VII, 206

(- pratensis var. furva Bailey) VI, 75 (- prolixa Fries) VII, 207

- Pseudocyperus L. f. furcata lunge V. 189

pseudofoetida Kük. VII, 187

– Pseudoheleonastes (C. dioica 🔀 brunnescens) v. Hdl.-Mazz. VII. 188 - pseudo-Mairii G. Cam.) VII, 208 \*- pseudo-Spachiana Lévl. et Vant.

III, 349

 — pseudoturfosa (stricta × nigra [vulgaris]) D. T. et Sarnth. III, 141 - pulicaris L. var. caespitosa Vollm. II, 101

\*- Ramosii Kükenth. VIII, 8 ( – retusa Degl.) VII, 206

- retusa Degl. var. anacantha G. et G.) VII, 206

rigida var. hesperia Piper VI, 76
ripariaeformis Litw X, 267
Sadae Lévi. et Vant.) VII, 104

X — Sarntheinii (C. alpina Sw. × atrata L.) J. Vetter VI, 116

- schistorhyncha Lévl. et Vant. III, 353 - Schmidtii Meinsh. VII, 104

 sempervirens Vill. f. pumila E. Steig. III, 235

(- serrulata Biv.) VII, 206 - sitchensis Hook.) VI, 75

\*- Skottsbergiana Kükenth. VIII, 7

(- Soleirolii Dub.) VII, 206

- songarica K. et K. var, atrata Litw. X, 268

(- soriofkensis Lévl. et Vant.) VII, 103 (— spadicea Roth) VII, 208

 stellulata var. excelsior (Bailey) Piper VI, 76

var. ormantha (Fern.) Piper VI, 76

 stenophylla Wahlbg, var pellucida Litw. IX, 562

(— sterilis var. excelsior Bailey) VI, 76 \*- Taquetii Lévl. VIII, 426

 tenella Sckuhr var. \*brachycarpa Kükth. VII, 103

 – var. \*Dominii Lévl. et Vant. VII, 103

 – var. \*Nakaii Lévl. VII, 103 (- tenuiflora Hartm.) VIII, 489, 490

(- - var. macilenta Lang) VIII, 489 - Timmiana (C. Goodenoughii X trinervis Junge) f. elatior Junge V, 189 – (C. Goodenoughii × trinervis)

f. pumila Junge V, 189

- tomentosa L. var. foemina Lamb. VIII, 323

 – b. lucana Torracc. V, 141 (- transsylvanica Boiss.) VIII, 184

(- - Schur) VII, 207

Carex tricarinata Lévl. et Vant. III, 353

(- tricostata Fr. VII, 207 (- tristis C. A M) X, 266

M. Bieb. var. asiatica Litw. X, 266 Turczaninowiana Meinsh. var.

Beaurepairaei Lévl. et Vant. II, 172 turfosa Kern, III, 141

(— turkestanica Rgl.) X, 269

-- umbellata var. brachyrhina Piper

( — — var. brevirostris Boott) VI, 76 - - Host ssp. sabynensis Lessing VII. 104

- ungurensis Litw. X, 266

(- verna Schk.) X, 269

 vesicaria L. var. ovata Zobel VIII, 305 (- Vladiniroviensis Lévl.) VII, 104

(- vulgaris var. bracteosa) Bailey VI, 76

- Fries var. intermedia (Miég.) Husn. VII, 206

— — var. intricata (Tin.) Husn. VII, 206 - vulpina L var. nemorosa (Willd.) Husn. VII, 205

(- xanthocarpa Degl.) VII, 207

— — (C. fulva × flava) f. subflava

Junge V, 189 – (C. fulva × flava) f. subfulva Junge V, 189

Yabei Levl. et Vant. II, 172 Carlina Canariensis Pit. IX, 277

 corymbosa L. var. 2 microcephala Mer. VIII, 65

(— Echinus M. B.) X, 400

vulgaris L. var. Poeverleini Landauer

Carlowrightia angustifolia Brdg. III, 377 \*Cârpesium evythrolepis Lévl. VIII, 170

\*— gigas Lévl. Vl, 330

\*- hieracioides Lévl. VIII, 170 \*- Taquetii Lévl. VIII, 170

\*- verbascifolium Lévl. VIII, 359

Carpha Schlechteri C. B. Clarke III, 162 Carpinus pseudo-caroliniana Holl.IV, 101 Carpotroche crassiramea Pitt. VIII, 472

- glaucescens Pitt. VIII, 471 - platyptera Pitt. VIII, 471 \*Carriera Dunniana Lévl. IX, 458 Carum Carvi L. forma pygmaeum Vacc. VIII, 332

- ferulaceum (Sibth. et Sm.) Janch. VIII, 257

(- ferulaefolium [Desf.] Boiss.) VIII, 257

(- flexuosum Fr.) VIII, 437

- majus Rendle et Britten VIII, 437 \*Caryopteris Exquirolii Lévl. IX, 449 Casearia camporum T. A. Sprague

II, 124 - novo-guineensis Th. Val. V, 385

- Thonneri De Wild. X, 524 Cassia alata L. var. perennis Pamp. VIII, 350

Cassia arida Rose V, 111

- basifolia Vog. var. \*aristulata Hassl. VIII. 129

- cathartica Mart sbsp. \*floribunda Hassl. VIII, 130

\*- Cochabambae Herz. VII, 55 demissa Rose V, 111

durangensis Rose V, 111

- excelsa Schrad, var. \*acutifolia Hassl. VIII, 128

 fulva Brdg. III, 375 - Goldmani Rose V, 112

- Inaguensis N. L. Britt, V, 180

 latistipula Benth. var. \*glauca Hassl. VIII, 129

- Purpusi Br. III, 375

siliquosa Areschoug X, 303

-- trachycarpa Vog. sbsp. \*macrophylla Hassl VIII, 129 Cassine xylocarpa Vent. III, 87

Cassinia aculeata R. Br. var. angustata J. M. Reader VII, 387

Castalia biradiata (Somm.) Hay. VIII, 320 (— candida var. oocarpa

semiaptera Schuster) VIII, 320 gracilis (Zucc.) Rose V, 112

Pringlei Rose V, 191

Castanea Davidii Dode X, 241

-- Duclouxii Dode X, 239 - Fargesii Dode X, 242 hupehensis Dode X, 240

— neglecta Dode X,241 ( — sativa Mill. var. γ acuminatissima

v. Seem.) X, 243

 Seguinii Dode X, 240 Vilmoriniana Dode X, 242 Castilleja Buffumii A. Nels. IX, 484

 crispula Piper VIII, 268 - dubia A. Nels. IX, 484

 inconspicua Nels, etKennedy V, 287 Casuarina distyla Vent. var. prostrata Maiden et Betche V, 87

Catabrosa aquatica P. B var. terrestris Deyss. IX, 543

(- vilfoidea Anderss.) VIII, 77

Catalpa bignonioides 🕻 Köhnei Dode VII. 8

(— Bungei  $\beta$  heterophylla C. A. M.) VII. 7

Duclouxii Dode VII. 7

×— Galleana (?×Kaempferi) Dode VII, 8 Henryi Dode VII, 7

 heterophylla Dode VII, 7 japonica Dode VII, 7

 sutchuensis Dode VII. 7 × - Teasiana (cordifolia? × Kaempferi)

Dode VII, 8 Catananche arenaria Coss. et DR. var. atricha Coss. V, 208

Catapodium Ioliaceum (Huds.) L. subsp. syrticum Barr. u. Murb. V. 213

Cathartica betonicifolia (Franch.) Prain Cayaponia macrantha Pitt. VIII, 534 \* Durangoina Loes. VIII, 297 \*— Endlichii Loes. VIII, 298 \*— Huichagorare Loes. VIII, 298 Cedronella canariensis Webb et Berth. var. anisata W. et B. subvar. albi-flora Pit. IX, 380 (Ceiba Fiebrigii Hochr.) VIII, 66 \* Glaziovi (O. K.) Hassl. VIII, 67 (— Glaziovii K. Sch.) VIII, 66 — pubiflora K. Sch. VIII, 66 — var. α \*genuina Hassl. VIII, 66 — — forma β \*coaetanea Hassl. VIII, 66 — — forma  $\alpha$  praecox Hassl VIII, 66 - var. b. \*glabriflora (Chod. et Hassl.) Hassl. VIII, 66 — — forma  $\alpha$  \*grandiflora Hassl. VIII, 67 - forma  $\beta$  \*transiens (Chod. et Hassl.) Hassl. VIII, 67 \*Celastrus clemacanthus Lévl. VIII, 284 (Celmisia Lyallii Hook, f. var. pseudo-Lyallii Cheesem.) IX, 409 (- petiolata Hook. f. var. rigida T. Kirk) VIII, 223 - pseudo-Lyallii Cock. IX, 409 - rigida (T. Kirk) Cock. VIII, 223 Celosia populifolia Moq. var. artemisiordes Mattei IX, 319 (- Bernhardesii R. da Cunha) VIII, 487 - brassicaefolia Mariz VIII, 487 macrophylla A. Fom. II, 134 Celtis Bungeana Bl. var. \*heterophylla Lévl. X, 476 \*- Cavaleriei Lévl. X, 440 - pseudo-crassifolia Holl. IV, 103 (Cenchrus Anjama Ham.) V, 67 (— asperifolius Desf.) V, 69 - ciliaris L.) V, 67 - ciliatus Chr. Smith) V, 67 - digynus Ehrenb.) V, 68 - echinoides Wight.) V, 68
- hordeiformis Pers.) V, 70
- longifolius Hochst.) V, 68
- mutabilis Wight) V, 67 - orientalis Willd.) V, 70 - pennisetiformis Hochst.) V, 68 rigidifolius Fig. et de Not.) V, 68
 setigerus Vahl) V, 68 Centaurea abbreviata (K. Koch) Hdl.-Mzt. X, 400 \*-- Amasiensis Bornm. III, 54 ×- auricularis (C. aspera × sonchi-

folia) Pau III, 326

VIII, 68

- Avilae Pau VIII, 576

- Calcitrapa L. var. gracilis Mer.

Centaurea coerulescens var. Kheilii Pau) III, 324 - epapposa Vel. I, 134 (- Ferdinandi Gren.) X, 261 (-- Fleischeri Hay) V, 224 - Gerstlaueri Erdn. II, 98 integrans A. Naggi I, 144 — jacea L. subsp. 2. angustifolia (Schrank) Gugl. var. y fimbriata Gugl. 11. 98 - - var.  $\beta$  semifimbriata Gugl. 11, 98 - - var  $\alpha$  typica Gugl. II, 97 — — var. α typica Gugl. f. glabrescens Gugl. II, 97 \_\_ \_ \_ f. minor Gugl. II, 97 — subsp. ι eujacea Gugl. II, 97 — — var. γ fimbriata Gugl. II, 97 - - var.  $\beta$  semifimbriata Gugl. II, 97 — — — f. recurvata Gugl. II, 97 — — var α typica Gugl. II, 97 - - - f. vulgata Gugl. II, 97 - - subsp 3. jungens Gugl. II, 98 — — × oxylepis (W. et Gr.) f. sub-jacea Holmberg V, 224  $\dot{-}$  -  $\times$  - f. suboxylepis Holmberg — — × scabiosa × rupestris Gugl. II, 98 - Kheilii C. Pau III, 324 -- limbata H. et L. forma elata Pan III, 323 - var. insularis C. Pau III, 323 — — var. melanosticha Lge. III, 324 × Lindbergii (C. jacea × phrygia) Gir. VIII, 33 - micrantha Hfg. et Lk. var. squa-momutica C. Pau III, 324 \*- missionis Lévl. VIII, 451 (- mixta H. Lindb.) VIII, 33 (- nervosa var. Ferdinandi Rchb. f.) X, 261 (- nigra Somm. et Lev.) X. 400 - nigrescens Willd. subsp. 1 eunigrescens Gugl. II, 98 — — f. typica Gugl. II, 98 - subsp. 2. ramosa Gugl. II, 98
(- nigricolor C. Pau III, 324 - pectinata All, non L.) X, 261 (- phrygia All., non L.) X, 261 ( - - var. adscendens Moritzi) X, 261 - L. subsp. intercedens Erdn. et Gugl. II. 98 rhaetica Moritzi f. albiflora Frav. VI, 119 (— salicifolia β abbreviata K.) X, 400  $(--\gamma)$  intermedia K.) X, 400 scabiosa L. ssp. eu-scabiosa Gugl.

α vulgaris K. δ nana Vacc. X, 265

Centaurea spina-badia Bub. var. silvatica Conill VIII, 32

 transalpina Schleich. b. lucana Terracc. V, 138

(- uniflora L.) X, 258

(- - var. biflora Colla) X, 257

(- - var. α genuina Briq.) X, 258

(-- - forma virescens Briq.) X, 257, 258

(- - var. nervosa Briq.) X, 262

(- - var. γ pluricephala Fiori) X, 257 – ssp. eu-uniflora Gugl. α genuina

Vacc. forma pleiocephala Vacc. X, 257

- - - subf. normalis Vacc. X, 257

--- - subf. viridis Vacc. X, 258 - -  $\beta$  subuniflora Vacc. X, 258

- - - forma simplex Vacc. subf. normalis Vacc. X, 258

- - - - subf. viridis Vacc. X, 257, 258

- - ssp. nervosa (Willd.) Rouy  $\beta$ eunervosa Vacc. forma simplex Vacc. X 263

X, 264 -- subf. eradiata Vacc.

X, 264 - - subf. glabrata Vacc.

- - - - subf. mollis Vacc. X, 264

— — — — subf. nana Vacc. X, 264

— — — — subf. normalis Vacc. X, 263

- - - - subf. pseudorhaetica Vacc. X, 264

- - ssp. nervosa (Willd.) Rouy  $\alpha$ subnervosa Vacc. X, 262

– – – forma ramosa Vacc. X,

262 \_ \_ \_ \_ subf. glabrescens Vacc.

X, 263 X, 263 - - subf. normalis Vacc.

- - - f. simplex Vacc. X, 262

- - - - subf. glabrescens Vacc. X, 262

– – – – subf. normalis Vacc. X, 262

(- - ssp. Thomasiana Vacc. var. adscendens Briq.) X, 259

- -  $\alpha$  eu-Thomasiana Vacc. X, 285

- - - f. intercedens Vacc. et Wilc. X, 259

(- - var. γ pluricephala Fiori) X,259 — — — f. simplex Vacc. V, 259

Centaurea transalpina adscendens  $\beta$ sub-Thomasiana Vacc. X, 260

- - - f. adscendens Vacc. X, 261 \_ \_ \_ \_ subforma glabrescens Vacc. X, 261

- - - - subf. normalis Vacc.

X, 261

- - - f. simplex Vacc. X, 260 — — — — subf. glabrescens Vacc.

X, 261 - - - - subf. normalis Vacc. X, 260

- xerolepida C. Pau III, 324 - Zederbaueri Hay. VI, 149

Centaurion capitatum (Willd.) Rendle ef Britten VIII, 437

- centaurium (L) W. F. Wight VIII, 14 - exaltatum (Grisb.) W. F. Wight VIII, 14

- maritimum (L) Fritsch VIII, 257 - Muehlenbergii (Grisb.) W. F. Wight

VIII, 14

- spicatum (L.) Fritsch VIII, 257

- tenuiflorum (Hoffgg. et Lk.) Fritsch VIII. 257

- uliginosum (W. K.) Beck VIII, 257 Centella virgata L. var. \*gracilescens Domin IV, 300

Centranthus calcitrapa L. var. Guetierrezi Pau III, 331

Centroglossa Glaziovii Cogn. I, 111 - Greeniana var. aurea Cogn. VI, 62

-? Peruviana Cogn. VI, 61 Centrolepis platychlamys F. M. Reader VII, 386

\*Cephalacanthus Lindau nov. gen. I, 158 \*-maculatus Lindau I, 158

(Cephalanthera alba (Cr.) Simk.) VIII, 257

(- Austinae Heller) VI, 44

(- chloidophylla Reichb. f.) VI, 44 (- cucullata Boiss. et Heldr.) VI, 44

(- kurdica Bornm.) VI, 44

latifolia (Mill.) Janchen VIII, 257
longibracteata Blume) VI, 44

\*Cephalanthus Cavaleriei Lévl. X, 434 (Cephalocereus de Laetii Gürke) VIII, 427

- purpureus Gürke VI, 299

- Ulei Gürke VI, 298

Cephalotaxus drupacea S. et Z. var. Harringtoniana (Forb.) Graebner VIII,

(- Harringtoniana [Forb.] K. Koch) VIII, 342

(Cerastium alpinum y caespitosum Malmgren) X. 509

- var. nevadense Pau VIII, 133

 $(--\delta \text{ serpyllifolium E. Regel}) X, 509$ - alsophilum Greene V, 398

- arvense L. b. adenophorum Hay. VII, 34

Cerastium arvevse & alpicolum Fenzl f. glanduliferum Vacc. VIII, 328 (- - var. Cavillieri Brig.) III, 122 - -  $\beta$  strictum Haenke f. canescens Vacc. VIII. 328 - - f. flaccida E. Steiger III, 236 – – f. glanduliferum Vacc. VIII, 328 - var. tenuipes Pau IX, 191 - - var. Webbii O. E. Jennings VIII. 490 - Boissieri Gren. var. Cavillieri Brig. III, 122 - - var. strictiforme Pau VIII, 134 - - var. viridulum Pau VIII, 133 campanulatum Viv. var. minus Loj. Poi. V, 26 (- caeruleum Boiss.) VII, 287, 386 (- Edmonstonii var. caespitosum G Andersson et Hesselm.) X, 509 - glomeratum Thuill, var. elongatum Beg. VII, 389  $(- - \alpha \text{ corollinum Rouy et Fouc, sub-}$ var. elongatum Rouy et Fouc.) VII, 389 (- latifolium Stein, non L.) VII, 34 - nitidum Greene V, 398 – oxalidiflorum Mak. VIII, 109 (- palustre Moris) V, 26 Regelii Ostenf. X, 509 Secalli Pau VIII, 133, 576
serpyllifolium M. B.) X, 509 - subulatum Greene V, 398 - uniflorum Murith b. Hegelmaieri Correns VII, 34 vulgatum L. γ gracile Hay. VII, 34 (- - f. gracile Hay.) VII, 34 (--9) grandiflorum lus. 2. Fenzl) X, 509 (Cerasus glaucifolia Wall.) IX, 35 (Ceratocephalus arnicoides (DC.) Ktze). V, 328 (- decumbens (Sm.) Ktze.) V, 328 (- - var. doronicoides (DC.) Ktze.) V, 328  $(-\beta \text{ macropodus (DC.) Ktze.) V, 328}$ (- diffusus (Poepp.) Ktze.) V, 324 (- exasperatus (Jacq.) Ktze.) V, 322 (- parvifolius (Benth.) Ktze V, 326 (- ramosus (Hemsl.) Ktze.) V, 326 (- repens (Walt.) Ktze.) V, 327 (- Salivaria (Domb.) Ktze.) V, 322 (Ceratochloa brevis Steud.) IV, 280 \*Ceratostylis Sayeri Schltr. IX, 27 - sima J. J. Sm. X, 67 \*- vagans Schltr. X, 67 Cercanthemum Baroni v. Tiegh. VI, 7 Cercinia annamensis v. Tiegh. VI, 7

— elongata v. Tiegh. VI, 8 Cercis canadensis L. f. alba Rheder VII, 360 Cereus adscendens Gürke VI, 295

Cereus anguinus Gürke VI, 92 - catingicola Gürke VI, 132 - Dusenii Weber II, 73 huitcholensis Weber II, 73 - Kalbreyerianus C Werckle IV, 223 - lepidanthus F. Eichlam VIII, 432 - leucostele Gürke VI, 132 Iongicaudatus Weber II, 73 mixtecensis J. A. Purpus VIII, 240
del Moralii J. A. Ewart VIII, 241 penicillatus Gürke VI, 297 - phaeacanthus Gürke VI, 133 piauhyensis Gürke VI, 298
Purpusii W. Weingart VIII, 429 - rhodanthus Gürke VI, 295 - Schenckii J. A. Purpus VIII, 232 - Sirul Weber II, 74 - squamosus Gürke VI, 296 - viperinus Weber II, 74 Cerinthe lamprocarpa Murb. var. luteolaciniata Maly VI, 293 (- minor var. indigotisans Maly, non Borb.) Vl, 293 – var. \*tuberculata Rohl, III, 146 Ceropegia albisepta Jum. et P. d. l. Bath. IX, 302 - breviloba Jum. et P. d. l. Bath. contorta Jum. et P. d 1. Bath. IX, 302 ×– hybrida (C. Sandersonii × similis) N. E. Br. V, 6 \*- Meyeri Arthuri Herter VII, 232 - petiolata Jumi et P. d. l. Bath. IX, 302 - saxatilis Jum. et P. d. l. Bath. IX, 301 - scabra Jum. et P. d. l. Bath. IX, 301 - similis N. E. Brown) V, 5 \*Cestrum Baenitzii Lingelsh. VII, 248 - bahamense N. L. Britton VI, 248 (- coriacenm Rusby) VII, 248 \*- Rojasianum Hassl. IX, 120 Ceterach cordatum (Thbg.) Deso. var. capense Hieron X. 270 Phillipsianum Kummerle X, 270 (Chabraea gracilis DC.) IV, 142 (- purpurea DC.) IV, 143 (- scrobiculata DC.) IV, 143 - suaveolens DC) IV. 143 Chaenomeles cathavensis [Hemsl.] C. K. Sch. III, 180 (Chaenomeles japonica var. alpina Maxim.) III, 180 - Maulei [Mast.] C. K. Schn. III, 180 – var. alpina [Maxim.] C K. Schn. III, 180 Chaerophyllum aureum L. var. maculatum (Boiss.) Hand -Mzt. X, 309 (- - var. maculatum Boiss.) X, 309 (- hybridum Ten.) X, 309

- maculatum Willd.) X, 309

(Chaetochloa composita Scribn.) IV, 307

(Chaetochloa purpurascens (H. B. K) F. Lams.-Scr.) IV, 308

Chamaecyparis Lawsoniana f. Depkeni L. Beissn. VI, 339

- obtusa S. et Z. var. formosana Hay. VIII, 367

(Chamaedrys glauca Jord. et Fourr.) III. 208

Chamaelaucium Halli A. J. Ewart VIII, 406 Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. var. abbreviatum Lun. VIII, 246

 – var. spectabile Simm. VIII, 182 Chamaesyce aequata J. Lun. IX, 398

- - var. claudicans J Lun. IX, 399

erecta J. Lun. IX, 399
hyssopifolia (L.) Small III, 270 - pinetorum Small III, 270

Chaptalia integrifolia (Cass.) Macl IV, 141

- similis R. E. Fr. III, 301

Chasalia pedicellata Th. Val. V, 396 Cheiranthus cheiranthoides (L.) Heller var. prostratus Lun. VIII, 245

Cheirodendron trigynum Gaud. var. \*Hawaiensis Lévl. X, 154

- - var. \*Kauaiensis Lévl. X, 154 – var. \*mauiensis Lévl. X, 154 \*Cheirostylis Chalmersii Schltr. X, 11

\*- macrantha Schltr. II, 83

\*- quadrilobata Schltr. X, 11 Chelidonium majus L. Iusus grandiflorum Wein VIII, 349

(Chelonanthus acutangulus [R. et P.] Gilg) II, 54

\*- camporum Gilg II, 54 - candidus Malme I, 124

\*- leucanthus Gilg II, 55 (Chenopodium album ssp. pseudo-Borbasii Murr) VII, 33

 – ssp A. striatum (Kras.) Murr γ pseudo-Borbasii (J. Murr) Hay. VII, 33

(- Borbasii J. Murr) VII, 33 (- foetidum Rusby) VII, 241

- — Schrad. f. pumilum (Kurtz) R. E. Fr. IV, 37

- hybridum L. var. laxiflorum Litw.

 – var. simplex Zobel VIII, 349 - murale L. var. prostratum Zobel VIII, 349

- pseudo-Borbasii Murr.) VII, 241 \*- rigidum Lingelsh. VII, 241

- rubrum L. var. microspermum Litw. IV, 11

(Cherleria sedoides var. ciliata Hut.) VII. 34

Chesneya elegans Fom. VI, 33

Chiococca bermudiana St. Brown IX, 189 pinetorum N. L. Britt. VII, 282 \*Chionanthus coreanus Lévl. VIII, 280

(Chirita anachoreta Hance) V, 222

- barbata Sprague VII, 175

(Chirita Chaneti Lévl.) IX, 323 (- cortusifolia Hance) V, 222

– eburnea Hance) V, 222 – Fauriei Franch.) V, 222 - hamosa André) VII, 175

- Juliae Hance) V, 223

- macrosiphon Hance) V, 223 - obtusa C. B. Cl.) V, 223 (- Martini Bodinier) V,

(- se icea Lévl. et Vant.) V, 223, IX, 329

(- sinensis Lindl.) V. 223

– var. \*Bodinieri Lévl, IX, 328 (Chironia inaperta Willd) IX, 259 (- Vaillantii Schm.) IX, 259

Chisocheton amboinensis Val. VII, 13 divergens Bl. var. genuinus Val. VII, 13

- - var. minor Val. VII, 13 – var. robustus Val. VII, 14

- lasiogynus Boerl et K. X, 317 - microcarpus K. et Val var. moluc-

canus Val. VII, 14 (Chitonia mexicana Moç. et S.) VIII, 243 \*Chlamydacanthus Lindavianus

Winkl. IX, 523 (Chloanthes coerulea F. v. Müller et Tate) IX, 176

Chlora perfoliata L. var. gracilis Deyss. IX, 543

- - serotina (Koch) b. exilis Bolz, IX, 188

(Chloraea Austinae A. Gr.) VI, 44 (Chloridion Cameroni Stapf) VI, 321 Chloris angustiflora Aresch, X, 300 (- bahiensis Steud.) X, 289

- - f. \*glabrescens Hack. VIII, 46 - capensis (Houtt.) Thell. X, 289

- distichophylla Lag. var.  $\beta$  argentina Hack. IV. 278

 divaricata R. Br. var. \*Muelleri Dom. IX, 553

- fasciculata (L.) Thell., non Schrad. X, 289, 461

nigra Hack. VI, 222

(- petraea Thunb., non Sw.) X, 289

- pycnothrix Trin.) X, 289 - radiata Sw.) X, 289

\*- uliginosa Hack. VII, 320 Chlorophytum Sereti De Wild. var.

likimensis De Wild. X, 526 Chondrilla chondrilloides (Ard.) Fritsch VIII, 257

(- prenanthoides Vill.) VIII, 257

- vallisoletana Pau III, 331

(Chorisia Chodatii Hassl.) VIII, 67 - insignis H. B. K. var. \*Chodatii (Hassl.) Hassl. VIII, 67

(- speciosa Morong, non St. Hil.) VIII, 66

(Chrysanthemum alpinum Asso) VII, 350

68 Chrysanthemum alpinum L.  $\beta$  minimum (Vill.) b. glabrescens Bolz. IX, 187 (- aragonense Asso) VII, 350 (- Bocconi Pourr.) VII, 350 \*- Chanetii Lévl. IX, 450 (- grandiflorum Hook.) X, 510 - indicum L. var. \*coreanum Lévl. - leucanthemum L. f. subnudicaule Witte II, 123 - Pallasianum Kom. V, 276 - pallidum Mill. VII, 349 \*x- Rohlenae Dom. (Chr. corymb. x Leucanth.) I. 14 var. integratum A. segetum L. Trotter IX, 191 (- sinense Sabine) VIII, 488 - stipulaceum (Mnch.) W. F. Wight VIII, 488 - Trapezunticum Hdl.-Maz. X, 399 \*Chrysochlamys macrophylla Pax VII, 111 (Chrysocoma graveolens Nutt.) VIII, 270 \*Chrysosplenium Cavaleriei Lévl. et Vant. IX, 441 \*- Dunnianum Lévi. et V. IX, 441 \*- Esquirolii Lévl. IX, 444 \*- filipes Kom. IX, 393 \*- hydrocotylifolium Lévl. et Vant. IX, 441 \*- pseudo-Fauriei Lévl. VIII, 282 \*- subargenteum Lèvl. et Vt. IX, 441 \*Chrysothamnus formosus Greene VII, 196 - monocephala Nels. et Kdy. V, 288 - nauseosus var. graveolens (Nutt.) Piper VIII, 270 (- speciosus Nutt.) VIII, 270 Chrysurus paradoxus Somm. V, 258 \*Chusquea depauperata Pilger I, 149 \*- inamoena Pilger I, 150 \* - Jürgensii Hack VII, 325 \*- picta Pilger I, 151 \*- polyclados Pilger I, 147 \*- pubispicula Pilger I, 148 - quitensis Hack. var. \*patentissima Hack. VI, 161 \*- ramosissima Pilger I, 149

\*- simplicissima Pilger I, 145

\*- Weberbaueri Pilger I, 146

\*- straminea Pilger I, 147 \*- tarmensis Pilger I, 151

Thell. V, 368

Cienfuegosia argentina Gürke var. \* Hassleriana (Hochr.) Hassl. VII, 381 - - f.  $\beta$  \*escholtzioides (Hochr.) Hassl VII, 381 - - f.  $\alpha$  \*genuina Hassl, VII, 381 (- escholtzioides Hochr.) VII, 381 (- Hasslerana Hochr.) VII, 381 - heterophylla Garcke ssp. \*subternata Hassl. VII, 380 sulphurea Garcke var. α \*genuina Hochr. VII, 379 - - var.  $\beta$  vera Hassl. VII, 379 \*Cimicifuga Taquetii Lévl. IX, 448 (Cineraria amelloides L.) VI, 369 (– integrifolia Richardson) X, 512 \*Cinnamomum Bodinieri Lévl. X, 369 \*— Cavaleriei Lèvl. X, 370 \*- Taquetii Lévl. X, 370 Cinnamosma fragrans var. α Baillonii Courch. VII, 186 – var. β Perrieri Courch. VII, 186 \*Circaea coreana Lévl. IV, 226 \*- - var. sinensis Lévl. IV, 226 \*- Delavayi Lévi. VIII, 138 - lutetiana L. var. \*Taqueti Lévl. VII, 340 \*Cirrhopetalum boninense Schltr. II, 171 \*- brevibrachiatum Schltr. X, 186 breviscapum Rolfe III, 188 \*— chryseum Krzl. VIII, 97 - Cogniauxianum Kränzl. I, 86 \*- dolichoblepharon Schltr. X, 135 (- fascinator Rolfe) VII, 175 \*- Koordersii Rolfe X, 185 - Le Ratii Schltr. IX, 216 ×Cirsium aggregatum (C. filipendulum × palustre) Mer. VIII, 65 ×- argentoides (C. argenteum × palustre) Porta VIII, 485 \*x Beckii (C. oleraceum x pannonicum) Petr. V, 330 \*- Bornmülleri Sint. VIII 261  $\times$  brachiatum (C. montanum  $\times$  palustre) Porta VIII, 484 ×- brixiense (C. carniolicum × montanum) Porta VIII, 483 \*- campylolepis Bornm. VIII, 261 — — var. subaraneosum Bornm. VIII, (Cicendia exaltata Griseb.) VIII, 14 261 (Cicer songaricum DC. var. impari-(- caput Medusae Petr.) IX, 166 pinnatum Rgl. et Herd.) X, 415 ×- concilil (C. palustre × montanum) (- var. pamiricum Lipsky) X, 415 Porta VIII, 484 (Cichorium divaricatum Schousb.) V, 368 ×- dissimile (oleraceum × palustre) (- Intybus  $\beta$  divaricatum DC.) V, 368 Porta VIII, 303 \*x— ebergassingense (C. rivulare x subsp. pumilum (Jacq. pro spec.) palustre) Petr. V, 331 (- - var. pumilum Fiori u. Paol.) V, Echinus (M. a B.) Hdl.-Maz. X,

400

(Cicuta nipponica Franch.) VIII, 108

Mak. VIII, 108

virosa L. var. nipponica (Franch.)

×Cirsium elatum (C pannonicum × oleraceum Schur?) Porta VIII, 485

(- erythrolepis Freyn) IX, 166 - ferox DC. var. Costae Sen. et Pau VIII, 213

(- filipendulum Engelm.) IX, 177

\*- Greenei Petr. IX, 177

heterophyllum All, f. ramosum
 Pamp. VII, 235

-  $\times$  spinosissimum Naeg.  $\beta$  Bernardense Vacc. VIII, 364

\*×- hranicense (C. rivulare × canum)
Petr: V, 332

X— Juratzkae var. pinnatifidum (C. heterophyllum var. incisum DC. X pauciflorum) Fritsch VI, 389

- korsakoviense Lévl. et Vant. VII,

102, VIII, 168

ligulare Boiss. var. bosniacum
 Vandas IX, 527

\*- Lipskyi Petr. IX, 197

- Malmyanum Koidz. IX, 137

- palustre Scop. var. macrocephalum Mer. VIII, 65

\*×- praticolum (C. rivulare × palustre)

Petr. V, 331

\*- pyramidale Bornm. VIII, 260

×- rigidum (C. palustre × Helenoides) Porta VIII, 484

- rivulare Link f. glabratum Rohl. 1, 26

- - var. \*ramosissimum Petr. V, 333 \*- roseum (C. rivulare × pannonicum) Petr. V, 332

(- scleranthum M. B.) X, 400

× - scolopendron (C. Helenoides × acaule) Porta VIII, 483

\*×— simillimum (C. canum × oleraceum)
Petr. V, 330

×- solanum (C. Erisithales × acaule) Porta VIII, 483

\*- Sommieri Petr. IX, 166

 spinosissimum Scop. f. intermedium Pamp. VII, 235

×- stiriacum (C. pauciflorum × rivulare) Fritsch VI, 339

X – Stroblii (C. pauciflorum × spinosissimum) Hay. V, 190

\*×- tenerrimum (C. palustre × pannonicum) Petr. V, 332

\*X— trigeneum (C. pannonicum × rivulare × palustre) Petr. V, 331

×— variabile (C. palustre × Erisithales) Porta VIII, 484

(- virginianum var. δ Torr. et Gr.)

(- Wankelii Reichr?) VIII, 484

\*X— Wettsteinii (C. tataricum X palustre)
Petr. V, 329

Cissampelos Wildemaniana v. d. Bossche III, 161

Cissus Bryophyllum Mattei IX, 346

Cistus Berthelotianus Spach var. 3 pilosus Pit. IX, 208

(— ciliatus Desf.) IX, 350

panormitanus Loj. Poj. V, 23
racemosus L.) IX, 350
Sweetianus Loj. Poj V, 28

Citharexylum bahamense Millsp. V, 183

- candatum L. IX, 366

panciflorum Brdg. III, 377
Rugendasii Cham. IX, 367

- - var \*Endlichii Loes. IX, 367

\*- Urbani Schulz V, 193

\*Cladrastis Fauriei Lévl. VII, 230 Claoxylon indicum Hassk. var. novaguineensis J. J. Smith V, 382

(- longifolium K. Sch. u. Laut.) V, 382 - oleraceum Prain X, 427

- purpurascens Beille VIII, 319 (Clarionaea pilifera Don) IV, 143

Clastopus erubescens Haussk.  $\beta$  \*dichrous Bornm. III, 115

 $--\gamma^*$ porphyranthus Bornm. III, 115

- - δ \*stenophyllus Bornm. III, 115

-  $\alpha$  \*xanthinus Bornm. III, 115 - vestitus [Desv.] Boiss. III, 114

Claucena lansium (Lour.) Skeels VIII, 489

( – Wampi Oliver) VIII, 489 \*Clausena Esquirolii Lévl. IX, 324 Clavija Weberbaueri Mey. III, 104

(Claytonia exigua Torr. u. Gr.) VI, 169

— Howellii (S. Wats.) Piper VI, 169

— spathulata var. exigua (Torr. u.

Gr.) Piper VI, 169
\*Cleidion lutescens Pax et Lingelsh.
III, 25

\*Cleisostoma chrysochilum Kränzl. VIII,

\*- Fuerstenbergianum Mer. VII, 366

(- Koordersii Rolfe) X, 201
- Kossmatii Vierh. VII, 161
- spathulatum Bl. IX, 110

Clematis bahamica N. L. Britt. VI, 244

— Biondiana Pav. IX, 317

\*— Cavaleriei Lèvl. et Porter IX, 20 — cirrhosa L. var. Barnadesii Pau III, 330

(— dioica var. virginiana 2. bahamica Kuntze) VI, 244

\*— dioscoreifolia Lévl. et Vant. VII,

\*— Duclouxii Lévl. VII, 97

\*— Mairei Lévl. VII, 337 \*— Perrieri Lévl. VII, 99

– var. \*parvifolia Lévl. VII, 100
– quinquefoliolata Hutch. VI, 317

- rhodocarpa Rose V, 192

- rufa Rose V, 192

- Vanioti Lévl. et Porter IX, 20 Clematoclethra disticha Hemsl. V, 262

- Francheti Kom. VIII, 416

70 Clematoclethra grandis Hemsl. V, 262 Prattii Kom, VIII, 416 \*- racemosa Lévl. X, 440 tiliacea Kom VIII, 416
Wilsoni Hemsl V, 262 Cleome amblyocarpa Barr. u. Murb. V, 201 Cleonia Iusitanica L.  $\beta$  aristata Cout. VIII, 461 — α vulgaris Cout. VIII, 461 \*Clermontia Fauriei Lévl. X, 156 \*Clerodendron Bodinieri Lévl. IX, 325 \*- Cavaleriei Lévl. X, 439 Fargesii Dode VII, 144
longituba Th. Val. V, 390 - pilosum Pears. IV, 27 - reflexum Pears, IV, 27 ugandense Prain VIII, 334 Clethra alnifolia L. f. rosea Rehder VII, 361 \*— Bodinieri Lévl. X, 475 \*— Cavaleriei Lévl. X, 476 \*- Esquirolii Lévl. X, 475 \*— Kaipoensis Lévl. X, 475 \*— pinfaensis Lévl. X, 476 Clinogyne arcta Stapf V, 355 (Clinopodium vulgare L.) III, 284 - - f. glabratum Vandas IX, 534 — — var. parviflorum Rohl. I, 27 Clitoria albiflora Mattei IX, 251 - densiflora Benth. var. \*mucronata Hassl. VIII, 128 - nana Bentli. var. caaguazuensis Hassl. VIII, 128 \*— nervosa Herzog VII. 56 Cluytia Rustii Knauf I, 58 (Clytostoma decorum [Sp. Moore] Bur. et K. Sch.) IX, 49 (Cnestis erecta Fl. Filipp.) X, 247 (- glabra Blanco) X, 247 (- monadelpha Roxb.) X, 247 (— trifolia Blanco) X, 247 (— volubilis Blanco) X, 247 (Cnicus altissimus Willd. var. filipendulus Gr. IX, 177 (— Griffithii Hook. fil. IX, 197 \*— hawaiensis Lévl. X. 122 \*- Korsakoviensis Lévl. et Vant. VIII, 168 \*- Nakaianus Lévl. et Vant. VIII, 168 \*- Rhinoceros Lévi. et Vant. VIII, 169 \*-- Taquetii Lévl. et Vant. VIII, 168 \*- uninervius Lévl. et Vant. VIII, 168 Cnidium apioides Spr. f. arcuatum Vandas IX, 527 Coccoloba Lehmanni Lindau I, 156 sublobata Heimerl VI, 86 Coccolobis bahamensis N. L. Britt, VI,

\*Coccothrinax anomala Becc. VI, 95

\*- scoparia Becc. VI, 95 (Cochlearia Draba Delile) V, 88

Cochlearia excelsa K. Fritsch VI, 340 (- foetida Schk.) VIII, 370 (- saxafilis  $\beta$  auriculata Koch) V, 32 - - f. subauriculata Fiori V, 32 Cochlospermum Wentii Pulle III, 288 Codonanthe florida Pamp. VIII, 350 Codonopsis cardiophylla (Diels) Kom. VIII, 418 cordifolia Kom. VIII, 417 - subscaposa Kom. VIII. 418 - tubulosa Kom. VIII, 418 vinciflora Kom. XIII, 417 \*Coelodiscus Lauterbachianus Pax et K. Hoffm. VIII, 481

\*- trinervius (K. Schum. et Lauterb.) Pax VIII, 481 \*Coelogyné caloglossa Schltr. X, 16 \*- chlorophaea Schltr. X, 17 - Lawrenceana Rolfe IV, 123 - lycastoides F. v. M. et Krzl. IX, 92 \*- multiflora Schltr. X, 18 - perakensis Rolfe VII, 176 rhizomatosa J. J. Sm. X, 16 \*- Riedleyana Schitr. VIII, 561 Sarasinorum Krzl. X, 16 (- sulphurea Hook. f.) VII, 176 - yunnanensis Rolfe) IV, 169 Coeloglossum viride L. b. roseum Bolz. IX, 187 Coffea Alleizetti Dub. X, 222 - excelsa Chev. II, 120 Maclaudi Chev. II, 120 madagascariensis (Drake mss.) Dub. X, 223 Cola nalaensis form, variifolia Wild. X, 428 ×Colchicum autunonale L. f. \*giganteum Dom. I, 16 - Rhenium Heldr. IV, 302 - timidum Heldr. IV, 302 Coleosanthus Garrettii Nels. V, 219 Coleostephus Myconis Cass. var. pallens Mer. VIII, 64 Coleus formosanus Hayata VI, 198

— Pentheri Gürcke III, 256, VI, 368 (Collaea argentina Gris.) VIII, 126 (- virgata Benth.) VIII, 127 (Collinsia parviflora Dougl.) VIII, 267 - pauciflora Lindl.) VIII, 267 Collinsonia tenella (Pursh) Piper VIII, (?Collomia gracilis var. humilior Hook.) VIII, 15 - grandiflora var. diffusa (Mulford) Piper VIII, 15 - linearis Nutt. var. picta Lun. VIII,

tenuis Rose V, 107
Colubrina Alamani DC. VIII, 299
glomerata (Benth.) Hemsl. VIII, 299

\*Colobanthus bolivianus Pax VII, 109 Cologania Lozani Rose V, 107

Colubrina megacarpa Rose VIII, 299 Columbia subovata Hochr. VII, 14 (Colutea spinosa Forsk.) VIII, 302 (Coluteocarpus reticulatus Boiss.) VI, 128

- Vesicaria (L.) J. Holmb. VI, 128 Combretum anfractuosum Mart. var. \*macrostachyum Hassl. VIII, 45

- mellifluum Eichl. var. \*cuspidatum

Hassl. VIII, 45

- Thonneri De Wild X, 524 Commelina Cavaleriei Lévl. IV, 115

\*- coreana Lévl. VIII, 284 \*- martyrum Lévl. V, 284

Commiphora benadirensis Matt. IX, 320 \*Comparettia peruviana Schltr. X, 389 \*Compsoneura costaricensis Warb. 1, 71 (Conanthus? carnosus Woot.) X, 281 \*Conchophyllum celebicum Schltr. III, 346

Condalia lycioides (Gray) Weberb. var. \*microphylla Loes. VIII, 296

- obovata Hook, var \*angustifolia Loes, VIII, 297

- obtusifolia Weberb. VIII, 296

- Seleri Loes, IX. 355 – spathulata Gr. VIII, 297

Connarus microphyllus Hook. et Arn. X, 247

(- monocarpus F.-Vill.) X, 247

(- obliquus Bl.) X, 247 (- paniculatus F-Vill.) X, 247

\*Conomorpha pyramidata Mez III, 102 \*- Weberbaueri Mez III, 101

(Conopodium denudatum Koch) VIII,

- Marizianum Samp. IV, 384

Conostylis aculeata R. Br. var. bromelioides (Endl.) A. J. Ewart VIII, 404 aurea var. longiscapa A. J. Ewart VIII, 404

(- bromelioides Endl.) VIII, 404 (Convallaria bifolia var. kamtschatica (Gmel.) Cham. et Schlecht.) VI, 78

\*- globosa Greene V, 46

\*— majuscula Greene V, 46 (Convolvulus acuminatus Vahl) VIII,

 arvensis L. var. trichoacanthos Finl. VII, 190

(- betonicifolius Miller) V, 365

- capsularis L. var. pyrifolia Burk. et Finl. VII, 190

– – f. typica Burk, et Finl. VII, 190 – erodioïdes Balfour fil. var. α pinnatus Vierh, VII, 160

— — var.  $\beta$  bicrenatus Vierh. VII, 160

 guadeloupensis Steud.) VIII, 230
 Hermanniae L'Hérit. var. albidovillosus (Chod. et Hassl) Hassl IX,195 (- hirsutus M. B.) V, 365

- Mairei Hal. VI, 4

(Convolvulus mollis Meissn, var. albidovillosus Chod. et Hassl.) IX, 195

 var. \*Hasslerianus (Chod.) Hassl. IX, 195

— — f. \*amplexicaulis Hassl, IX,195

(— phillomega Vell.) VIII, 230 \*- Phrygius Bornm. V, 168

(- pilosus Wikstr.) VIII, 280 - pubescens (Lindl.) Thell. V, 365

Trabutianus Schweinf. et Muschler IX, 566

\*Conyza Blinii Lévl. VIII, 452 (- macrorhiza Schultz) IX, 414 (- Schultzii Hochst.) IX, 414

 stricta Willd, var. macrorhiza (Schultz) Matt. IX, 414

(Cookia punctata Sonnerat) VIII, 489 \*Copaiba paupera Herzog VII, 54

\*Coprosma Fauriei Lévl. X, 153 \*- parvifolia Lévl. X, 153

\*- Saviiensis Rech. VI, 326 Coptis Teeta Wall. var. chinensis

Franch. subv. \*rhizomatosa Lévl. VII, 258

Coptosapelta Hammii Val. VIII, 399, IX, 310

- subg. II. Lindeniopsis Val. VIII, 398 (Corallioky phoscandidissimum Fleischm. et Rech.) IX, 86

Corchorus Baldaccii Matt. IX, 347

- capsularis L. var. crylifolia Burk. et Finl. VII, 190

\*— Cavaleriei Lévl. X, 437 \*- onotheroides Lévl. X, 437 \*- Polygonatum Lévl. X, 437

\*Cordia expansa Lingelsh. VII, 244 Corispermum imbricatum A. Nels. 1X. 482

- simplicissimum J. Lun. IX, 400 (Cornucopiae altissima Walt.) V, 359 Cornus alternifolia L. f. ochrocarpa

Rehder VII, 360 \*- aspera Wang. VI, 97

\* - chinensis Wang. VI, 100 \*— cilicica Wang. VI, 98 \*— coreana Wang. VI, 99

(— disciflora Moc. et Sessé) VI, 102 (— disciflora Rose) VI, 102 \*— Fauriei Lévi. VIII, 281

\*- floccosa Wang. VI, 101 (- grandis Cham. et Schlecht. VI, 102 - Hemsleyi C. K. Schn. et Wang.

VII, 229

\*- Koehneana Wang. VI, 99 \*- Koenigi C. K. Schn. VII, 229

(- macrophylla Wall. var. aspera Max.) VI, 98

\*— poliophylla C. K. Schn. et Wang. VIÌ, 228

\*- Schindleri Wang. IV, 337

\*- ulotricha C. K. Schn. et Wang. VII, 228

\*Cornus Walteri Wang. VI, 99 \*— Wilsoniana Wang. VI, 97

Coronilla vaginalis Lam, var. aurantiaca Rohl. I, 35

Corrigiola littoralis L. var. purpurascens

Gir. VIII, 33

\*Cortaderia longicauda Hack. X, 169 \*Corydalis Allenii Fedde X, 478

- aurea Willd. var. \*robusta Fedde X, 379

\*- bilimbata Fedde X, 379 \*— brachycarpa Fedde X, 315

×— campylochila (C. intermedia [L.] Gaud. × C. solida [L.] Sw.) Teyber IX, 332

— Cavaleriei Lévl. et Vant. VI, 374

\*— Chanetii Lévl. X, 348

\*- chihuahuana Fedde. X, 418

\*- Clematis Lévl. VII, 231 \*- cofouensis Lévl. VI, 266

\*- crassipedicellata Fedde X, 364

- crystallina var. \*strictissima Fedde X, 479

\* - curvisiliqua Engelm. var. \*tenerior Fedde X, 365

\*- Engelmannii Fedde X, 365

\*- Esquirolii Lévl. X, 349 \*- Geyeri Fedde X, 311

\*- Gooddingii Fedde X, 313 \*— Hallaisanensis Lévl. X, 349

\*- hastata Fedde X, 315

× - Hausmanni (C. densiflora Presl × intermedia [L] P. M E.) v. Klebelsbg. XI, 29

\* – heterodonta Lévl. VI, 266 \* - hypecoiformis Fedde X, 314

(— lachenaliaeflora Fisch) IX, 238 \*- macrorrhiza Fedde X, 479

 micrantha var. \*diffusa Fedde X, 380

– var.\*pachysiliquosa Fedde X,380

\* - Mildbraedii Fedde VIII, 512 \*-- monilifera Fedde X, 417

- ochroleuca K. var. longebracteosa Rohl. I, 22

\*- Onobrychis Fedde X, 565 \*- petroselinifolia Lévl. X, 349 \* - Redowskii Fedde X, 508

\*- - var. Tilingii Fedde X, 509

(- tenuifolia Pursh) IX, 238 \*- tortisiliqua Fedde X, 313

\*- washingtoniana Fedde X, 419 \*— wyomingensis Fedde X, 312

Corylopsis glandulifera Hemsl. V, 266

— Henryi Hemsl. V, 267

( — himalayana var. manipurensis Watt)

- manipurensis Hemsl. V, 267

- multiflora Hance V, 267 sinensis Hemsl. IV, 363

(— spicata Hemsl.) IV, 363; V, 266

Wilsoni Hemsl. V, 266

\*Corymbis exaltata Schltr. X, 15 \*- subdensa Schltr. II, 168

veratrifolia Bl. IX, 92

(Corynanthe macroceras K. Sch.) V, 309

(- Yohimba K. Sch) V, 309

Corysanthes Betchei F. v. M. IX, 84

— carinata Smith V, 291

\*— moluccana Schltr. III, 16 \*— muscicola Schltr. X, 3

(Cotoneaster acutifolia Turcz.) III, 220

- adpressa D. Bois III, 226

- affinis Ldl. var. bacillaris (Wall.)

C. K. Schn. III, 221

— Aitchisoni C. K. Schn. III, 220 (— angustifolia Franchet) III, 222

\*— Baenitzii Pax V, 226 — Dammeri C. K. Schn. III, 222

var. radicans Dammer III, 222
var. typica C. K. Schn. III, 222
disticha Lge. var. Duthieana C. K.

Schn. III, 218

- ? var. tongolensis C. K. Schn. III. 218

(— Fortunei Wenzig) III, 223 - Francheti D. Bois III, 228

- horizontalis Decne. var adpressa (Bois) C. K. Schn. III, 219

— var. perpusilla C. K. Schn. III, 219 — var. typica Decne. III, 219

- integerrima Med. var. depressa (Fries) C. K. Schn. III, 219

 var. intermedia (Rgl.) C. K. Schn. III, 220

- - var. leucocarpa (Roem.) C. K. Schn. III, 219

— — var. typica C. K. Schn. III, 219 - — var. uniflora (Rgl) C. K. Schn.

III, 220 (- Lindleyi Steud,) III, 221

- melanocarpa Lodd, var. commixta C. K. Schn. III, 221

— — var. laxiflora (Jacq.) C. K. Schn. III, 221

— — var. typica (Zbl.) C. K. Schn. III, 221

(- moupinensis Franch.) III, 219

(- mucronata Franch.) III, 221 (- nervosa Decne) III, 183

racemiflora (Desf.) K. Koch var.
acutifolia (Bornm.) C. K. Schn. III, 221
var. Kotschyi C. K. Schn. III, 221

- var. nummularia Dipp. III, 221

— — var. songorica (Rgl.) C. K. Schn. III, 221

— var. typica C K. Schn. III, 221 (— rosea Edgew.) III, 219

rotundifolia Wall. var. lanata (Dipp.)

C. K. Schn. III, 222 — var. uva-ursi (Ldl.) C. K. Schn. III, 222

- rugosa Pritzel III, 221

— — var. Henryana C. K. Schn. III, 221

(Cotoneaster rugosa var. Pritzelii C. K. Schn.) III, 221

(- salicifolia Franch.) III, 221 -- var. \*Pritzeli C. K. Schn. III, 221 vulgaris Lindl. b.) macrophylla Vacc. VIII, 330

— — a.) microphylla Vacc. VIII, 330

- Zabeli C. K. Schn. III, 220

Cotula peduncularis (DC.) Macl. IV, 139 Cotyledon Bolusii Schönl. var. karrooensis Schönl. II, 181

? ×— devensis (glauca × gibbiflora?) N. E. Br. IV, 168

- glutinosa Schönl. II, 180 - insignis N. E. Br. III, 189 - praealtus Samp. VIII, 371

\*Couepia paraguariensis Hassl. VII, 375 Courbonia nummularifolia Matt. 1X, 319 (Coursetia dubia DC.) II, 13

\* Harmsii Ulbr. II. 12

\*Cousinia mindshelkensis B. Fedtsch.

Couthovia Kochii Th. Val. V, 389 (Cracca bicolor Mich.) V, 106

(- Edwardsii A. Gr.) V, 106 (- Greenmanii Millsp.) V, 106 (- micrantha Mich.) V, 106 Crambe hispanica L) V, 364

\*Craniches guatemalensis Schltr. II, 129

\* – Hassleri Cogn. VII, 69 \*- nigrescens Schltr. X, 482 \*— subcordata Schltr. II, 130

Crassula brachypetala E. Mey. parvisepala Schönl. II, 179

(- cespitosa Cav.) X, 290

- clavifolia E. Mey. var. marginata Schönl. II, 179

- Dielsii Schönl. II, 179 - Kuhnii Schönl. II, 178 (- Magnolii DC.) X, 290

- namaguensis Schönl. et Bak. var. lutea Schönl. II, 179

- remota Schönl. II, 180 (?- verticillaris L) X, 290

× Crataegomespilus Asnieresi (Koehne) C. K. Schn. III, 223

Crataegus altaica Lge. III, 224 (— altaica var. incisa [Rgl.] C. K. Schn.)

III, 224

 ambigua C. A. Mey. var. Hohenackeri C. K. Schn. III, 225

\*— Bretschneideri C. K. Sch. III, 223 \*— Chancha Lévl. X, 377

chlorocarpa K. III, 224
coreanus Lévi. VII, 197

cuneato-trifida Loj. Poj. V, 29

- dahurica Koehne III, 224 Fischeri C. K. Schn. III, 225 (- florentina Zucc.) III, 178

Fortunei (Wenz.) C. K. Schn. III, 293

 gaylussacia Heller IV, 62 jozana C. K. Schn. III, 224 (Crataegus Korolkowi Henry) III, 224

(- Korolkowi Regel III, 223

 Maximowiczi C. K. Schn. III, 223 - microphylla var. dolichocarpa (Somm. et Lev.) Hell.-Maz. X, 307

(— monogynavar. delichocarpa Somm.

et Lev.) X, 307

(-- var. hirsutior Hal.) III, 224 – "race" Royeri Lambert VII, 185

 orientalis Pall. var. Tournefortiana (Griseb.) C. K. Schn. III, 225

( - orthosepala Hausskn. et Bornm.) X, 307

- panachaica C. K. Schn. III, 224

— parvifolia Loj. Poj. V, 29 pinnatifida Bge. var. garanica O Pauls, IV, 46

- -- var. geholensis C. K. Schn. III, 223

(— — var. major Brown) III, 223 - sanguinea Pall. var. chlorocarpa (Koch) C. K. Schn. III, 224

(-- var. incisa Regel) III, 224

\*- Taquetii Lévl. X, 377

(- trilobata Labil.) III, 179 - Wattiana Hemsl. et Lace III, 224 - - var. \*incisa (Regl.) C. K. Schn.

III, 224

\*Crataeva coriacea Herzog VII, 52 \*Cratylia nutans Herzog VII, 56

Crawfurdia Bulleyana G. Forr. VIII, 155 — Trailliana G. Forr. VIII, 155

Crepis aurea (L.) Cass. var. bosniaca Maly VI, 293

(- Columnae (Ten.) Fröl. subsp. Columnae (Ten.) Maly) VI, 294

— grandiflora Tausch var. montene-

grina Rohl. 26

\*— molokaiensis Lévl. X, 122

— neglecta L f. exaltata Rohl. I, 27 — nigrescens Pohle II, 137

- rigida W. K. var. adenophylla Rohl. I, 37

- var. viscosissima Rohl. I, 37 (X- Vandasii Rohl. = C. moesiaca Degen et Bald.) 1, 37

- Velenovskyi Dom 1, 129

Crinum amoenum Roxb. var. Mearsii R. H. Bedd. VI, 356

-- Esquiroli Lévl. III, 369 – Vassei Bois V, 318

\*Crocus Moabiticus Bornm. et Dinsm.

(Crotalaria Abdal-Kuriensis Vierh.) VII, 158

- Kuriensis Vierh. VII, 158

 Mitchelli Benth. var. tomentosa A. J. Ewart VIII, 404

- Schweinfurthii Vierh. VII, 158

(- stipularia Desv.) II, I Tropeae Matt. IX, 320

\*Crotalaria Winkleri Bak. fil. X, 125 Croton arenicola Small III. 269 \*— Hutchinsoniana Hoss. X, 64 (- setigerus Hook.) VIII, 11 Crotonogyne Thonneri De Wild. X, 427 \*Crucianella Bucharica Fedtsch. X, 464 Cruckshankia patagonica Macl. IV, 139 Crupina vulgaris Cass. var. \*pseudo-Crupinastrum Thell. V, 162 Cryptandra amara Sm var. floribunda Maiden et Betche V, 54 apetala Ewart and White IV, 134 \*— uncinata (F. v. Muell.) Grüning X, 384 \*Cryptangium parvulum C. B. Cl. II, 145 Cryptanthe densiflora A. Nels. et P. B. Kennedy IV, 285 -- Hillmanii A. Nels. et P. B. Kennedy IV. 285 - nevadensis A. Nels. et P. B. Kennedy IV, 285 Suksdorffii (Greenm.) Piper VIII, 267 \*Cryptarrhenia guatemalensis Schltr. X, 253 Cryptocarpa foetida R. T. Baker V, 188 - hypoleuca Mez VIII, 255 (- peumus Nees) VIII, 488 - rubra (Mol.) Skeels VIII, 488 \*Cryptocentrum costaricense Schltr. X, 389 \*- minus Schltr. X, 385, 389 Cryptolepis albicans Jum. et P. de la Bath. IX, 296 (Cryptoleura californica Nutt.) VIII, 269 Cryptophoranthus Schenkii Cogn. VI, 55 Cryptostylis alismifolia F. v. M. IX, 85 \*- vitiensis Schltr. III, 16 Cucubalus baccifer L. f. villosula Vandas IX, 525 integrifolia Cucurbita Cogn. \*glabrior Cogn. VII, 72 Culcitium Panizzae E. Duse I, 175 Cunila lythrifolia Benth. VIII, 311 Cunninghamia Konishii Hayata VIII, 366 \*Cuphea Crudyana Koehne VIII, 16 \*- Fiebrigi Koehne VIII, 166 \*- grata Koehne VIII, 165 \*- hexasperma Koehne VIII, 165 lysimachioides Cham. et Schlechtd. var. \*dubia Koehne VIII, 197 - – var. \*villosa Koehne VIII, 196 \*- Rojasi Koehne VIII, 198 \*- talaverensis Koehne VIII, 197 Cuscuta Anthemi A. Nels. IX, 484 (— californica var. squamigera Engelm.) VII, 15 -- Kuriensis Vierh. VII, 161 (- planifolia var. globulosa Balf. fil.)

VII, 161

VIII, 15

(- salina Engelm.) VIII, 15

squamigera (Engelm.) Piper VIII, 15

(— subinclusa var. abbreviata Engelm.)

\*Cusparia Ulei Krause II, 26. (Cussonia Bojeri Seem.) VI. 46 ( — Gerrardii Seem.) VÍ, 46 \*Cyanea Blinii Lévl. X, 156 \*— Fauriei Lévl. X, 156 \*— Feddei Lévl. X, 156 \* – multispicata Lévl. X, 157 Cyanotis Bodinieri Lévl. et Vant. IV, 114 - Cavaleriei Lévl. et Vant. IV, 114 - Kawakamii Hayata VI, 199 Labordei Lévl. et Vant. IV, 114 \*Cyathea Bonapartii Rosenst. VII, 289 \*- Foersteri Rosenst. X, 321 \*— geluensis Rosenst. V, 371 \*— Kingii Rosenst. IX, 422 \*— Rojasii Christ VI, 348 \*— Werneri Rosenst. V, 34 Cyathodes imbricata Stch. var. \*volcanica Lévl. X, 155 \*Cybianthus lanceolatus Pax VII, 112 \*- minutiflorus Mez III, 102 Cycas Micholitzii This - Dyer IV, 171 Cyclamen aegineticum Hildebr. VI, 201 creticum Hildebr. III, 126 - europaeum L. var. \*parvifolium Gave X, 476 Jovis Hildebr. VI, 201 - maritimum Hildebr. VI, 200 mirabile Hildebr. III, 126 - pseudo-maritimum Hildebr. VI, 200 (Cyclanthera Oerstedii DC.) VIII, 536 (- Pittieri [Cogn.] Pitt.) VIII, 537  $(-- \text{ var. } \beta \text{ quinqueloba Cogn.}) \text{ VIII,}$ 538 \*Cyclopeltis novoguineensis Rosenst. X, 329 \*Cyclophorus Bamlerii Rosenst X, 339 \*- Winkleri Rosenst. VII, 149 \*Cycnoches albidum Krzl. VII, 38 Cylista Somalorum Vierh. VII, 159 Cymbidium erythrostylum R. A. Rolfe IV. 177 — Finlaysonianum Ldl. X, 190 (- hyacinthinum Sm.) X, 255 - pubescens Ldl. var. \*celebicum Schltr. X, 190 \*- pulchellum Schltr. VIII, 570 - Schroederi Rolfe IV, 124 sigmoideum J. J. Sm. V, 298striatum Sw.) X, 255 Cynanchum arenarium Jum. et P. de la Bath. IX, 297 \*- celebicum Schltr. III, 305 – erythranthum Jum. et P. de la Bath. IX, 298 \*- liukiuense Warb. III, 305 - reflexum (Hemsl.) Pitt. VIII, 477 \*- sumbawanum Warb. III, 306 — Vincetoxicum (L.) Pers. var. bosniacum Maly VI, 293 \*— Warburgii Schltr. III, 306 Cynodon convergens F. Muell. X, 119 Cynodon Dactylon (L.) Pers. var. maritimum (H. B. K.) Hack. VI, 207

tenellus R. Br. X, 119

Gundelsh. (Cynoglossum armenum Herb.) IX, 541

(- laevigatum Auch.) IX, 541

(- Ianatum Lam) IX, 541 (Cynosorchis gracilis Krzl.) VIII, 107 Cyperus badius Desf. b. lucanus Terracc. V, 140

- var. Preslii (Parl.) Husn. VII, 209 - - var tenuislorus (Rottl.) Husn

VII, 209

- cayennensis (Lam) Britton VIII, 93

(- comosus Sibth. et Sm.) VII, 210 - cyperoides (L.) Britton VIII, 93

(- Eragrostis Vahl) X, 401 (- flavomariscus Griseb.) VIII, 94 - fuscus L. var. pallescens (Perret)

Husn. VII, 210

- - b. serotinus Bolz. IX, 187 - - var. virescens (Holfm.) Husn. VII, 210

(- glaber Hoppe) VII, 210

- glomeratus × glaber Jegorowa II,

granularis (Desf.) Britton V<sub>1</sub> II, 94 longus L var. brevispic ulatus Reyn. VIII, 214

var. longispiculatus Reyn. VIII,

214

- macrocarpus Aresch. X, 301

(- nanus Boeckl.) VIII, 94 (- Preslii Parl.) VII, 209

et Sm.) Husn. VII, 210

(- sabaudus Perret) VII, 210 (- tenuiflorus Rottb.) VII, 209

— thyrsiflorus  $\beta$  macrior Aresch. X, 301

- -  $\alpha$  vegetior Aresch. X, 301 (- virescens Hoffm.) VII, 210 Cyphokentia Samoensis Warb. IV, 231 \*Cyphomandra arborea H. Winkl. VII, 246

\*— artocarpophyllos H. Winkl. VII, 246

- dendroidea Pitt. VIII, 533

\* - Lauterbachii H. Winkl. VII, 247 - Naranjilla Pitt. VIII, 534

 sciadostylis Sendt var. \*trichocarpa Hassl. IX, 119

\*- verruculosa Hassl. IX, 118

(Cyphomattia euryptera Hsskn.) IX, 541

- lanata Lipsky) IX, 542 - lanata Boiss. IX, 541

(— – β brachyantha Boiss.) IX, 541

\*Cyrtandra asaroides Lévl. X, 124 \*- Fauriei Lévl. X, 123

\*- Hillii Lévl. X, 145

\* Kamoloensis Lévl. X, 123

\*- longepedunculata Rech. V, 131

\*Cyrtandra oahuensis Lévl. X, 124

\*— Vanioti Lévl. X, 155 \*- Wainihaensis Lévl. X, 123

Cyrtanthus inaequalis J. O'Br. IV, 125 (Cyrtolepis Alexandrina DC. var. Coss.) IX. 467

galeandroides Cogn. \*Cyrtopodium VII, 70

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. var. cristata L. S. Hopk. VIII, 491

\*Cystopus aneytyumensis Schltr. IX, 282 - fimbriatus J. J. Sm. V, 377

\*- Funkii Schltr. IX, 89

\*Cystorchis celebica Schltr. X, 10 \*— macrophysa Schltr IX, 429 (- nebularum Hance) VI, 42

Cytisus albus Hasq. var. Obornyanus

A. Wildt X, 366

- hirsutus L. & supinus (L. p. p.) d. major Bolz. VIII, 254

Kovacevi Velen I, 133.

pallidus Schrad. var. subnudus Velen. I, 133

 proliferus L. var. δ Hierrensis Pit. IX, 274

 rosmarinifolius L. var. α argentea Pit. IX, 210

var. β microphylla Pit. IX, 210

- stenopetalus W. B. var. γ Gomerae Pit. IX, 274

– var. β microphylla Pit. IX, 274

– var. α Palmensis Pit. IX, 210

– var. δ sericea Pit. IX, 274

Daboecia cantabrica (O. Ktze.) Rendle et Britten VIII, 437

Dactylis glomerata L. var ciliata Peterm. lus. longipedunculata Zobel IV, 301 Dactyloctenium glaucophyllum Courb.

var. villosum Mattei IX, 318 (Daedalacanthus parvus C. B. Cl.)

VIII, 334 - Wattii Bedd.) VIII, 334

Daemonorops Schmidtianus Becc. X, 368 Dahlia Chisholmi Rose V, 255

Dahlstedtia Malme n. gen. I, 122 pinnata (Benth.) Malme I, 122 Dalbergia boinensis Juni. II, 119

- ikopensis Jum. X, 64

- Perrieri Jum. II, 119 X, 64 - sambesiaca Schinz VI, 165

(Dalea argyrostachys Hook & Arn.) VI, 252

(- Berlandieri A. Gr.) VI, 252

\*- calliantha Ulbrich II, 11 \*— calocalyx Ulbr. II, 10

(- canescens Mart. & Gal.) VI, 250

— citriodora Willd.) VI, 249

(- Cliffordiana Willd.) VI, 250

(Dalea cyanea Greene) VI, 251 (- eriophylla S. Wats.) VI, 252 (- Eysenhardtioides Hemsl.) VI, 250 (- glaberrima S. Wats.) VI, 249 (- gracilis Kunth.) VI, 251 - Hofstenii R. E. Fr.) IV, 20 (- inconspicua Schauer) VI, 250 (- insignis Hemsl.) VI, 249 (- laevigata G. Don) VI, 251 (- lasiostachya Bentlı.) VI, 252 (- leucostachys A. Gr.) VI, 250 (- leucostoma Schltr.) VI, 252 \*— longispicata Ulbr. II, 6 (— luisiana S. Wats.) VI, 251 (— microphylla H. B. K.) VI, 252 (- mucronata DC.) VI, 249 - Mutisii Kunth) II, 5 \*- myriadenia Ulbr. II, 9 (— naviculifolia Hemsl.) VI, 250 (— nigra Mart. & Gal.) VI, 251 \*— nova Ulbr. II, 5 (— pectinata Kunth) VI, 249 (— plumosa S. Wats.) VI, 252 (- polyphylla Mart. & Gal.) VI, 249 (- psoralioides Moric.) VI, 250 (- Purpusi Brdg.) VI, 252 - ramosissima Benth., nonMart.) VI,252 ( – revoluta S. Wats.) VI, 251 - samancoënsis Ulbr. II, 8 \* - Seemanni S. Wats.) VI, 252 (- sericea Lag.) VI, 251 \*— sericophylla Ulbr. II, 7 \* - sulfurea Ulbr. II, 5 \*— trichocalyx Ulbr. II, 7 (- trochilina Brdg.) VI, 250 (- tuberculata Lag.) VI, 250 (- vetula Brdg.) VI, 250 \*-- Weberbaueri Ulbr. II, 9 \*Dalechampia Grüningiana Pax VIII, \*Damnacanthus Esquirolii Lévl. X, 435 Danaa verticillata (W. K.) Janchen VIII, 257 Danaea Carillensis Christ VIII, 20 – elliptica J. Sm. var. \*crispula Rosenst. VII, 310 \*-- plicata Christ VIII, 19 (Danthonia americana Scribn.) VI, 74 (— californica Bol.) VI, 74 (- grandiflora Phil.) VI, 74 – Hieronymi (O. K.) Hack. genuina Hack. IV, 343 (- intermedia Vasey) VI, 74 - - var. Cusickii Williams) VI, 74 — spicata var. pinetorum Piper) VI, 73 - thermale Scribn.) VI, 73 - unispicata Thurb.) VI, 74 \*Daphne Feddei Lévl. IX, 326 – laureola L. var. arbuscula Christ VIII, 304 \*- Martini Lévl. X, 369 (- tenera Phil.) IV, 137

\*Daphniphyllum Cavaleriei Lévl. IX, 460 (Dasylirion caespitosum Scheidw.)V, 114 (- Hartwegianum Bot. Mag.) V, 114 (- Hookeri Lem.) V, 115 (- inermis S. Wats.) V, 113 - lucidum Rose V, 114 (- pliabile Bak.) V, 113 Datura alba Nees var. africana Mattei IX, 253 Daucus ammoides Loj. Poj. VI, 38 - biseriatus Murb. V, 207 - carota L. f. contracta Witte II, 121 - crithmifolius Loj. Poj. VI, 37 platycarpas Scop. b foliosus Bolz. VIII, 254 Davallia borneensis J. Sni. X, 324 \*- Novae Guineae Rosenst. V, 36 Davidia laeta L.-A. Dode IX, 571 Daviesia mesophylla A J. Éwart VIII, \*Davilla microcalyx Herzog VII, 62 Davisiea Grahami Ewart and White IX, 65 Decanema grandiflorum Jum. et Perr. de la Bath. IX, 299 Decanemopsis aphylla Cost. et Gall. IV, 378 \*Dejanira chiquitana Herzog VII, 65 – cordifolia Malme I, 124 (- erubescens Cham, et Schldl, var.  $\gamma$  cordifolia Progel) I, 124 Delphinium arcuatum Busch VII, 28 \*- Bonatii Lévl. VII, 99 candidum Hemsl. V, 80 - Chilliwacense Greene V. 397 - consolida L. f. gracillima Busch VIII, 24  $(--\beta)$  micranthum Boiss.) VII, 24 — subsp. paniculatum (Host) Busch ( — dasycarpum  $\beta$  linearilobum Lipski) VII, 27 dasystachyum Boiss. et Bal. f. leiocarpum Busch VII, 25 – subsp. Szovitsianum (Boiss.) Busch VII, 25

— — f. leiosepalum Busch VII, 26 — — f. trichosepalum Busch VII, 26 (- elatum β palmatifidum Alb.) VII, 26 - flexuosum M. B. var. brevipilum Busch VII, 26  $(--\gamma \text{ crispulum Rupr.}) \text{ VII, } 27$ - - var. hirsutum Busch VII, 26 (-- γ Paulowi Akinf.) VII, 26 (- hybridum var. dasyanthum Avé Lallem.) VII, 26 (- - var. hirtulum Trautv.) VII, 25 — subsp. 1 genuinum Boiss. f. tricho-

carpum Busch VII, 24

- - subsp. 3 ochroleucum (Stev.)

— — f. trichocarpum Busch VII, 24

Boiss, f. leiocarpum Busch VII, 24

Delphinium hybridum subsp. 5 laxiusculum Boiss, f. leiocarpum Busch VII, 25

— — f. trichocarpum Busch VII, 25 var. pallidiflorum Busch VII, 25

- - - f. leiocarpum Busch VII, 25 - - f trichocarpum Busch VII, 25 – subsp. 4 puniceum (Pall.) Boiss.

f. leiocarpum Busch VII, 25

- - - f. trichocarpum Busch VII, 25 — — subs. 2 Schmalhausenii (Alb.) Busch VII, 24

— — f. leiocarpum Busch VII, 24 — — f. trichocarpum Busch VII, 24

(— — var. Szovitsianum Trautv.) VII, 26 — linearilobum (Trautv.) Busch VII, 27 - – var. crispulum (Rupr.) Busch VII, 27

-- luteum Heller IV, 62

\* - lycoctonifolium Lévl. VII, 100

 Mariae Busch VII, 27 (- paniculatum Host) VII, 24 (- Schmalhauseni Alb.) VII, 24

- speciosum M. B. var. 3. dasycarpuin (Stev.) Rupr. f. Archysi Busch VII, 26

- - f. latifolium Busch VII, 26 — — f. leiosepalum Busch VII, 26

( - - var. lineariloba Trauty.) VII, 27 – war. 4 Paulovi (Akinf.) Busch VII, 26

(— Śzovitsianum Boiss.) VII, 25 \*— Tenii Lévl. VII, 98

- tomentellum Busch VII, 27

- — var. angustibracteatum Busch VII, 28

- - var. araraticum Busch VII, 28 - var. macranthum Busch VII, 27

- trichophorum Franch. var. \*lasiostylum Lévi. VII, 102

— — f. brevungue Lévl. VII, 102 xantholeucum Piper VI, 170

\*Dendrobium amabile Schltr. VIII. 505. X, 83

\*— amblyogenium Schltr. X, 82 - angustipetalum J. J. Sm. IX, 286

\* - ansusanum Schltr. IX, 285

\*— austro-caledonicum Schltr. III, 80 (— bicaudatum Krzl.) X, 80 - bicostatum J. J. Sm. IX, 286 - biflorum Sw. IX, 101

(- biflorum Krzl.) IX, 102 - Brandtiae Kränzl. V, 6

 Bronckartii De Wild. IV, 370, VIII, 335

(- capitellatum Krzl.) X, 71

\*— chrysotainium Schltr. VIII, 508 X, 75

- concavum J. J. Sm. V, 74 \*- confusum Schltr. X, 72 - Coxii Bail. VIII, 100 \*- cultratum Schltr. X, 71

- cuneilabrum J. J. Sm. X, 76

Dendrobium Dartoisianum De Wild. IV, 370

\*— diaphanum Schltr. VIII, 508; X, 72

(— erosum Krzl.) X, 82 \*- exile Schltr. II, 85

filiforme J. J. Sm. X, 77fililobum F. v. M. IX, 102

\* - Fuerstenbergianum Schltr. III, 277

— furcatum Reinw. X, 83 — gedeanum J. J. Sm. V, 294 (— gemellum Krzl.) IX, 102

(? – gemmiferum Krzl.) X, 76 \*- Gerlandianum Krzl VI, 317 \*— Goldschmidtianum Krzl. VII, 40

\*- heterobulbum Schltr. VIII, 501, X, 78 - heterocarpum Wall. X, 83

(- Hildebrandii Krzl.) X, 83 Hosei Ridl. IX. 286

- hymenopterum Hk f. IX, 286 \*- hypodon Schltr. VIII, 502, X, 71

\*- imitans Schltr. X, 80 – inaeguale Rolfe IX, 286

\*- indragiriense Schltr. IX, 164 insigne Rchb. f. IX, 286 (- involutum Krzl.) IX, 102

(- isochiloides Krzl. var. pumilum J. J. Sm.) X, 251

\*- juncifolium Schltr. X, 76 - kandarianum Krzl. IX, 287

\*— klabatense Schltr. VIII, 505; X, 83

 Koordersii J. J. Sm. X, 81
 (-- lepidochilum Krzl.) IX, 102 \*- lepoense Schltr. IX, 282

\*- lichenastrum Schltr. VIII, 570 - litoreum Bail. VIII, 9

lockhardtioides Schltr. VIII, 507; X, 71

\*- macranthum Schltr. IX, 163 - macrobulbon Krzl. X, 19

- macrophyllum Ach. Rich. X, 79 - macropodum Hk. f. IX, 286

\*- masarangense Schltr. X, 78 - mattangianum Krzl. IX, 286 – mega Krzl. IX, 286

\*- mentosum Schltr. X, 77 (- micranthum Krzl.) X, 73

(— Minahassae Krzl.) X, 83 \*— mirandum Schltr. VIII, 509; X, 75 — Mohlianum Rchb. f. IX, 102 \*- Muellerianum Schltr. III, 316

\*- Nakaharaei Schltr. II, 169; VI, 199

— nidificum Krzl. IX, 286

\*- odoratum Schltr. VIII, 503; X, 76 \*- oligadenium Schltr. VIII, 502; X, 71

\*— pachyanthum Schltr. IX, 290 \*- Palmerstoniae Schltr. III, 317

- pandaneti Ridl. IX, 286 (- parciflorum Krzl.) X, 72

- parietiforme J. J. Sm. X, 77 - parvulum Rolfe X, 78

- pensile Ridl. IX, 286 - penttactis Krzl. IX, 286 78 \*Dedromecon myrtifolia Fedde III, 245 Dendrobium piestocaulon Schltr. IX, 286 plebejum J J. Sm. X, 76
 podagraria Krzl.) X, 76 \*Dendropanax morbiferum Lévi. VIII, 283 \*- poneroides Schltr. X, 251 - praeustum Krzl IX, 286 (- pruinosum Krzl) X, 80 Pseudo-Dichaea Krzl. IX, 286 - purissimum Krzl. IX, 286 - purpureum Roxb. var. caudidulum R. f. IX, 286 - var \*Steffensianum Schltr. X, 81 ramificans J J. Sm. X, 73 \*- Reineckei Schltr. IX, 102 \*- rhodobalion Schltr VIII, 501; X, 77 - Rumphianum Teysm. et Binnend. (— salicornioides J. J. Sm.) X, 72 — Sanderae Rolfe VIII, 382 (- Sarasinorum Krzl.) X, 83 \*- Sayeri Schltr. III, 317 \*- scirpoides Schltr. IX, 103 singalanense Krzl. IX, 286 \*- Smithianum Schltr. X, 74 -- - var. \*nebularum Schltr. X, 75 \*— sororium Schltr. VIII, 504; X, 80 \*— speculigerum Schltr. VIII, 507; X, 72 \*— stenophyton Schltr. VIII, 500; X, 77 \*- suaveolens Schltr. VIII, 504; X, 76 \*- subulatoides Schltr. IX, 290 - superbum Rchb f. X, 84 (- sylvanum Krzl.) IX, 104 - tenellum Lindl var. flavescens J. J. Sm. V, 293 \* - thysanophorum Schltr. X, 73 - Tokai Rchb. f. IX, 103 (— tomohonense Krzl.) X, 70 – torquisępalum Krzl. IX, 286 triviale Krzl. IX, 104 \*- truncicola Schltr. X, 81 tysanochilum Schltr. IX, 102
 utriculariopsis Krzl.) X, 76 \* - vagans Schltr. IX, 104 - Vaupelianum Krzl IX, 102 \*- Wichersii Schltr. VIII, 506 \*- Wilmsianum Schltr. II, 197 Wilsoni R. A. Rolfe IV, 367 IX, 352 \*- xiphophyllum Schltr. IX, 291 \*Dendrocalamus nudus Pilger III, 117 Dendrochilum formosanum Schltr. IX, 340 \*- grandiflorum Schltr. VIII, 563 - grandiflorum Schltr., non Pfitzer IX, 163 \*- hamatum Schltr. IX, 340

 macropterum Kzl. X, 19 \*— microstylum Schltr. IX, 339 \*— oxyglossum Schltr. IX, 162

\*— oxylobum Schltr. IX, 431 \*— panduratum Schltr. VIII, 562

\*- stenochilum Schltr. IX, 339

\*- Brandegei Fedde III, 246

\*Dendromecon Bolanderi Fedde III, 245

(- proteum Benth.) VI, 46 \*Dennstaedtia articulata Rosenst. X, 322 - Smithii (Hk.) var. \*novoguineensis Rosenst. X, 323 \*Dentaria Bodinieri Lévl. VIII, 452 (- Clusiana Rchb.) VIII, 368 ( - digitata Lam.) VIII, 368 (- pentaphyllos Scop) VIII, 368 (— pentaphyllos β u. γ L.) VIII, 368 Derris alborubra W. B. Hemsl. III, 187 - emarginata Th. Val. V, 380 Desbordesia pallida v. Tiegh. V, 151 - Pierreana van Tiegh. V, 151 Soyauxi van Tiegh. V, 151 Spirei van Tiegh. V, 152
 (Deschampsia brevifolia R. Br.) VIII, 78 (- caespitosa Hart.) VIII, 78, 79 - caespitosa P. B. var. Llenasii Cadevall et Pau VII, 178 - var. pseudoflexuosa Dom. I, 130 — — f. montenegrina Rohl. I, 33 - ruwensorënsis Chiov. VI, 179 Descurainia myriophylla (H. B. K.) R. E. Fr. IV, 24 - pinnatifida Webb) VIII, 132 \*Desmodium Deplanchei Harms X, 176 \*- ? Francii Harms X, 130 \* pentaphyllum Harms X, 131 \*- stenophyllum Harms X, 132, 176 - ? striatum DC.) X, 403 Desmotrichum parietiforme Krzl.) X, 77 \*Deuterocolinia strobilifera Mez III, 15 \*Deutzia Chanetii Lévl. IX, 451 \*— coreana Lévl. VIII, 283 \*- cyanocalyx Lévl. X, 438 \*- Fauriei Lévl. VIII, 283 - globosa Duthie V, 3 mollis Duthie V, 2reflexa Duthie V, 3 \*- Vilmorinae Lem. et D. Bois III, 230 - Wilsoni J. F. Duthie IV, 167 (Deverra Rohlfsiana Aschers.) IX, 352 - tortuosa var. virgata Coss. et Kral.) (Deyeuxia chilensis Desv) IV, 89 - chrysostachya Desv.) X, 169 - chrysostachya R. Phil.) X, 168 - tenuifolia Phil.) IV, 89 - Treutleri Stapf) III, 242 (Diachyrium arundinaceum Gris.) IV, 278 \*Dialypetalum compactum A. Zahlbr. IV, 7 Dianthus carthusianorum L. var. Cadevallii Pau VII, 178 – var. fontanus Henle et Naegele — — f. pumila Vacc. VIII, 328 \*- Fauriei Lévl. et Vant. VII, 200 — Frivaldskyanus Boiss, f. aristata Vand. IX, 525

Dianthus furcatus Balb. var. Gyspergerae (Rouy) Burn. III, 122

giganteus D'Urv. f. aristata Vand. IX, 525

(- Gyspergerae Rouy) III, 122

×— Hellwigii Borb. (D. Armeria× deltoides Rchb.) b. Preissmanni v. Hay. VII, 36

hispanicus Asso var. serratus (Lap.)

Pau VII, 84

— Hoppei Portenschlag VII, 35 - paniculatus Loj. Poj. V, 24 × paradoxus R. Keller II, 149

(— plumarius Gebh.) VII, 36 (— plumarius Maly) VII, 35 (— serratus Lap.) VII, 84 (— speciosus Rchb.) VII, 36

(- subgiganteus Borbàs) IX, 525 (— superbus L.) VII, 36

 – subsp. B. speciosus Hay. VII, 36  $(--\beta)$  speciosus Rchb.) VII, 36

 – subsp. A superbus Hay. VII, 36 (- vaginatus Chaix × inodorus L.)

vaginatus Chaix form. robusta E.

Steiger III, 235

(- Wimmeri Wich.) VII, 36 Zederbaueri Vierh. VI, 144 \*Diapensia purpurea Diels X, 419 \*Dicentra occidentalis Fedde X. 315 \*- peregrina (Rudolph) Fedde IX, 238 Dichapetalum acuminatum De Wild. X, 425

- - var. Laurentii De Wild. X, 426

 mombongense De Wild, X, 426 Thonneri De Wild, X, 426 (Dichopetalum F. Muell.) V, 104

\*Dichosciadium nov. gen. Dom V, 104 \*- ranuculaceum Dom. V, 104

- var. tasmanicum Dom. V, 105 – var. typicum Dom. V, 105 Dichotrichum trilorum Th. Val. V, 391

\*Dichrocephala amphiloba Lévl. et Vant VIII, 59

Dichrostachys nutans (Pers.) Benth. B grandifolia Lanza IX, 414

nutans (Pers.) Benth. α typica Lanza

IX, 413

\*Dicksonia grandis Rosenst. V, 34 \*Dicliptra montana Lindau I, 157 (- pectinata BI) IX, 305 Dicoma gnaphaloides Mattei IX, 254

\*Didissandra Beauverdiana Lévl. IX, 328

Cavaleriei Lévl. et. V, 221, 223
Fritschii Lévl. et Vant. V, 221, 223
Ianuginosa C. B. Cl.) V, 223

- Mihieri Franch. V, 223

 Notochlaena Lévl. et Vant. V, 221, 223; IX, 330

\*- pinfaensis Lévl. IX, 328 (— saxatilis Hemsl.) V, 223

(Didissandra sesquifolia C. B. Cl.) V, 223 - speciosa Hemsl.) V, 223

(- stolonifera Lévl. et Vant.) IX, 323 Didymocarpus anachoreta (Hance) Lévl. V, 222

\*- aureo-glandulosa C. B. Cl. IV, 292 - Cavaleriei (Lévl. et Vant.) Lévl. V, 223; IX, 453

 Clarkei (Clarke) Lévl. V, 223 - cortusifolia (Hance) Lévl. V, 222

- eburnea (Hance)Lévl. V, 222 elegantissima (Lévl. et Vant.) Lévl. V, 223

\*— Esquirolii Lévl. IX, 328

- Fauriei (Franch.) Lévl. V, 222 - Fritschii (Lévl. et Vant.) Lévl. V, 224

Juliae (Hance) Lévl. V. 223

lanuginosa (Clarke) Lévl. V, 223
macrosiphon (Hance) Lévl. V. 223

Martini Lévl. et Vant. V, 222
Mihieri (Franch.) Lévl. V, 223 notochlaena (Lévl. et Vant.) Lévl. V, 223

(— obtusa Wall.) V, 223

(- primuloides Maxim.) IX, 330 saxatilis (Hemsl.) Lévl. V, 223
Seguini Lévl. et Vant. V, 222

 sericea (Lévl. et. Vant.) V, 223 - sesquifolia (Clarke) Lévi V, 223

- sinensis (Lindl.) Lévl. V, 223 speciosa (Hemsl.) Lévl. V, 223

Didymochlaena truncatula (Sw.) var. \*ozeanica Rosenst. V, 374

(Didymoplexis minor J. J. Sm. subsp. samoensis Fleischm. et Rech.) IX, 85

\*- samoensis Schltr. IV, 85 \*Diervilla suavis Kom. IX, 391 (Dieteria viscosa Nutt.) VIII, 271

Digitalis Amandiana Samp. IV, 348, VIII, 219

× Di-Tellae (D. ferruginea × micrantha) A. Trotter IX, 190

- miniana Samp. IV, 348, VIII, 219 (- purpurascens Samp. [von Roth] VIII, 219

purpurea L. var. 2 valida Mer. VII, 364

(Digitaria paspaloides Michx.) IV, 306 (- pulchella Griseb) IX, 39

- sanguinalis Scop. var. biverticillata Reyn. VIII, 214

Diglyphosa latifolia Bl. var. \*celebica Schltr. X, 15

Digomphia densicoma (Mart.) Pilger VIII, 151

Diodia incana Areschoug X, 302 Dioscorea Bemandry Jum. et Perr. de la Bath. X, 217

— birmanica Prain et Burk. I, 59

(- deltoidea Hook. f.) I, 61

- enneaneura Prain et Burk. I, 64

- floridana Bartl. IX, 573

80 Dioscorea hirticaulis Bartlett IX, 573 - Macabiha lum. et Perr. de la Bath. X, 218 - paniculata Michx, var. glabrifolia Bartl. IX, 572 panthaica Prain et Burk. I, 64
Prazeri Prain et Burk. I, 61 - sikkimensis Prain et Burk. I, 61 - Soso Jum. et Perr. d. l. Bath. X, 218 - Yokusai Prain et Burk, I, 63 - vunnanensis Prain et Burk I, 63 (Diospyros cauliflora Bl.) VII, 15 — — var. genuina Hochr. VII, 15 — — var. Valetoniana Hochr. VII, 15 (- Embryopteris Pers) VII, 16 - frutescens Bl. var. Valetonii Hochr. VII, 15 (— macrocarpa T. et B.) V, 388 malabarica Kost, var, genuina Hochr. -- - var. glutinifera Hochr. VII, 16 - maritima Bl. var. dolichocarpa Hocht. VII, 15 - papuana Th. Val. V, 388 - Perrieri Jum. IX, 575 - siamensis Hochr. VII, 15 subrigida Hochr. V, 348subtruncata Hochr V, 348 — Treubii Hochr. V, 348 Dipelta ventricosa Hensl. VIII, 379 Diphaca bibracteata (Hochst.) Schinz var. Menyhardtii Schinz VI, 165 (Diphyes ciliata Bl.) IX, 165 Diplachne chloridiformis Hackel IV, 343 - fusca (L.) Pal. var. lutescens Probst u. Thell. V, 360 Dipladenia surinamensis Pulle X, 412 \*Diplazium acrocarpum Rosenst. X, 328 \*- Ballivianum Rosenst. VI, 311 \*- Bamlerianum Rosenst. X. 329 \* - Bombonasae Rosenst. VII, 294 \* - Bonapartii Rosenst VII, 295 \*- Bradeorum Rosenst. IX, 69 \*- Brausei Rosenst. IX, 68 \*- Buchtienii Rosenst. VI, 312 \*— Burchardi Rosenst, IV, 294 — expansum Willd. var. \*Spruceana Rosenst, VII, 297 \*- mapiriense Rosenst. VI, 310 \* - nitens Rosenst. V, 373 \*- palmense Rosenst. X, 276 \*- retusum Rosenst. X, 277 - Roemerianum (Kze.) Presl var.

\*brevifolium Rosenst. VII, 293

\*prolifera Rosenst. VII, 294

- Shepherdi (Spreng.) Presl

\*— subobtusum Rosenst. VII, 296 \*— tarapotense Rosenst. VII, 295

\*- turubalense Rosenst. X, 276

(- filiforme Krzl.) X, 77

\*- Yungense Christ et Rosenst, V, 233

(Diplocaulobium arachne Krzl.) X, 77

var.

Diplocyathium nov. gen. Heinr. Schmidt IV, 287 - capitulatum (Rchb.) Schm IV, 287 (Diplopappus linearis Hook.) VIII, 271 (Diplotaxis brassicoides Rouy) VI, 382 (- erucoides DC.) VIII, 544 – var. β Cyrenaica Dur. et Barr. IX, 349 — — f. manubricata K. Johansson IX, 493 heterophylla Loj Poj. III, 333
nudicaulis (Log.) Pau VI, 382 - tenuifolia (L.) DC. f. sulphuraceus K. Johansson IX, 493 ( - virgata var. platystylos Aschers,) 1X, 349 \*Dipodinm gracile Schltr. X, 191 Diptychandra epunctata Tul. subsp. \*Rojasii Hassler VIII, 131 Dirichlaetia Borziana Mattei IX, 254 - Princei Dop VIII, 491 \*Dischidia glabra Warb. III, 344 \*- Hollrungii Warb. III, 344 \*- Sarasinorum Warb. III, 345 \*- subulata Warb. III, 345 \*Discocalyx Merrillii Mez III, 101 (Discolobium junceum Mich.) VIII, 126 - leptophyllum Benth. var. \*junceum (Mich.) Hassl. VIII, 126 - - f.  $\beta$  \*grandiflora Hassl. VIII, 126 - - f.  $\alpha$  \*parviflora Hassl.VIII,126 - pulchellum Benth. var. \*viscosissimum Hassl. VIII, 125 Disepalum acuminatissimum Boerl. et Koord, X. 316 \*Disperis philippinensis Schltr. IX, 436 Disporopsis Pernyi Hua VI, 114 \* - Cavaleriei Lévl. V1, 264 (- Menziesii Britt.) VI, 78 - pullum Salisb. var. ovalifolium Lévi. VII, 384 Smithii (Hook.) Piper VI, 78 \*- Taquetii Lévl. X, 372 (Dissothrix Gardneri Gray) IV, 149 – imbricata B. L. Rob. IV, 149 (Distasis concinna H. et A) VIII, 271 Distictis Kochii Pilger VIII, 151 Distylium chinense Hemsi. V, 340 myricoides Hemsl. V, 341 (- racemosum var. chinense Franch.) V, 340 - strictum Hemsl. V, 341 Ditassa caucana Pittier VIII, 477 Dizygotheca plerandroides R. Vigu. III, 336 VI, 47 Dobera Macalusoi Mattei IX, 348 \*Docynia Delavayi (Franch.) C. K. Schn. III, 180 \*- Doumeri (Boiss.) C. K. Schn. III, 180 (- indica Decne.) III, 180

Dodecatheon conjugens var. leptophyllum (Suksd.) Piper VIII, 14

(- Cusickii Greene) VIII, 14 (- Hendersoni A. Gr.) VIII, 14

 var. leptophyllum Suksd ) VIII, 14 (- integrifolium Michx.) VIII, 14

(- - var. latifolium Hook.) VIII, 14

(-- var. vulgare Hook.) VIII, 14 latifolium (Hook) Piper VIII, 14

(— meadia var. pauciflorum Dur.) VIII, 14 (— var. puberula Nutt.) VIII, 14

(- pauciflorum Greene) VIII, 14

(- puberulentum Heller) VIII, 14 puberulum (Nutt.) Piper VIII, 14 vulgare (Hook.) Piper VIII, 14

Dodonaea adenophora Miq. var. ovata A. J. Ewart VIII, 405

×-- Fauriei Lévl. (D. viscosa L. Xstenoptera Hillebr.) X, 155

— truncatialis F. v. Müller heterophylla Maiden et Betche V, 55 Dolichandra cynanchoides Cham. var. \*latifolia Hassl. IX, 59

(Dolichogyne glabra Phil.) III, 295 Dolicholus cuernavacanus Rose V, 107

 discolor (Mart. et Gal ) Rose V, 108 - hondurensis Rose V, 107

- longeracemosus (Mart. et Gal.) Rose V, 108

— macrocarpus (Benth) Rose V, 108

Nelsoni Rose V, 108

 nigropunctatus (S. Wats.) Rose V, 108

- precatorius (H. B.) Rose V, 108

Pringlei Rose V, 108
Vailiae Rose V, 108
(Dolichos angularis Willd.) VIII, 488

– robustus Bolus VII, 125

\*Doritis Steffensii Schltr. X, 194 Doronicum hungaricum Reichb. var. bulgaricum Davidoff I, 126

(Douglasia Johnstonii A. Nels.) V, 219; IX, 483

Draba aizoides L. var. Beyeri Vacc. VIII, 327

— — var.  $\beta$  hispidula Hay. VIII, 368

-- - c. reducta Bolzon IX, 187

(— alba Gilib.) VIII, 369

(— alpina L. var. gracilescens Simm. VIII, 76

(- altaica Fr.) VIII, 76

(- ambigens (Jord.) Hay, et Wib VIII, 369

(— Beckeri Hay.) VIII, 368 \*— Bellii Holm. III, 338

×— ficta (D. aizoides × Sauteri Wettst.) Camus VIII, 368

(— fladnizensis var. altaica Gelert) VIII, 77

(- frigida Boiss.) VIII, 132

(— — var. laevipes Boiss.) VIII, 132

Gilgiana Muschl. III, 212

Draba glabrescens (Jord.) Hay, et Wib. VIII, 369

Hatcheriana Giig I, 114

— hispanica Boiss, var. brevistyla Pau VIII, 132

— — f. exscapa Pau VIII, 132 - maiuscula (Jord.) Hay, et Wib. VIII, 369

( - Martinsiana Fr.) VIII, 76

(— micropetala β Hooker) VIII, 76

(- minima C. A. Mey.) VIII, 369 Schweinfurthii Muschl. III, 212 -- stenocarpa (Jord.) Hay. VIII, 369

× -- Sturii (D. fladnitzensis × tomentosa) Strobi VIII, 368

subcapitata Simm. VIII, 76

(- tomentosa var. laevipes VIII, 132

- - var nevadensis Pau VIII, 132

(- verna L.) VIII, 369

(- verna Rchb.) VIII, 369 (-- subsp. glabrescens Rouy et Fouc.) VIII, 369

 $(--\beta)$  Krockeri Andrz.) VIII, 370

(-- y Ianceolata Neilr.) VIII, 369

(— — subsp. lanceolata Rouy et Fouc.) VIII. 369

 $(--\beta)$  ovalis Neilr.) VIII, 370

\*Dracocephalum Cavaleriei Lévl. VIII,

\*- Esquirolii Lévl. VIII, 422

\* Fargesii Lévl. IX, 246 \* Kaitcheense Lévi VIII, 422

\*— longipedicellatum Muschl. IV, 269

pamiricum Briq. VI, 69
Paulsenii Briq. VI, 68
pinfaense Lévi. VIII, 422

- pulchellum Briq. VI, 70 \* - stachydifolium Lévl. VIII, 422

Dracophyllum politum (Cheesem.) Cock. VIII, 222

(— rosmarinifolium R. Br. var. politum Chees.) VIII, 222

Drosace A. Nels. nov. gen. IX, 483
— carinata A. Nels. IX, 483

Drosera Aliciae R. Hamet III. 367

-- Andersoniana (W. V. Fitzg. ined.) Ew. and White IX, 134

- bulbigena Morr. V, 96

- Huegelii Endl. var. flaviflora Fitzg. IX, 65

( – intricata Planch.) IX, 65

(— Menziesii R. Br. var. flavescens Benth.) IX, 65

 rotundifolia L. \*f. breviscapa Dom. I, 11

(Dryandra oleifera Wall.) V, 260

Dryas integrifolia Vahl var. canescens Simm. VIII, 75

Drymaria multiflora Brdg. III, 374

82 Drymis Winteri Forst. var. semiglobosa Dus. VII, 262 (Drymocallis glutinosa Rydb.) VII, 215 — valida (Greene) Piper VII, 215 \*Drymoda siamensis Schltr. II, 170 Drymophleus Reineckii Warb. IV, 230 \*Dryopteris adenochlamys C. IX, 370 \*- amambayensis C. Chr. VII, 374 \* ancyriothrix Rosenst. VII, 305 aquatilis Copel. X, 343 \* asterothrix Rosenst. VII, 305 \*— Bamleriana Rosenst. X, 334

\*— baniensis Rosenst. VII, 301

\*— biformata Rosenst VII, 300

\*— bifrons C. Chr. VI, 350 \*- Bonapartii Rosenst. VII, 303

\*- canelensis Rosenst. VII, 302 \*- caudiculata Rosenst. IX. 426 X, 343

(- connexa [Kaulf.] C. Chr.) IX, 140 - deversa (Kze.) var. \* tarapotensis Rosenst. VII, 298

\*- caeca Rosenst. VII, 302

Filix mas  $\beta$  crenata (Milde) Hay. VI, 184

-- - ε deorso-lobata (Moore) Hay. VI. 184

 $--\delta$  Heleopteris (Borckh.) Hay. VI, 184

 $--\gamma$  incisa (Moore) Hay. VI, 184 — — monstr. erosa (Schk.) Hay. VI, 184

— — var. \*Pagesii C. Chr. VII, 385

 $- - \alpha$  subintegra (Döll) v. Hay. VI, 184

\* - flavovirens Rosenst. X, 334 \*— Goedenii Rosenst. IV, 293 \*— Keysseriana Rosenst. X. 334

(- Kuhnii C. Chr.) X, 213
\*- leptogrammoides Rosenst. IX, 68 \*- Limonensis C. Chr. VIII, 18

\*- Linnaeana Christens. VI, 186

\*- logavensis Rosenst. X, 332 \*- lugubriformis Rosenst. VII, 299 (Hook.) O. Ktze. - macrotis \*nephrodioides Rosenst. VII, 298

\*- mapiriensis Rosenst. VI, 313 \*— Moussetii Rosenst. VIII, 278 \*— obtusifolia Rosenst. X, 336

opposita (Vahl) var. \*furcativenia Rosenst. VI, 313

 paleacea (Don) Hand.-Mazt. VII, 188 parasitica (L.) O. Ktze. var. \*glan-

duligera Rosenst. VII, 304 \*- peruviana Rosenst. VII, 298

\*- platylepis Rosenst. IV, 4 - pulchella (Salisb.) Hay. VI, 185

×- remota (A. Br.) (Dr. Filix mas × spinulosa (A. Br.) Christens.) Hay. VI, 185

\*— Rimbachii Rosenst. VII, 147 \*- rivulariformis Rosenst. VI, 316 \*Dryopteris Rojasii Christ VI, 349 \*- soriloba Christ VI, 350

\*— stenophylla Rosenst. V, 233 \* - subattenuata Rosenst. X, 332

\*- supralineata Rosenst. VIII, 278 \* supranitens Christ VIII, 19 \* suprastrigosa Rosenst. X, 335

\*— Taquetii Christ V, 284 \*— uncidens Rosenst. X, 337

\*- urens Rosenst. IV, 5

 urophylla (Wall.) var. \*novoguiñeensis Rosenst. X, 336

\* yungensis Christ et Rosenst. V, 234 \*Dubautia Fauriei Lévl X, 122

Ducrosia anethifolia Boiss var. Jamiatii

Burkill V, 251 Dunnia gen. nov. W. J. Tutcher II, 111

- sinensis Tutcher II, 112

\*Dupontia micrantha Holm III, 337 Durandea Deplanchei Stapf V, 269

— Jenkinsii Stapf V, 270

— latifolia Stapf V, 269

- Lenormandii Stapf V, 269

- magnifolia Stapf V, 268 - parviflora Stapf V, 270 - racemosa Stapf V, 269

 viscosa Stapf V, 269
 vitiensis Stapf V, 270 \*Duranta coriacea Hay. II, 88

 Plumieri Jacq. IX, 367 \*- tomentosa Hay. II, 88

\*Dyckia hamosa Mez III, 33 Dysodia belenidium (DC.) Macl. IX, 139 \*Dysophylla Esquirolii Lévl. X, 476

\*- Fauriei Lévl. IX, 248

\* - Koehneana Muschl. IV, 269 (Dysoxylum alliaceum Bl.) VII, 14 — var. angustifolium Val. VII, 14

E.

Earina samoensium F. v. M. et Krzl.

Echeandia paniculata Rose V, 191 - reflexa (Cav.) Rose V, 191

Echeveria turgida Rose VI, 90 Echinocactus arizonicus R. E. Kunze VIII, 429

- brachyanthus Gürke IV, 351 (- Courantii Lem.) VIII, 224

- elachisanthus Weber II, 76 - Fobeanus Mieckl. VI, 93

- Maassii E. Heese VI, 118 Sellowii L. et O. var. b. Courantii

(Lem.) Gürke VIII, 224 - tephracanthus L. et O.) VIII, 224 \*Echinocarpus Cavaleriei Lévl. X, 474

\*-erythrocarpa Lévl. X, 474 \*- Esquirolii Lévl. X, 474

\*- hederaerhiza Lévl. X, 474 Echinocereus de Laetii Gürke VIII, 427

- Kunzei Gürke IV, 349

Echinops Cyrenaicus Dur. et Barr. IX, 467

(- lasioclinus Boiss.) IX, 467

- microcephalus S. S. f. eriocephalus Vandas IX, 527

\*-- tschimganicus B. Fedtsch. IX, 122 Echinopsis deminuta Weber II, 75

– lateritia Gürke VI, 91

 mamillosa Gürke VI, 88 - Meyeri E. Heese VI, 116 - pygmaca R. E. Fr. III, 364

\*Echites altescandens H. Winkl. VII, 243 \*- mapirensis H. Winkl, VII, 113

Echium candicans L. B Noronhae Men. IV, 43

- confusum De Coincy var. bracteatum Somm. VIII, 495

(- Davaei Rouy) VI, 187

- lineatum Jacq. var. Gomerae Pit. IX, 281

- plantagineum L. var. minor Mer. VII, 366

 rosulatum Lange var. γ Davaei (Rouy) P. Cout. VI. 187

 tuberculatum Hoffgg, et Link var. y densiflorum P. Cout. VI, 187

— vulnerans Mer. III, 328, VII, 366 (Egassea laurifolia Pierre) V, 118 (— Pierreana De Wild.) V, 120

(Elaeagnus hortensis M. B. var.  $\beta$ Bunge) IV, 9

 orientalis L. fil. f. culta Litw. IV, 9 — f. sphaerocarpa Litw. IV, 9

– f. spontanea Litw. IV, 9 Elaeocarpus dentatus var. obovatus Cheesem. V, 319

- Miquelii Hochr. VII, 14

- sphaericus K. Schum. var. major Hochr. VII, 15

stipularis Bl. var. sumatranus Hochr. VII. 14

 Treubii Hochr. VII, 15 — Valetonii Hochr. VII, 15

(Elaeococca verrucosa Juss.) V, 260 (Elaeodendron attenuatum Rich.) III, 87

( dioicum Gris.) III, 87
Laneanum A. H. Moore III, 87
xylocarpum (Vent.) DC. III, 87
Elaephorbia O. Stapf nov. gen. V, 271 drupifera Stapf V, 271

\*Elaphoglossum Bonapartii Rosenst. VII, 310

\* - Bradeorum Christ VIII, 17

\*- elegantulum Rosenst. X, 280 \*- firmulum Rosenst. X, 279

\*- Francii Rosenst. IX, 76 \*— micropus Rosenst. VI, 316

 var. \*major Rosenst. VI, 315 \*- novoguineense Rosenst. X, 341

\*- palorense Rosenst. VII, 149 \*- paulistanum Rosenst. IV, 295 Elaphoglossum Preslianum (Fée) Christ var. \*arbusculum Rosenst. VII, 309

\*- productum Rosenst. VI, 315 \*- Rosenstockii Christ IV, 6

\*— subarborescens Rosenst. IV, 295 \*— tenax Rosenst. VIII, 279

Elataeriospermum? rhizophorum Boerl. et Koord. X, 318

Elateriopsis Oerstedii (Cogn.) Pitt. VIII,

(Elatine campylosperma Ross, non Seub.) VIII, 496

Hydropiper L var. Gussonei Somm. VIII. 496

( – – ε macropoda Fiori) VIII, 496

(- macropoda Solla, non Guss.) VIII,

Elatinoides lanigera (Desf.) var.  $\beta$ dealbata (Hoffgg. et Link) P. Cout. VIII, 217

 spuria (L.) Wettst. var. β racemigera (Lange) P. Cout. VIII, 216

Elatostema brachyurum Hallier II, 63 \*- cupreo-viride Rech VI, 49

\*- lignescens Hallier II, 61 \*- Lilyanum Rech. VI, 50

- pedunculatum Forst, var. \*puberulum Hallier II, 61

\*- polioneurum Hallier II, 62

\*— rostratum Hassk. β \*brevirostre Hallier II, 63

\* - viridissimum Rechinger VI, 49

\*— visciforme Hallier II, 61

Eleocharis tetraquetra Nees var.  $\beta$ Wichurai Mak. VI, 287 (Elephantorrhiza Burchellii Benth.) VIII,

- elephantina (Burch.) Skeels VIII, 489 Elionurus latiflorus Nees var. \*pectinatus Hack. VII, 369

- viridulus Hackel IV, 305 (Elisena [Ismene] longipetala & X Ismene calathina ♀) IV, 176

\*Elleanthus glaucophyllus Schltr. VIII, 567

\*- Koehleri Schltr. X, 385, 388 maculatus Reichb. fil., Kränzl. (diagn.

nov.) VI, 18

– scopula Schltr. X, 457 \*- Tonduzii Schltr. VIII, 567

(Elodea crassifolia Bl.) VI, 290 (- japonica Bl.) VI, 290

- virginica Regel non L.) VI, 290 Elodes virginica Nutt. var. asiatica Max.) VI, 290

– virginica var. japonica Mak VI, 290

\*Elsholtzia alopecuroides Lévl. et Vant. VIII, 424

Argyi Lévi. VIII, 425

\*- Cavaleriei Lévl. et Vant. VIII, 424

(- Cavaleriei Lévl. et Vant.) IX, 224

84 Elsholtzia cristata Willd. f. ruderalis Kom. V, 273 - f. saxatilis Kom. V, 273 \* Dielsii Lévl. IX, 441 \*- Feddei Lévl. IX, 218 \*- Lychnitis Lévl. et Vant. VIII, 425 \* - monostachys Lévl. et Vant. VIII, 424 \*- pseudo-cristata Lévl. et Vant. VIII, 424 \*— Souliei Lévl. IX, 218, 248, 441 \*— tristis Lévl. et Vant. VIII, 425 Elymus arenarius L. var. mollis (Trin.) Koidz, IX, 136 caput Medusae L. var. hordaceus C. Pau III, 322 - Leckenbyi Piper VI, 75 (- mollis Trin. IX, 136 (- saxicola Scribn. & Sm.) VI, 75 Elyna Bellardii (All.) Koch VIII, 257 - myosuroides (Vill.) Fritsch VIII, 257 \*Embelia Blinii Lévl. X, 375 \*- Bodinieri Lévl. IX, 327 \*- Dielsii Lévl. X, 374 \*- Esquirolii Lévl. X, 374 \*- rubrinervis Lévl. X, 374 \*- rubro-violacea Lévi X, 375 \*- Schlechteri Lévl. X, 374 (Embryopteris glutinifera Roxb.) VII, 16 Emorya suaveolens Torr. IX, 361 Encelia resinosa Brdg. III, 380
— suffrutescens R. E. Fr. III, 297 \*Enkianthus Cavaleriei Lévl. IX, 448 \* - cerasiflora Lévl. IX, 448 \*- Dunnii Lévl. IX, 448 - pauciflorus Wils. VII, 235 - quinqueflorus Lour, var. serrulatus Wils. VII, 235 \* - xantoxanthus Lévl. X, 448 \*Epiblastus masarangicus (Krzl.) Schltr. IX, 287; X, 66 - sciadanthus Schltr. IX, 98 Epicampes arundinacea (Trin.) Hack. IV, 278 coerulea Gris. var. submutica Hack. X Epicattleya Wolteriana (Epidendrum aurantiacum ♂ × Cattleya Schraderae ♀) Kränzl. VIII, 382 \*Epidendrum abbreviatum Schltr. III, 107 \*— Adolphi Schltr. III, 108 \*— anoglossum Schltr. IX, 214 - belvederense Fawc. et Rende var. \*brevifolium Cogn. VII, 123 \*- bolivianum Schltr. X, 456 \*- brachyglossum Cogn. VII, 121 \*— Buchtienii Schltr. X, 455 \*— Buenavistae Kränzl. VI, 19 \*- cardiophorum Schltr. IX, 214 \*— crassinervium Kränzl. I, 182 \*— culmiforme Schltr. X, 485 \* - cuneatum Schltr. X, 456

\*- densifolium Kränzl. I, 186

\*Epidendrum dermatanthum Kränzl. I, \*— dolichostachyum Schltr. III, 79 \*— euspathum Kränzl. I, 182 \*- Feddeanum Kränzl. I, 188 (— flosaeris L.) X, 196 \* - frons bovis Kränzl. I, 181 \* - Hassleri Cogn. VII, 70 \*- Henrici Schltr. III, 108 \*— Huacapistanae Kränzl. I, 183 \*- isomerum Schltr. II, 132 \*— macrocyphum Kränzl. I, 185 \*— macrogastrium Kränzl I, 187 \* - mixtum Schltr. X, 294 \*- monzonense Kränzl. I, 88 \* – Moyobambae Kränzl. I, 185 - nocturnum Jacq, var, minus Cogn. VI, 61 \* - obliguum Schltr. X, 457 \*— octomerioides Schltr. III, 248 \*- pachycarpum Schltr. III, 109 \*— pachychilum Kränzl. I, 184 pachygastrium Kränzl. I, 183 Pansamalae Schltr. X, 485

paranthicum Rchb. f. III, 49 \* paucifolium Schltr. III, 248 \*- physopus Kränzl. I, 87 \*— polychlamys Schltr. III, 109 \* pseudo-ramosum Schltr. X, 361 \*- repens Cogn. VII, 122 \*— rhopalorhachis Kränzl. I, 180 \*- Rojasii Cogn X, 343 \*— saxicolum Kränzl. I, 187 \*- Schenckianum Kränzl. VII, 114 \* Schumannianum Schltr. IX, 215 \*— selaginella Schltr. III, 48 \*- singuliflorum Schltr. X, 484 (- striatum Thbg.) X, 255 \*— tenuiflorum Schltr. III, 49 \*- trachythece Schltr. III, 249 (- tuberosum Lour.) X, 255 \*- Weberbauerianum Kränzl. I, 87 \*- Wercklei Schltr. III, 48 (Epilobium affine var. fastigiatum Nutt.) VIII, 12 \*— Alaskae Lévl. V. 9 alpinum L. var. \*Gavei Lévl. V, 194 anagallidifolium Lamk. diffusum Samp. VI, 223 angustifolium var. nanum Hepp et Rubner IX, 169 \*- - var. \*Ruessei Hepp et Schuster II, **9**5 \*x — atrichum (E. glaberrimum Barb. × E. Hornemanni Rchb.) Lèvl. VII, 99 \*x -- badense (E. roseum × Gilloti) Lévl. V, 195 Barbeyanum Lévl. IX, 19 \* - Beauverdianum Lévl. VIII, 138, IX, 79 \*— Blinii Lévl. VII, 338 \*× — Brittonii (E. coloratum Mühl. ×

E. lineare Mühl.) Lévl. IX, 79

(Epilobium californicum Trel.) V, 98

\*— canadense Lévl. V, 98

var. \*albescens Lévl. V, 195
 Chambesyanum (E, parviflorum E. Duriaei) Lévl. IX, 79

\*× — Charbonnelianum (E. Gilloti × E. Duriaei) Lévl. 195

\*— Christii Lévl. IX, 19

collinum f. apricum Rubner IX, 170
var. saxatile Payot) VIII, 330

\*— Congdoni Lévl. V, 98 \*— Cordouei Lévl. VI, 110 \*— Dielsii Lévl. III. 20

\*— Dielsii Lévl. III, 20 \*— Duclouxii Lévl. VI, 110

fastigiatum (Nutt.) Piper VIII, 12
 var. glaberrimum (Barb.) Piper VIII, 12

\*X — Fendleri (E. novo-mexicanum Haussk. X E. coloratum Mühl., Lévl.) Haussk. IX, 79

×— Gerstlaueri (E. alsinefolium Vill. × parviflorum Schreb.) Rubner IX, 171

(- glaberrimum Barb. VIII, 12 (- - var. fastigiatum Trel.) VIII, 12 (- - var. latifolium Barb.) VIII, 12 \*× - Herveyi (E. paniculatum Nutt. × E. obcordatum A. Gr.) Lévl. IX, 79

×— Knafii (E. collinum Gmel. × roseum Schreb.) Rubner IX, 170

\*- Komarowianum Lévl. V, 98

\*X— Lambertianum (E. montanum X E. Lamyi) Lévl. V, 195

\*\* — Lemayi (E. adenocaulon Hausskn.
 X E. canadense Lévl.) Lévl. IX, 79
 \*\* — Lloydii (E. Bongardi Hausskn.)
 X E. leptocarpum Hausskn.) Lévl.

IX, 79

\*— madagascariense Lévl. IV, 225

-- makinoense Lévl. II, 173

\*× — Meyi (E. hirsutum L. × E. Duclouxii Lévl.) Lévl. VI, 110

mirabile Trel. VIII, 12
Miyabei Lévl. V, 8

— montanum L. var.  $\delta$  densifolium Hepp et Rubner IX, 170

 – var. ε glandulosum Hepp et Rubner IX, 170

 – var. β lanceolatum (Koch.) Hepp et Rubner IX, 170

 $--\gamma$  saxatile Vacc. VIII, 330

– var. \*Thellungianum Lévl. V, 194
– var. α typicum Hepp et Rubner

IX, 170

\*- Muelleri Lévl. V, 100

neterioides A. Cunn. var. minimum (T. Kirk) Cock. VIII, 221

(— nummularifolium var. minimum T. Kirk) VIII, 221

— obscurum (Schreb.) Roth var. c. herminium Samp. VI, 223

Epilobium obscurum var.β strictifolium f. b. angustissimum Rubner IX, 170

— — f. a. lanceolatum Rubner IX,

- f. fasciculatum Rubner IX, 170

\*- Ostenfeldii Lévl. IX, 323

\*- Paddoense Lévl. V, 8

\*-- Palmeri Lévl. 98

 palustre L. var. ε genuinum f. a. normale Rubner IX, 171

— — f. b. subdenticulatnın Rubner IX, 171

— — var. c. heterophyllum Rubner IX, 171

(— var. lineare Krause) IX, 171 (— — f. linifolium (Remberger?) Rubner IX, 171

(— — f. rectifolium (Remberger?) Rubner IX, 171

— parviflorum Schreb. var.  $\beta$  denticulatum Hepp et Rubner IX, 169

- - f. flagelliforme Lévl. IX, 224
- var. α genuinum Rubner IX, 169
- - f. nanum Rubner IX, 169

 persicinum Rchb. f. brevifolium Rubner IX, 170

\*-- Prainii Lévl. IX, 19

× - prionophylloides (E. montanum × prionophyllum) Hdl.-Mzt. X, 308

\*X — Probstii (E. Lamyi X palustre) Lévl. VI, 264

\*× — pseudo-nivale (E. collinum × anagallidifolium) Lévl. V, 195

(— pyrricholophum Hausskn.) VI, 330 — — var. \*anoleucolophum Lévl. VI, 330

- quadrangulum Lévl. II, 173

Reedii (E. canadense Lévl. × E. Hornemanni Rchb.) Lévl. IX, 79
 roseum Schreb. var. albidum Rubner

IX, 170

— — f. nanum Rubner IX, 170
\*× — Sargenti (E. paniculatum Nutt.
× obcordatum Gray) Lévl. IX, 79

\*— Schinzii Lévl. IV, 225

\*× — sempronianum Lévl. (E. roseum Schreb. × alpinum L. race Villarsii Lévl.) VI, 110

\*- Smithii Lévl. V, 8

- thermophilum O. Paulsen IV, 46

\* - Treleasianum Lévl. V, 8

\*× — turicense (E. roseum × E. montanum) Lévl. V, 195

\*× — Wirtgeni (E. parviflorum × hirsutum) Lévl. VI, 264

Yabei Lévl. II, 173

Epimedium chrysanthum Kom. VIII, 420

- elongatum Kom. VIII, 419 \*- Komarovi Lévl. VII, 259

— parviflorum (Greene) Kom. VIII, 420 (Epipactis africana Rendle) VI, 44

Epipactis angustifolia (Schlechter) Eaton VI, 41 - bifida (Bl.) Eat. VI, 41 - biflora (Hook. f.) Eat. VI, 41 - brachiorrhynchos (Schlechter) Eat. VI, 41 colorata (Bl.) Eat. VI, 41 (- consimilis Don) VI, 44 - cordata (Lindl.) Eaton VI, 41 - discoidea (Reichb. f.) Eat. VI, 41 -- Erimae (Schlechter) Eat. VI, 41 foliosa (Lindl.) Eat. VI, 41 - formosana (Rolfe) Eat. VI, 41 fumata (Thw.) Eat. VI, 41fusca (Lindl.) Eat. VI, 41 (- gigantea Dougl.) VI, 44 glauca (J. J. Sm.) Eat. VI, 41 - gracilis (Hook, f.) Eat. VI, 41 grandiflora (Schlechter) Eat. VI, 41 grandis (King & Pantl.) Eat. VI, 41
hacijoensis (Yat.) Eat. VI, 42 Hemsleyana (King & Pantl) Eat. VI, 42 - Henryi (Rolfe) Eat. VI, 42 - hispida (Lindl.) Eat. VI, 42 lanceolata (Ridl.) Eat VI, 42 latifolia (L.) Alt. β microphylla (Sw.) f. canescens Terracc. VIII, 494 Lehmanniana (Kränzl.) Eat. VI, 42 macrantha (Max.) Eat. VI, 42
macrophylla (Lowe) Eat. VI, 42 Matsumurana (Schlechter) Eat. VI, 42 - Maurevertii (Bl.) Eat. VI, 42 - nebularum (Hance) Eat. VI, 42 - ochroleuca (Bailey) Eat. VI, 42 - papuana (Ridl.) Eat. VI, 42 - parviflora (Bl.) Eat. VI, 42 - pendula (Max.) Eat. VI, 42 polygonoides (Mueller) Eat. VI, 42
Prainii (Hook f.) Eat. VI, 42 - procera (Ker.) Eat. VI, 42 - pubescens (Willd.) Eat. VI, 42 - pusilla (Bl.) Eat. Vl, 43 - recurva (Lindl.) Eat. VI, 43 - repens var. ophioides (Fern.) Eat. VI, 43 - reticulata (Bl.) Eat. VI, 43 - robusta (Hook. f.) Eat. VI, 43 - rubicunda (Bl.) Eat. VI, 43 Schlechtendahliana (Reichb. f) Eat. VI, 43 - scripta (Reichb. f.) Eat. VI, 43 ( - sessilifolia Peterm.) VI, 44 (- somaliensis Rolfe) VI, 44 striata Reichb. f.) Eat. VI, 43 - subregularis (Reichb. f) Eat. VI, 43 tessellata (Lodd.) Eat. VI, 43
triandra (Schlechter) Eat. VI, 43 velutina (Maxim.) Eat. VI, 43 - viscosa (Reichb. f.) Eat. VI, 43 - vittata (Lindl.) Eat. VI, 43 Waitziana (Bl.) Eat. VI, 43

Epiphyllum opuntioides Loefgr. et Dus. VII, 260 Epipogum nutans Rchb. f. var. \*celebicus Schltr. X, 5 \* - Rolfei (Hayata) Schltr. X, 5 \*Epirrhizanthes papuana J. J. Sm. X, 486 \*Epistephium Herzogianum Kränzl VI, 21 Equisetum fluviatile L. var. siccum Lunell VIII, 244 - maximum Lam. 4 flagelliforme Hay. VI. 186 - variegatum Schleich. var. elatum Luerss f. compositum K. Joh. IX, 493 Eragrostis andicola R. E. Fries IV, 90 - bipinnata (L.) Muschler VIII, 300 \*- blepharolepis Hack, X, 171 \*- Buchtienii Hack. VI, 157 - ciliaris (L.) Lk. var. latifolia Hack. V, 336 - costata F. Turner V, 185 (- cynosoroides Beauv.) VIII, 301(- Damiensiana Bonnet) V, 360 (- delicatula Trin.) IV, 279 \*- Dieterlenii Hack. VIII, 522 \*- elatior Hack. VII, 374, VIII, 47 \*- Hackeliana Bornm. et Kneuck. X, 381, 472 \*- Hackelii Hassl. Vill, 47 (- inconspicua hort. Coss. et Bal.) V, 360 - Jeffreysii Hack. VI, 322

\*- Kneuckeri Hack. et Bornm. X, 472

\*- laevissima Hack. X, 170

\*- macrothyrsa Hack. VIII, 47 \*— Mairei Hack. VIII, 523 \*- monandra Hack. VII, 320 (- nigra var. trachycarpa Benth.) IX, 552 patenti-pilosa Hack. VI, 322 (- pilosa var. condensata Hack;) V, 360, 361 – var. Damiensiana Bonnet) V. 360 – ssp. Damiensiana (Bonnet) Theil.) V, 360 P. de Beauv. var. delicatula (Trin.) Hack. IV, 279 (-- var. glabra Ducom.) V, 360  $(- - \alpha \text{ Moritzi Fl. d. Schw.}) \text{ V}, 360$ \*- Rojasii Hack. VII, 373 \*- trachycarpa Dom. IX, 552 - uniglumis Hack. VI, 321 - virescens (Kth.) Presl f. major Hack. IV, 344 – var. trachyphylla Hack. IV, 344 (Eranthemum seticalyx C. B. Cl.) VIII, 335 Wattii Stapf VIII, 334 Eremocarpus setigerus Benth.) VIII, 11 Eremostachys bachardenia B. Fedtsch. IV, 320 Eremurus chinensis O. A. Fedtsch. IV, 256

Eria ambasiensis Bailey VIII, 80

(Éria australiensis Bail.) III, 316

- breviflora Schltr. III, 318 celebica Rolfe X, 88

consimilis Fleischm. et Rech. IX, 104

\*- curvipes Krzl. IX, 105 \*- decipiens Schltr. X, 85

\*- dolichocarpa Schltr. IX, 105 \*- glabra Schtr. X, 90

- globifera Rolfe IV, 178 - javanica Bl. X, 91

\*- kandariana Schltr. IX, 286 \*- kawengica Schltr. X, 86

\*- klabatensis Schltr. VIII, 510; X, 84 - longispica Rolfe V, 80

\*- masarangica Krzl. IX, 287, X, 66

\*- microphyton Schltr. II, 170 \*- Minahassae Schltr. X, 88

\*- opeatoloba Schltr. VIII, 511; X, 88

\*- oreogena Schltr. X, 87 (- ornithoides Krzl.) IX, 98 (- paradoxa Krzl.) IX, 96

\* - pulla Schltr. X, 88 - punctata J. J. Sm. V, 295 \*- rhizophoreti Schltr. X, 86

rhyncostyloïdes J. O'Br. VI, 357

(- rugosa Ldl.) X, 91

\*- sapoetanica Schltr. X, 89 ( - Sarasinorum Krzl.) X, 85 \*- siamensis Schltr. II, 133 \* - soronensis Schltr. IX, 286 ( - straminea Krzl.) X, 88

(- tomohonensis Krzl.) X, 85 - tricuspidata Rolfe X, 85 \*- vagans Schltr. X, 90

\*- virginalis Schltr. VIII, 511; X, 84 \*- vulcanica Schltr. VIII, 510; X, 87

\*Eriachne Muelleri Dom X, 118

\*- pulchella Dom. IX, 552 Erica cinerea L. var. floribunda Mer. VII, 368

( - coerulea Willd.) VIII, 112 floccifera A. Zahlbr. VI, 365

(- floccosa Bartl., non Salisb.) VI, 365 - inconstans A. Zahlbr. III, 198, VI, 366

– milanjiana Bolus IV, 199 occidentalis Mer. VII, 368

- recta Bolus VII, 55

- Reenensis Zahlbr. III, 196, VI, 363 - Tetralix L. var. 3. verinensis Pau VII, 368

 Tysoni Bolus var. Krookii Zahlbr. III, 197, VI, 365

- umbellata L. var. 2. filiformis Mer. VIII, 62

Erigeron acer L. var. manschuricus Kom. V, 275

 – var. viridifolius C. G. Westerl. IV, 15

 acris L. var. alpinoides Pau VIII, 135

— — var. major (Boiss.) Pau VIII, 135 - acutatus Greene V, 399

(Erigeron alpinus Boiss, non L.) VI, 147, VIII, 135

- - var. major Boiss.) VIII, 135 (- - form. maximus Rickli) III, 91 - - var. nevadensis Pau VIII, 135

– subsp. typicus S. Beck. var. gracilis Rikli I, 160

Argaeus Vierh. VI, 146

(- cinereus Gray, non H. et A.) IX, 485 colo-mexicanus A. Nels. IX, 485 (- concinnus T. et Gr.) VIII, 271

(- Douglasii var. eradiatum A. Gr.) VIII, 271

- droebachensis O. Müller f. erecta Ch. et Br. III, 64

- eradiatus (A. Gr.) Piper VIII, 271 ( - foliosus var. inornatus A. Gr.) VIII, 271

(- frigidus Gaut.) VII, 178 - Garrettii A. Nels. IX, 485

 Gouani L. var. β gracile Pit. IX, 276 hispidissimus (Hook.) Piper VIII, 271

 hispidus (Lge.) Pau β pyrenaeus Cad. et Pau VII, 178

(- inornatus A. Gr.) VIII, 271 lapiluteus A. Nels. IX, 485
linearis (Hook.) Piper VIII, 271

(- macrorhizon Schwnf.) IX, 414

 obtusatus Greene V, 399 - politus Fr. sbsp. Berlini Simm. VIII, 183

- Schleicheri Gremli f. dubius Ch. III, 64

(- strigosus var. hispidissimus Hook.) VIII, 271

 trifidus var. discoideus A. Nels. IX, 485

(- uniflorus auct. catal.) VII, 178

– – var. glabrescens Rikli I, 160 - - var. neglectiformis Rikli I, 160

- Zederbaueri Vierh. VI, 146 (Eriobotrya lasiogyna Franch.) III, 153

( – prionophylla Franch.) III, 153 \*Eriocaulon atrum Nakai IX, 466

(Eriochlamys Knappii F. v. M.) IX, 175 Eriochloa acrotricha (Steudel) Hack,

\*- castanea Hack. VII, 370

 montevidensis Gris. f. subcolorata Hack. IV, 272

Eriogonum alatum Torr. y brevifolium Gdgr. V, 169

– β Macdougalii Gdgr. V, 169

 Albertianum Torr. γ neomexicanum Gdgr. V, 169

- -  $\beta$  ruberrimum Gdgr. V, 169

 anemophyllum Greene β Cusickii Gdgr. V, 169

 angulosum Benth. ε flabellatum Gdgr. V, 170

88 Eriogonum angulosum y patens Gdgr. V, 170 – δ pauciflorum Gdgr. V, 170 - -  $\beta$  rectipes Gdgr. V, 170 — annuum Nutt.  $\beta$  pauciflorum Gdgr. V, 170 - arizonicum Gdgr. V, 169 caespitosum Nutt. β alyssoides Gdgr. V, 170 cupreum Gdgr. V, 177Cusickii Gdgr. V, 174 - -  $\beta$  californicum Gdgr. V, 174 - dichroanthum Gdgr. V, 174 Douglasii var. ramosum Piper VI, elatum Dougl. γ erianthum Gdgr. β limonifolium Gdgr. V, 171 fasciculatum Benth. γ aspalathoides Gdgr. V, 171 - -  $\beta$  oleifolium Gdgr. V, 171 — flavissimum Gdgr. V, 174 — flavum Nutt.  $\beta$  foliatum Gdgr. V, 171 — – γ linguifolium Gdgr. V, 171 - glaberrimum Gdgr. V, 176 - - var. aureum Gdgr. V, 176 - halimioides Gdgr. V, 177 - helichrysoides Gdgr. V, 173 heracleoides Nutt. α micranthum Gdgr. V, 171 – γ multiceps Gdgr. V, 172 - - Z Rydbergii Gdgr. V, 172 – ε utahense Gdgr. V, 172 - -  $\beta$  viride Gdgr. V, 172 - Hitchcockii Gdgr. V, 170 - intricatum Gdgr. V, 173 Jamesii Benth. β simplex Gdgr. V. 172 - juncinellum Gdgr. 170 - leucocladum Gdgr. V, 171 - longifolium Nutt.  $\zeta$  caput felis Gdgr. V, 172  $--\delta$  floridanum Gdgr. V, 172  $--\gamma$  gnaphalifolium Gdgr. V, 172

– ε Lindheimeri Gdgr. V, 172

niveum Bth. γ candelabrum Gdgr.

- ochroleucum Small  $\gamma$  decalvans

 $--\beta$  macropodum Gdgr. V, 174

– β Suckdorfii Gdgr. V, 173

– β longidens Gdgr. V, 172

Macdougalii Gdgr. V, 172
marginale Gdgr. V, 176
myrianthum Gdgr. V, 173
nevadense Gdgr. V, 171

V, 173

Gdgr. V, 174

Eriogonum ovalifolium Nutt. δ cerastioides Gdgr. V, 175 - - \( \) cyclophyllum Gdgr. V, 175 — γ deltoideum Gdgr. V, 174 — ε multiscapum Gdgr. V, 175 — β nevadense Gdgr. V, 174 - -  $\delta$  utahense Gdgr. V, 175 Piperi Greene γ longiflorum Gdgr. V, 175 - --  $\beta$  ochrocephalum Gdgr. V, 175 polycladon Benth, y crispum Gdgr. V, 176 - -  $\beta$  mexicanum Gdgr. V, 176 - praebens Gdgr. V, 176  $--\beta$  divaricatum Gdgr. V, 176 racemosum Nutt. γ cordifolium Gdgr. V, 176  $--\beta$  sagittatum Gdgr. V, 176 reniforme Torr. β asarifolium Gdgr. V, 176 - restioides Gdgr. V, 179 - rhodanthum Nels, et Kdy. V, 285 - roseiflorum Gdgr. V, 175 - rosense Nels. et Kdy. V, 285 - rubidum Gdgr. V, 175 - -  $\beta$  frigidum Gdgr. 175 - salicornoides Gdgr. V, 170 sarothriforme Gdgr. V, 173 - Smallianum Heller IV, 62 - spathulare Gdgr. V, 173 sphaerocephalum var. tenue (Small) Piper VI, 169 -- subalpinum Greeneß arachnoideum Gdgr. V, 177 — — δ stenophyllum Gdgr. V, 177 – ε subnivale Gdgr. V, 177 – γ vulcanicum Gdgr. V, 177 — tenellum Torr.  $\delta$  erianthum Gdgr. V, 177  $-\beta$  grandiflorum Gdgr. V, 177 — γ sessiliflorum Gdgr. V, 177 (- tenue Small) VI, 169 Thurberi Torr. γ acutangulum Gdgr. V, 178 — β Parishii Gdgr. V, 177 thymoïdes Benth. β pallens Gdgr. V, 178 - umbellatum Torr. 9 californicum Gdgr. V, 178  $--\gamma$  chrysanthum Gdgr. V, 178 – ε cladophorum Gdgr. V, 178 \_ - β Crandallii Gdgr. V, 178 \_ \_ ζ dichrocephalum Gdgr. V, 178 — var. hypoleium Piper VI, 169

\_ \_ δ nevadense Gdgr. V, 178

Eriogonum vimineum Dougl. y californicum Gdgr. V, 179

— – δ divergens Gdgr. V, 179

- - ε oregonense Gdgr. V, 179

— β rigescens Gdgr. V, 178 (Eriolobus Delavayi C. K. Schn.) III, 180 (— kansuensis C. K. Schn.) III, 178

(- trilobata Roem.) 179

- var. oxyloba C. K. Schn.) III, 179

- Tschonoskii Rehd.) III, 179

(- yunnanensis C. K. Schn.) III, 179 (Eriopappus paniculatus Hort.) IV, 155 (Eriophorum alpinum L.) III, 142

Eriostemon intermedius A. J. Ewart VIII, 405

- tuberculosus Benth. var. megaphyllus A. J. Ew. VIII, 405 Erismanthus Leembruggianus Boerl. et Kds. X, 318

(Eritrichium californicum var. subglochidiatum A. Gr. VIII, 267

Ernestia rubra Pulle X, 410 Ernodea angusta Small III, 293

Erodium absinthioides Willd. var. \$\beta\$ amanum (Boiss, et Ky.) Brumh, f. 2. \*uniflorum Brumh. II, 118

angulatum Pom. var. Linosae Somm.

VIII, 495

 botrys (Car.) Bertol. f. α \*montanum Brumh, II, 118

carthaginense Pau III, 331

 chium (L.) Willd. var. γ \*renifolium Brumh. II, 117

- ciconum W. var. turcmenum Litw. VI, 104

 cicutarium (L.) L'Hérit. f. 3. \*argenteum Brumh. II, 118

\*— — × Jaquinianum Brumh. II, 119

\*— — × romanum Brumh. II, 119

- - b. serotinum Terracciano V, 137 geifolium Munby var. β \*trisectum Brumh. II, 117

 glaucophyllum (L.) L'Hér. f. 2. \*pubescens Brumh. I, 117

– var. β \*trilobum Brumh. II, 117

 gruinum (L.) L'Hérit. var. β \*subpinnatum Brumh. II, 118

 guttatum (Desf.) Willd. var. β \*malopoides (Desf.) Brumh, Il, 117

 hymenodes L'Hérit, var. β \*indivisum Brumh. II, 117

incarnatum (L.) L'Hér. f. 2. \*quinquefidum Brumh. II, 117

- laciniatum (Cav.) Willd, var. grandiflorum Somm. VIII, 495

— maritimum (L.) L'Hérit. f. 2. \*glomeratum Brumh, II, 117

Erodium moschatum (L.) L'Hérit. var 3 praecox Lange f. 2. \*gracilifolium Brumh. II, 118

Neilreichii Janka f. 2. \*macrophyllum

Brumh. II, 118

- petraeum (Gou.) Willd. f. 2. \*viscidum Brumh. II, 118

(Erophila ambigens Jord.) VIII, 369 (— Bardini Rosen) VIII, 369

(— brevifolia Jord.) VIII, 370 (— brevipila Jord.) VIII, 370

(— campestris Jord.) VIII, 369 — Charbonnelii H. Sudre VIII, 322

(- chlorotica Jord.) VIII, 369 (- curtipes Jord.) VIII, 370 (- elongata Rosen) VIII, 369 - erratica Jord.) VIII, 369

(- furcipila Rosen) VIII, 370 (— glabrescens Jord.) VIII, 369 (— glaucina Rosen) VIII, 369 (— maiuscula Jord.) VIII, 369

- f. hercynica Hermann VIII, 349 — medioxima Jord.) VIII, 369

- oblongata Rosen) VIII, 369 - occidentalis Jord.) VIII, 370 ( - procerula Jord.) VIII, 369

- psilocarpa Jord.) VIII, 369 rigidula Jord.) VIII, 370

(— scabra Rosen) VIII, 369 (— spathulifolia Jord.) VIII, 369 (- stenocarpa Jord.) VIII, 369

(- subtilis Jord.) VIII, 369 (- tenuis Jord.) VIII, 369

(- verna y glabrescens Hausskn.) VIII, 369

(-- var. maiuscula Hausskn.) VIII, 370

(— — β stenocarpa Hausskn.) VIII, 369

(- - β typica Beck) VIII, 370 (- violacea Rosen) VIII, 369 (- vivariensis Jord.) VIII, 369

(- vulgaris DC.) VIII, 369

(- - β typica Beck.) VIII, 369 Eruca glabrescens Jord. var. valverdensis Pit. IX, 207

Erucastrum erucoides (DC.) V. Cal. VIII, 544

— fruticulosum (Cyr.) V. Cal. VIII, 544 - Gravinae (Ten.) V. Cal. VIII, 544 - palustre (Pir.) V. Cal. VIII, 544

- procumbens (Pir.) V. Cal. VIII, 544
- repandum (DC.) V. Cal. VIII, 544
- virgatum Presl) VIII, 544

\*Eryngium Balansae Wolff VII, 274

- Bocconi Loj. Poj. VI, 35 \*- Boissieranum Wolff VII, 275

\* - Buchtienii Wolff VI, 24

\*- commutatum Wolff VIII, 306 \*- costaricense Wolff VII, 278

- creticum Lam. f. roseum Teyber IX, 334

Erythraea pulchella var. Meyeri (Bge.) ×Eryngium dalmaticum (E. amethysticum Kusn. f. pumila Kusn IX, 260 L. × E. creticum Lam.) Teyb. IX, 333 \*— Langlassei Wolff IX, 417 — — var. pulchella (Fr.) Griseb. f. \*- Ekmanii Wolff VIII, 414 pumila Kusn. IX, 259 \*- Endlichii Wolff VIII, 306 (- spicata [L.] Pers.) VIII, 257 (- tenuiflora Lk. et Hoffgg.) VIII, 257 (- uliginosa [W. K.] Wittr.) VIII, 257 eurycephalum Malme II, 153 \*- Harmsianum Wolff VIII, 415 X — heteracanthum (E. campestre L. X creticum Lam.) Teyb. VIII, 252 Erythrina flammea Herzog VII, 57 (Erythrococca oleracea D. Prain) X, 427 - horridum Malme II, 155 \*Erythrodes Lilyana Schltr. IX, 87 \*- leptophyllum Wolff VII, 278 Erythronium dens canis L. var. immacu-(Elatum Maly VI, 292 luzulaefolium Cham. et Schlechtd. var. longifolium Malme 152 ythropalum scandens Bl. var. abbre- megapotamicum Malme II, 154 Erviatum Hochr. V, 348 \*- Moritzii Wolff VII, 277 rythropyxis scandens Pierre) V, 120 -- Painteri Hemsl. et Rose Erythrospermum Wichmanni Val. V, gigantophyllum Wolff VIII, 307 385; IX, 310 - pristis Cham. et Schlechtd. var. (Erythroxylum acuminatum Walp.) VII, 16 mitigatum Malme II, 156 - ecarinatum Hochr. VII, 16 – Regnellii Malme II, 151 \*- Herzogii O. E. Schulz VII, 57 \*- Seleri Wolff VII, 275 (— lucidum Moon) VII, 16 — Moonii Hochr. VII, 16 \*— pachyneurum O. E. Sch. VI, 352 - siculum Loj. Poj. VI, 36 (- tricuspidatum Guss) VI, 35  $\times$  — Visianii (E. amethystinum L×E. - scandens Bl. var. abbreviatum campestre L.) Teyb. IX, 334 Hochr. VII. 9 (Erysimum alliaceum Salisb.) VIII, 321 - suave O. E. Sch. var. compactum (- Alliaria L.) VIII, 321 (Rose) O. E. Sch. IX, 355 - australe Gay var. Baldaccii Pamp. - verruculosum O. E. Sch. IX, 140 VIII, 350 Eschscholtzia arvensis Greene \*orthodichasialis Fedde III, 105 (- barbarea L.) VI, 172 -- Bernardina Greene var. \*coarctata (- Boryanum Bald.) VIII, 350 - cheiranthoides L. var. \*flexuosum Fedde III, 183 californica Cham. var. \*luxurians Rohl. I, 11 Fedde III, 27 — β umbrosum Choroschkov VIII, \* - caruifolia Greene var. \*cyathifera 226 Fedde II, 147 – cuspidatum M. B. f. pumilum \*- chartacea Fedde III, 105 Pamp. VIII, 351 Benth. var. \*sanctarum — crocea - erysimoides (L.) Fritsch VIII, 257 (Greene) Fedde II, 147 (- officinale L) VIII, 544 \* delitescens Fedde III, 185 (- pannonicum Cr.) VIII, 257 flaccida Fedde I, 16 - repandum L. var. (?) gracilipes floribunda Greene var. \*gracillima Thell. V, 364 Fedde III, 105 (Erythraea capitata Willd.) VIII, 437 – formosa Greene var. \*urocalyx Fedde III, 184 - centaurium Pers.) VIII, 14 \*- Chaneti Lévl. VIII, 280 \* - gigas Fedde III, 28 - curvistaminea Wittr. VIII, 14 \* graminea Fedde II, 146 (- Douglasii A. Gr.) VIII, 14 -- granulata Greene var. \*minuscula – exaltata Cov.) VIII, 14 Fedde II, 147 \*- lomae Gilg II, 34 Helleriana Greene var. \*Tilingii (- maritima [Willd.] Pers.) VIII, 257 Fedde III, 27 (- Meyeri Bge.) IX, 260 -- Menziesiana Greene var. \*coarc-(- Muehlenbergii Griseb.) VIII, 14 tata Fedde II, 148 - pulchella Koch) IX, 259 — — var. \*nesiaca Fedde II, 148 - pulchella Neilr.) IX, 260 — micrantha Greene var. \*fusigemmata (-- var. albiflora Ledeb.) IX, 260 Fedde III, 184 (-- var. Meyeri [Bge.] Garke) IX, \*-- multicaulis Fedde II, 145 260

(— ramosissima M. B.) IX, 260

– var. albiflora Boiss.) IX, 260

— var. Meyeri (Bge.) Kusn. IX, 260

( - - var. altaica Griseb.) IX, 260

\*- nevadensis Fedde II, 146

\*- pseudoinflata Fedde III, 75

- pseudopraecox Fedde I, 16

\*- pseudalcicornis Fedde III, 184

Eschscholtzia ramosa Greene var. \*trichophylla (Greene) Fedde II, 147 - revoluta Greene III, 76

— — var. \*caudatocalyx Fedde III,

(- sanctarum Greene) II, 147

- scapifera Fedde I, 16

 scariosa Greene var. \*dichasiophora Fedde III, 75

Setchellii Fedde III, 183
trichophylla Greene) II, 147
yainacensis Greene III, 27

— var. \*modocensis (Greene in Sched.) Fedde III, 28

Eschweilera calyculata Pitt. VIII, 473

- Collinsii Pitt. VIII, 473

\*Esenbeckia densiflora (Chod. et Hassl.) Hassl. X, 344

(- febrifuga A. Juss. var. densiflora Chod. et Hassl.) X, 344

– var. \*fruticosa Hassl. X, 345
Esmeralda Cathearthii Rehb. f. X, 197
– Clarkei Rehb. f. X, 197

Espeletia corymbosa Humb. et Bonpl. var. foliosa E. Duse I, 176

\*Esquirolia Lévl. nov. gen. X, 441 \*— sinensis Lévl. X, 441

Esterhazya splendida Mik. f. fruticulosa Dus. VII, 224

Eucalyptus amygdalina Lab. var. numerosa Maiden V, 51

(- - var. radiata Benth.) V, 51

Andrewsii Maiden V, 49
Banksii Maiden V, 52

- Caleyi Maiden V, 145

carnea R. T. Bak. V, 186Consideniana Maiden V, 50; IX, 574

Deanei Maiden V, 49Dunnii Maiden V, 144

- Moorei Maiden et Cambage V, 143

numerosa Maiden V, 51
Rudderi Maiden V, 53

(- saligna Sm. var. parviflora Deane et Maiden) V, 49
- scoparia Maiden V, 52

scoparia Maiden V, 52Seeana Maiden V, 48

- stannariensis Bail. IX, 546

(- stellulata Sieb. var. angustifolia Benth.) V, 143

- Stoneana Bail. IX, 547

(- tereticornis Sm. var. linearis Baker et Smith) V, 48

- Thozetiana R. T. Bak. V, 186

(— umbra R. T. Bak.) V, 186 (Eucephalus glaucescens Greene) VIII, 271

glaucophyllus Piper VIII, 271
(Eugenia edulis Vell.) VIII, 488
Esquirolii Lévl. IX, 459

(- Simmondsiae Bail, IX, 548 (- skiophila Duth.) IV, 235

\* - ugni Hook. et Arn.) IV, 137

(Euklisia crassifolia Rydb.) IX, 482

(Eulophia celebica Bl.) X, 71 - Flanaganii Bolus IV, 201 - Lujae De Wild, III, 163

— maccorhiza Bl. var. \*Minahassae Schltr. X, 70

paniculata Rolfe IV, 172papuana Bail. VIII, 80

squalida Ldl. var. \*celebica (Bl.)
 Schltr. X, 71

— undulata Rolfe IV, 173

Eumorphia Davyi Bolus VII, 129

— prostrata Bolus VII, 129

(Eunanus Cusickii Greene) VIII, 268 (- Douglasii Benth.) VIII, 268

(Eupatorium argutum H. B. K. IV, 149 (— aromatisans Millsp.) IV, 151

(— atromontanum Nels.) IV, 154 (— Bruneri Gray) IV, 154

- chrysostylum Robs. I, 40

cremastrum B. L. Rob. IV, 150Cursonii B. L. Rob. IV, 150

(— dasycarpum Gr.) IV, 154 (— fruticosum Mill.) IV, 154

(— gracilicaule Sch. Bip.) IV, 151 — hemipteropodium B. L. Rob. IV, 151

Holwayanum B. L. Rob. IV, 152
Houstonianum L.) IV, 154
Houstonis L.) IV, 154

leucoderme Robs. 1, 40
Lozanoanum Robs. 1, 41
Michelianum Robs. 1, 42

nubigenoides B. L. Rob. IV, 153
Palmeri Gray var. tonsum Rob. IV, 153

(- paniculatum Mill.) IV, 154

- pelotrophum B. L. Rob. IV, 153

— petraeum Robs. I, 41

(- populifolium Millsp.) IV, 151

prasiifolium (Gris.) Hieron. var.
glanduliferum R. E. Fr. III, 295
purpureum L. var. Bruneri (Gray)

L. B. Rob. IV, 154

(- quadrangulare Millsp. non DC.)
1V, 151

(— quinquesetum Benth.) IV, 149 — Raffillii Hemsl. VII, 117

- rapunculoides B. L. Rob. IV, 154

(— Rebaudianum Bert.) V, 264
(— rigidum Benth.) IV, 155
(— Rydbergi Britt.) IV, 154

- sagittatum Gray var. deltophyllum

B. L. Rob. IV, 154

— solidaginoides H. B. K. var. Bonplandianum (Sch. Bin.) B. L. Rob.

plandianum (Sch. Bip.) B. L. Rob. IV, 146

- Tashiroi Hay. 1, 21

- tenue R. E. Fr. III, 239

Vauthierianum DC, var. glandulosum
 Dus. VII, 263

( — Verae-Crucis Steud.) IV, 154 Euphorbia aggregata Berger VIII, 88

92 Euphorbia Bracei Millsp. VII, 281 Brittonii Millsp. VII, 281 candelabrum Trém. var. Erythraeae Berg. VIII, 87 (- capitulata Rchb.) IV, 287 - carniolica var. ambigua (W. K.) Maly VII, 185 – var. varbossiana Maly VI, 292 - carnosa O. Paulsen IV, 45 Chamaesyce L. var. villosa Reyn. VIII, 213 Cooperi N. E. Br. VIII, 88 crassipes Marl. IX, 568 – dalmatica Vis. var. isophylla Maly VII, 185 Dinteri A. Berger III, 143 - Dominii Rohl. I, 37 (- drupifera Thom.) V, 271 \*- Duclouxii Lévl. et Vant. VI, 113 dulcis L. b. longeradiata VIII, 255 – ebracteolata Hay. I, 58 - echinulata Radik. VIII, 189 - elastica Jum. VII, 391 (- enneagona Berg.) VIII, 88 enopla Boiss, var. dentata Berg. VIII, 89 esculenta Marl. IX, 568 \*- Fauriei Lévl. et Vant. V, 281 \*- - var. filiformis Lévl. V, Franckiana Berger VIII, 87
Gilberti Berger VIII, 84 helioscopia L. var. Corazei Léveillé III, 208 Hillebrandii Lévl. X, 151 (- hyssopifolia L.) III, 270 impervia Berger VIII, 85 - Kischenensis Vierh. VII, 160 lecheoides Millsp. VII, 282 - Ledienii Berger VIII, 88 - lignosa Marl. IX, 567 (- lucidissima Lévl. et Vant.) IX, 446 (- microphylla Schweinf.) VII, 160 - Morinii Berger VIII, 89 - multiceps A. Berg. III, 128 - multiformis Hook, et Arn. var. \*microphylla Lévl. X, 151 namibensis Marl. IX, 567
natalensis Hort.) VIII, 86

neutra Berger VIII, 86

 Pirahazo Jum. VII, 390 - pseudocactus Berger VIII, 87

- pteroneura Berger VIII, 84

- pubescens Vahl var. 4. laevis Mer.

\*- octoradiata Lévl. et Vant. V, 281

Vand. IX, 534

E. Fr. IV, 20

VIII, 288

 Rockii Ch. N. Forbes IX, 571 \*- Rossiana Pax VIII, 162 Schoenlandii Pax I, 59
setosa Radlk. VIII, 190
similis Berger VIII, 86 - Stapfii Berger VIII, 85 (- Stuhlmannii Schweinf.) VIII, 85 \*- Takouensis Lévl, et Vant. V, 281 \*- Taqueti Lévl. et Vant. V, 281 (- tetragona Beck) VIII, 84 – togakusensis Hayata I, 58 - villosa W. K. var. verrucosa Maly VII, 185 \*Euphorbiopsis Lévl. nov. gen. IX, 446 \*- lucidissima Lévl. IX, 446 Euphrasia alpina Lam. var. breviaristata É. Steiger IV, 69 - - var. calvescens Chab. Ill, 208 - minima × picta F. Vollm. I, 20 - nemorosa f. \*glandulosa Abrom. VII, 106 - f. hispidula E. Steiger IV, 69 - praecurta W. Chitrowo IV, 10 stricta Host f. angustifolia Gugler VII, 45 \*Eurya Cavaleriei Lévl. IX, 450 \*- inaequalifolia Lingelsh. VII, 111 Euryops Galpinii Bolus VII, 131 Gilfillanii Bolus VII, 130 Eustephiopsis R. E. Fr. nov. gen. IV, 40 - latifolia R. E. Fr. IV, 42 - speciosa R. E. Fr. IV, 41 \*Eutrema Potanini Kom. IX, 394 Eutriana mucronata Aresch. X, 300 Euxena V. Cal. nov. gen. IX, 47, 395 — cebennensis V. Cal. IX, 48, 395 (Evelyna maculata Lindl.) VI, 18 Evodia batjanica Val. VII, 10 \*- odorata Lévl. IX, 458 Evolvulus aurigenius Mart. var. \*macroblepharis (Mart.) Hassl. IX, 197 – var. \*viscidulus Hassl. IX, (- macroblepharis Mart.) IX, 197 - squamosus N. L. Britt. V \*Evonymus coreanus Lévl. VIII, 284 latifolia Scop. var. planipes Köhne) VI, 337 planipes Köhne VI, 337
Miyakei Hayata VI, 194 oblongata Grsb. var. villosissima \*- semiexserta Koehne VIII, 54 - uniflorus Lévl. et Vant. VI, 374 Exochorda Giraldii Hesse VIII, 347 ovalifolia Engelm. var. dentata R. Exolobus albomarginatus Pitt. VIII, 531 Exomicrum grandifolium v. Tiegh. VI, 11 \*- Peplus L. var. \*bracteosa Dom. l, 15 (- pilosa L.?) VII, 185 F. Fagara nigrescens Fries VI, 205 \*- Weberbaueri Krause II, 26

Felicia amelloides (L) O. Hoffm. VI, 369

- Bergeriana (Spr.) O. Hoffm. VI, 369

Euphorbia pulvinata Marl. IX, 567 (- Renouardi Pax) V, 271

Felicia Dregei DC. var. incisa O. Hoffm. III, 256, VI, 369 — elongata (Thunbg.) O. Hoffm. VI,

- Flanaganii Bolus IV, 196 - maritima Bolus IV, 196

– serrulata (Harv.) Ó. Hoffin. VI, 369 \*Ferdinandusa Paxii H. Winkl VII, 249 (Ferula paucijuga DC) IX, 142

Ferulago confusa Vel. var. longicarpa Vel. I, 133

Festuca alpina Sut. f. puberula Hack. VII. 188

\*- Buchtienii Hack. VI, 160 calchaquiensis Hack. IV, 346 (- capillaris Liljebl.) 1X, 141 - Elliotii Hack. II, 70

(- eu-rubra var. fallax Hack) VI, 354 (- Gaudiniana Guss.) V, 142

- gelida Chiov. VI, 180

\*x - hercynica (F. rubra x pratensis) Wein VI, 354

- Merinoi C. Pau III, 324

\*x- Osswaldii (F. ovina x heterophylla) Wein VII, 18

 ovina var. argaea Hack. VI. 152 \*- - subsp. \*Bornmülleri Hack. II, 71 var. pseudo-varia Volk. II, 148 – subsp. transtagana Hack. III, 29 - pratensis Huds. var. apennina (De

Not.) Hack. f. parviflora Hack. VII, 43 proxima R. E. Fr. IV, 93

\*X- pseudofallax (F. ovina X pratensis) Wein VI, 353

 rubra L. var. longearistata Hack. 111. 141

- rupicaprina Hack. form. major Schröt. III, 234

- uninodis Hack. IV, 347

 varia Haenke var. glauca Brockm.-Jerosch V, 156 - violacea var. cappadocica Hack.

VI, 152

\*×- wippraensis (F. heterophylla × pratensis) Wein VI, 354

\*X - Zobelii  $(F. ovina \times rubra)$ Wein VII, 19

Ficinia distans C. B. Cl. III, 162 - mucronata C. B. Cl. III. 162

\*Ficus acanthocarpa Lévl. et Vant. IV, 65

- afghanistanica Warb. I, 19 \*- aphanoneura Warb. I, 80

- asymetrica Lévl. et Vant. IV, 82

Bodinieri Lévl. et Vant. IV, 83
Blinii Lévl. et Vant. VIII, 550 - Bonatii Lévl. VI, 112

botryoides Lévi. et Vant. IV, 83

\*- Cairnsii Warb. I, 73 cantoniensis Lévl. IV, 83

- Cavaleriei Lévl. et Vant. IV, 83 Chaffanjoni Lévl. et Vant. IV, 83

\*- chlorosykon Rech. VII, 17

Ficus corymbifera Lévl. et Vant. IV, 83 - cuneata Lévl. et Vant. IV, 84

– var. congesta Lévl. et Vant. IV, 84

- Cyanus Lévl. et Vant. IV, 84

- var. viridescens Lévl. et Vant. IV. 84

\*- cylindria Warb. I, 72 \* Dielsii Warb. l, 75

- Duclouxi Lévl. et Vant. IV, 84 (— edulis Bur. var. y leiocarpa Bur.) I. 81

 Esquiroli Lévl. et Vant. IV, 84 \* Fauriei Lévl. et Vant. V, 281

\*- fecundissima Lévl. et Vant. IX, 19

\* -- Feddei Lévl. et Vant. IX, 19 \*- Fortunati Lévl. et Vant. IV, 66

\* - hederifolia Lévl. IX, 323 - hirtaeformis Lévl. et Vant. IV, 84

(- Hügelii Kth. et Bouch.) 1, 73 \*- hypoleucogramma Lévl. et Vant.

\*- inaequibractea Warb. I, 80 \*- Jamini Lévl. et Vant. VIII, 550

- Johnstonii Stapf V, 355 \*- kouytchense Lévi. et Vant. IV, 65 - Krishnae C. DC. IV, 168

 laceratifolia Lévl. et Vant. IV, 85 lageniformis Lévl. et Vant. 1V, 85 \* - leiocarpa (Bureau) Warb. I, 81

\*- Letaqui Lévl et Vant. VIII, 550 - longepedata Lévl. et Vant. IV, 85

\*- longipes Warb. I, 78

- macrocarpa Lévl. et Vant. IV, 85 (- macrophylla Desf) 1, 73

\* - macropodocarpa Lévi.et Vant IV, 66

( - magnolioïdes Borzi) 1, 73 – malvastrifolia Warb. 1, 19 - Martini Lévl. et Vant. IV, 85 \*— Michelii Lévl. VIII, 61

\*- Nerium Lévl. et Vant. IV, 66 \* - orthoneura Lévl. et Vant. IV, 66

\*- Ouangliense Lévl. IV, 66 \*- pallidinervis Warb. I, 79

\*- pinfaënsis Lévl. et Vant. IV, 85 - Porteri Lévl. et Vant. VIII, 550

\*- Pritzelii Warb. I, 74 \*- prolixoides Warb. I, 79

\*- pseudobotryoides Lévl. et Vant. VI, 67

\*- pseudo-piriformis Lévl. et Vant. V, 282

\*- punctulosa Warb. I, 81

\*- retusiformis Lévl. VIII, 549 - rhomboidalis Lévl. et Vant. IV, 86

- rufipes Lévl. et Vant. IV, 86 \*- salix Lévl. et Vant. IV, 66

\*- sambucixylon Lévl. IX, 444 \*- Schinzii Lévl. et Vant. VIII, 550

\*- semecarpifolia Warb. I, 81

\*- setistyla Warb. I, 77 \* - Stapfii Lévl. IX, 325

et Barr. IX, 351

(Frankenia pallida Coss.) IX, 351 \*Ficus stephanocarpa Warb. 1, 75 \*- suberosa Lévl. et Vant. VIII, 549 (-- revoluta Forsk.) IX, 351 Frantzia Pitt. nov. gen. VIII, 536

— montana Pitt. VIII, 536 \*- subinflata Warb. I. 76 \*- Taqueti Lévl. et Vant. V, 282 - Pittieri (Cogn.) Pitt. VIII, 537 \*- Tenii Lévl VI, 112 \*- trichostyla Warb. I, 77 - var. quinqueloba (Cogn.) Pitt. \*- Upoluensis Rech. VII, 18 VIII, 538 Fraxinus excelsior L. var. heterocarpa \*- Vanioti Lévl. VII, 258 C. Bertr. VIII, 445 \*- vitifolia Warb. I, 20 \*- Whytei Stapf V, 354 \*- Fauriei Lévl. VIII, 285 - holotricha Köhne VI, 338 (Fieldia lissochiloides Gaud.) X, 196 \*- Kotschyi C. K. Schn. X, 163 × Filago Costei (F. apiculata × spathu-(Frenela arenosa A. Cunn.) IX, 127 lata) Revol. IX, 571 (- columellaris F. v. M.) IX, 127 (- microcarpa A. Cunn.) IX, 127 germanica L. e. monocephala Terr. V, 138 – d. pumila Terr. V, 138 (- Moorei Parl.) IX, 127 (- rhomboidea R. Br. var. tasmanica Fimbristylis dichotoma Vahl f. gracilis Goir. IX, 394 Benth.) IX, 127 (- robusta A. Cunn. var. microcarpa fuscoides (C, B, Cl.) C. H. Ostenf. Benth.) IX, 127 II, 128 (Fritillaria Boissieri Costa) IV, 212 Firmiana simplex (L.) W. F. Wight VIII, (- hispanica B. et R.) IV, 212 488 - Junellii Nels, V, 216 (Flacourtia amara Spanoghe) IX, 407 (- lusitanica Wickstr.) IV, 212 \*- Cavaleriei Lévl. IX, 457 ( - meleagris Costa) IV. 212 (Flaveria peruviana (Juss.) Gmel.) IV, (- meleagris Brot.) IV, 212 (- messanensis Boiss.) IV, 212 (- spicata J. E. Sm.) IV, 145 Fleischmannia arguta B. L. Rob. IV, 149 (- messanensis Raf. var. hispanica – Langlassei Robs. I, 39 Amo) IV. 212 Michailowskyi Fom. VI, 34 (- rhodostyla Sch. Bip.) IV, 149 (- montana Loscos et Pardo) IV, 212 \*Floscopa bambusifolia Lévl. IX, 20 (- pyrenaica Webb) IV, 212 Cavaleriei Lévl. et Vant. IV, 114 Flourensia ilicifolia Brandegee III. 379 - pyrenaica L. IV, 212 Fluggea novoguineensis Th. Val. V, – β Boissieri (Costa) Pan IV, 212 Folotsia Cost. et Bois nov. gen. IX, 535 - α genuina Pau IV, 212 - sarcostemmoides Cost. et Bois IX,  $--\gamma$  hispanica (Boiss, et Reuter) 535 Pau IV, 212 × Forsythia densiflora (F. suspensa - - f. albarracinensis Pau) IV, Sieboldii × viridissima) K. IV, 166 212 – Giraldiana Lingelsh, VIII, 92 – – d lusitanica (Wickstr.) Pau IV, (- intermedia densiflora Köhne) IV, 166 (- intermedia vitellina K. IV, 165) × - spectabilis (F. suspensa Fortunei  $--\epsilon$  Senneneliasii Pau IV, 212 × viridissima) Köhne IV, 165, 166 (- stenophylla Boiss. et Reut.) IV, 212 - suspensa Vahl var. Fortunei (Lindl.) \*Fuchsia asperifolia Krause I, 172 Rehder IV, 164 \* - dolichantha Krause I, 172 \*— leptopoda Krause I, 171 \*— scandens Krause I, 171 – – f. aures-variegata h. Barbier IV, 165 - - f. decipiens Köhne IV, 164 \*- siphonantha Krause I, 173 — — f. pallida Koehne IV, 165 \*— tacsoniiflora Krause I, 172 - - f. typica Koehne IV, 164 \*-- tuberosa Krause I, 170 ×- vitellina Köhne IV, 165 \*- Weberbaueri Krause I, 170 Fuirena ciliata Bush V, 256
— cylindrica Bush V, 256
Fumana laevipes × thymifolia Pau \*Fouquiera Jaboncillo Loes. IX, 356 splendens Engelm. f. β \*micrantha Loes. IX, 357 Fragaria latiuscula Greene IV, 208 VI, 382 Fumaria Bastardi Bor. var. γ vagans – retrorsa Gr. IV, 208 Frankenia Clarenii R. E. Fr. III, 162 (Jord.) Dur. et Barr. IX, 349 drepanensis Loj. Poj. III, 332 (— hirsuta var. revoluta Boiss.) IX, 351 (— laevis Coss.) IX, 351 (- Gussonii Rouy et Fouc.) IX, 349 (- media Ball) VII, 95 – var. γ revoluta (Forsk.) Dur.

muralis Sond. var. curta Pau VII, 95

(Fumaria muralis f. Gussonii Rouy et Fouc.) IX, 349 (- peregrina Rud.) IX, 238 — pia Nic. VII, 336 (— vagans Jord.) IX, 349 Funkia Argyi Lévl. III, 370 \*- Legendrei Lévl. VII, 339 - subcordata Spreng. var. Taquetii Lévl. IX, 322 G. \*Gagea aleppoana Pasch. II, 166 Argyi Lévl. III, 371 \*- Bornmülleriana Pasch. I, 194 \*— Callieri Pasch II, 166 \*— coreana Lévl. VIII, 360 \*— Fedtschenkoana Pasch. I, 190 filiformis var. \*Regeliana Pasch. 1, 191 fistulosa (Ram.) Ker-Gawler var. glabra Dalla Torre et Sarnth. III, 142 \*— granulosa var. \*elatior Pasch. I, 193 hypoxioides Lévl. III, 371 \*— indica Pasch. II, 111 \*— intercedens Pasch. I, 192 \*— japonica Pasch. Il, 57 \*— Ianosa Pasch. II, 166 \*— Iowariensis Pasch. II, 111 lusitanica Terrac. II, 117 - micrantha var. \*libanotica Pasch. 1. 191 Olgae var. \*Chomutowae Pasch. I, 194; II, 68 - persica var. \*praecedens Pasch. II, 68 \*— platyphyllos Pasch. II, 67 (— praecedens Pasch.) II, 68 \*- provisa Pasch. I, 195 \*- pseudorubescens Pasch. II, 67 \*- setifolia var. \*Aitchisoniana Pasch. \*\_ stipitata var. \*Merklini Pasch. II, 68 \*— taurica var. \*conjungens Pasch II, 68 — tenuis Terrac. Il, 177 \*— Terraccianoana Pasch. II, 58 \*— turkestanica Pasch. II, 67 \*— vaginata Pasch, II, 58 \*- Velenovskyana Pásch. II, 166 \*Gaimardia boliviana Pax V, 225 (Galactia acapulcensis Rose) V, 109 (- brachystachys Benth.) V, 109 - camporum T. A. Spr. II, 126 glaucescens H. B. K. var. macrocarpa Hassl. VIII, 204 grewiaefolia Taub. var. \*mucronulata Hassl. VIII, 128 (— Hassleriana Ćhod.) VIII, 127 - macrophylla Taub. var. \*ovalifolia Hassl. VIII, 126 (— multiflora Rob.) V, 109 - rugosa Chod. et Hassl. var. β \*genuina (Benth.) Hassl. VIII, 205

Galactia rugosa var. ∂\*guaranitica Hassl. — — f. \*angustifolia Hassl. VIII.206 — — — subf. \*erecta Hassl. VIII, 206 — — f. \*rupestris Hassl. VIII, 206 — — f. \*vulgaris Hassl. VIII, 206 — — — subforma \*latifolia Hassl. VIII, 206 — var. γ \*intermedia Hassl. VIII, 205 — — f. \*longifolia Hassl. VIII, 205 — — f. \*ovalifolia Hassl. VIII, 205 — var. \*sericea Hassl. VIII, 128 — — f. transiens Hassl. VIII, 205 scarlatina Taub. var. \*brevibracteolata Hassl. VIII, 206 — — f. \*ruficalyx Hassl. VIII, 207 — — f. \*sericicalyx Hassl, VIII, 206 — — f. \*villicalyx Hassl. VIII, 206 - speciosa Britt. var. \*acutisepala Hassl. VIII, 126 — — f. \*argentina (Gris.) Hassl. VIII, 126 — — f. paraguariensis Hassl. VIII, 127 — stenophylla H et A. var. \*genuina (H. et A.) Hassl. VIII, 127 - - var. \*Hassleriana (Chod.) Hassl. VIII, 127 — var. \*intermedia Hassl. VIII, 127 — var. \*virgata (Benth.) Hassl. VIII, 127 — — f. \*albiflora Hassl. VIII, 127 — — f. \*roseiflora Hassl. VIII, 128 (- Wrightii A. Gray) V, 109 Galactites tomentosa Moench var. albiflora Conill VIII, 33 - — var. microcephala Mer. VM, 286 Galanthus Imperati Bert. f. australis Zodda IX, 395 (Galatella Meyendorffii Rgl. et Maack) V, 274 \*Galeandra camptoceras Schitr. VIII, 454 \*Galeola Minahassae Schltr. X, 6 (Galeopsis hirsuta L.) X, 290 - intermedia Vill. var. rubens Mer. VII, 366 — Ladanum L. var. insignis B. Koso-Poljansky X, 319 - Sallentii Cad. et Pau VII, 178 (Galera Rolfei Hay.) X, 5 Galium aparine L. var. Vaillantii DC. f. fallax Gross III, 207 arenarium Lois, var. ellipticum Eug. Simon VIII, 213; IX, 140 - boreale F. var. angustum Opiz II, 96 — form. humidiusculum C. G. Westerld. IV, 15 - — form. latifolium W. et G. subf. hirtoscabrum C. G. Westerld. IV, 16  $(---\beta)$  pseudo-rubioides Schur) VIII, Galium boreale var. turfosum Vollm. 11, 96

\* Cavaleriei Lèvl. X, 438

\*- depauperatum Schuster II, 96

\*— Dieckii Bornm. IV, 267 (— hispidulum Michx.) IX, 398 (— intercedens H. Lindb.) VIII, 32

 kamtschaticumvar.oreganum (Britt.) Piper VIII, 268

x- Lindbergii (G. Mollugo x ruthe-

nicum) Giraud. VIII, 32

(- mollugo L. subsp. praticola [Rchb.] × praecox [Láng] F. Schultz) 11, 96 - multiflorum subsp. puberulum Piper VIII, 268

- nevadense B. et R. var. vestitum Pau VIII, 134

(- oreganum Britton) VIII, 268

– palustre L.  $\beta$  maximum (Moris) H. Br. var. tenerifrons Choroschkov VIII, 227

– parisiene L. var. australe A. J. Ewart VIII, 411

purpureum L. var. trichanthum Vandas IX, 527

(- pusillum Webb) VIII, 134

- rubioides L. β leiocarpum Choroschkov VIII, 237

— α trichocarpum Chor. VIII, 227

— rubrum S.  $\beta$  pseudoobliquum H. Braun c. subrubidum Wilcz. et Vacc. VIII, 332

saurense Litw. IX, 557

\*- Taquetii Lévl. X, 438 - teres Mer. VIII, 63

\*- venosum Lévl. X, 438

 vernum Scop. var. 3. lasiopodon Mer. VIII, 63

- var. pseudocruciatum Rohl. 1, 36

Gamolepis intermedia Bolus VII, 151

Ganua nov. gen Pierre VIII, 318

— Beccarii Dub. IX, 395

— chrysocarpa Dub. IX, 335

coriacea Dub. IX, 336 - prolixa Dub. IX, 336

sarawakensis Dub. IX, 395

Garcinia asterandra Jum. et P. d. l. Bath. 1X, 571

- crassiflora J. et. P. B. IX, 570

(- malabarica Des.) VII, 16 - ochrocarpoides Jum. et P. d. l.

Bath. IX, 570

— Sereti De Wild. var. intermedia
De Wild. X, 429

— tinctoria (DC.) W. F. Wight. VIII, 488 - verrucosa Jum. et P. d. l. Bath. IX, 570

Gardenia cornuta Hemsl. V, 262 - papuana Bail. IX, 547

Garuga mollis Turcz. f. coriacea Hochr. VII. 12 Gastonia amplifolia (Bak.) Vigu. VI, 47

(- heptapleurum Baill.) VI, 47 \*Gastrodia celebica Schltr. X, 6 \*- zevlanica Schltr. III, 77 Gaura simulans Small III, 270

\*Gardenia Schlechteri Lévl. X, 146

\*Gaya meridionalis Hassi. VII, 72 pilosa K. Sch. var. \*microphylla Hassl. VIII, 40

- tarijensis R. E. Fr. IV, 106 Gazania linearifolia Bol. VII, 153

Geava Cost. et Poiss. nov. gen. IX, 537 - purpurea Cost. et Poiss. IX, 537

\*Geniostoma biserialis Rech. VI, 325

\* Fleischmannii Rech VII, 17 \* gracilis Rech VI, 325

Genista cordifolia Porta VIII, 482

- ephedroides DC. var. spartioides Loj.-Poj. V, 27

× – Fritschii (G. tinctoria L × germanica L.) Rech. IX, 139

– germanica var. insubrica R. Keller II, 150

- Jimenezi C. Pau III, 321

- mantica Poll. f. Chanousii Vacc. et Wilcz IX, 494

(- Oretana Webb) VI, 383 \* phrygia Bornm. III, 129

- tinctoria L, b acutifolia Bolz. VIII, 254

- valentina (Willd.) Pau VI, 383

virgata Ait. var. \*Teneriffae Burch. VIII, 551

Gentiana alpina Vill. var. caulescens R. Keller II, 151

(— amarella Trautv.) IX, 262

- angulosa M. B.) IX, 261 \*— anthosphaera Gilg II, 46

\*- arenarioides Gilg II, 39 (- aurea Stev.) IX, 261

( - - var. coerulescens Trautv.) IX, 262 - - var. coerulescens Wahlbg.) IX,

262

 var. glomerata Kusn. IX, 262 - - var. involucrata (Rottb.) Kusn. 1X, 262

— – var. sibirica Kusn IX, 262

 – var. umbellata (M. B.) Kusn. IX, 261, 262

\*- boliviana Pax VII, 243 - Bridgesii Gilg II, 34

\*- brunneo-tincta Gilg II, 37

\*- calcarea Gilg II, 42

(- caucasica Curt.) IX, 261 - M. B. var. Marcowiczi Kusn. IX, 261

( - centaurium L.) VIII. 14

- consobrina Schott et Ky.) IV, 262

\* - corallina Gilg II, 48

cruciata L. var. Owerini Kusn. IX, 261

Gentiana detonsà Rottb. var. tonsa Lun. VIII, 246 — dianthoides H. B. K. II, 50 \*- ericothamna Gilg II, 50 \*- erythrochrysea Gilg II, 38 exacoides Gilg II, 48 Fiebrigii Gilg II, 45 (- fimbriaeplica C. Koch) IX, 260 \* flavido-flammea Gilg II, 37 florida Gris. II, 46 formosana Hay. VI, 196 (- fruticulosa Domb. II, 49 gageoides Gilg II, 44
heptaphylla Balf. f. et Forr. VIII, 153 \*- Hesseliana Hoss. IX, 465 (- holosteoides Schott et Ky.) IX, 262 \*- hygrophiloides Gilg II, 40 \*- ignea Gilg II, 49 \*- Krauseana Gilg II, 45 \*- lavradioides Gilg II, 49 - Lawrencei Burk. IV, 175 - leptoclada Balf. f. et Forr. VIII, 132 \*— Iilacina Gilg II, 40 limoselloides H. B. K. II, 34 \* - lurido-violacea Gilg II, 37 \*- macroclada Gilg II, 47 (- Marcowiczi Kusn.) IX, 261 \*- mesembrianthemoides Gilg II, 41 - multicaulis (Don) Gilg II, 42 \*- muscoides Gilg II, 35 \*- myriantha Gilg II, 43 - nivalis L. b. reducta Bolz. IX, 187 var. 2. violacea E. Steiger IV, 69 norica A. et J. Kern. f. Anisiaca J. Nev. II, 142 - - f. pusilla J. Mayer II, 99 \*- odontosepala Gilg II, 48 \*- oreosilene Gilg II, 40 - ornata Wall, var. alba G. Forr, VIII, (- - var. obtusa Franch.) VIII, 385 \*- paludicola Gilg II, 42 - peruviana (Griseb.) Gilg II, 34 \*— petrophila Gilg II, 42 — pinifolia R. et P. II, 50 \*- porphyrantha Gilg II, 39 \*- prostrata Haenke II, 51 (- pseudo-amarella Stev. IX, 262 \*- pseuso crassula Gilg II, 44 \*- pseudolycopodium Gilg II, 38 (- pulchella Sw.) IX, 259 \*- roseo-lilacina Gilg II, 35 \*- sanctorum Gilg II, 44 \*- sandiensis Gilg II, 36 – scariosa Balf. f. et Forr. VIII, 154 \*- scarlatina Gilg II, 36 — sedifolia H. B. K. II, 51 (- septemfida C. A. M.) IX, 260 -- - Pall. var. adscendens Kusn. IX,

 – var. erecta Kusn. IX, 260 (-- var. genuina Kusn.) IX, 260 Gentiana septemfida var. lagodechiana Kusn. IX, 261 – – var. pauciflora Kusn. IX, 260 ( — var. procumbens Akinf.) IX, 261 ( — — f. angustifolia Kusn.) IX, 261 ( — — f. latifolia Kusn.) IX, 261 - silenoides Gilg II, 44 - speciosissima Gilg II, 48 - Stuebelii Gilg II, 43 - taliense Balf. fil. et G. Forr. VIII, \*— thiosphaera Gilg II, 43 - Trailliana G. Forr. VIII, 152 \*- tristicha Gilg II, 46 tubulosa [Griseb.] Gilg II, 34
 umbellata Bge.) IX, 262 (- umbellata M. B.) IX, 262 (-- var. glomerata Rgl.) IX, 262 - umbellata R. et P. II, 48 - Veitchiorum Hemsl. VIII, 385 verna L. var. angulosa (M. B.)Kusn. IX, 261 – var. brachyphylloides Pau IX, 192 \* - Weberbaueri Gilg II, 51 Gentilia Beille nov. gen. VIII, 319 (Geodorum fucatum Krzl.) IX, 101 \*— tricarinatum Schltr. IX, 101 Geopanax W. B. Hemsl. nov. gen. V, procumbens Hemsl. V. 268 (Georchis cordata Lindl.) VI, 41 (- foliosa Lindl.) VI, 41 (— subregularis Reichb. f.) VI, 43 (— vittata Lindl.) VI, 43 Geranium anemonaefolium l'Hér. var.  $\alpha$  major Pit. IX, 210 - - var.  $\beta$  minor Pit. IX, 210 - argenteum L. b. lucanum Terr. V, 136 (- austriacum Wiesb.) VIII, 436 bellim Rose VI, 252 collinum Steph. var. wakhanicum O. Pauls. IV, 45 - dissectum L. c. glutinosum Terr. - - b. villosum Terr. V, 137 eriophorum Lévl. VI, 374 (— ibericum  $\delta$  parviflorum Boiss.) X, 307  $(--\beta)$  platypetalum Boiss.) X, 306 jubatum Hdl-Mzt. X, 306 (?- Knollii Britt.) VIII, 436 \*- Kurdicum Bornm. VIII, 82 Lavergneanum Lévl. VI, 373 – var. cinerascens Lévl. Vl, 373 (- lividum L'Hér.) VIII, 436 - Lozani Rose VI, 253 - molle L. b. caespitosum Terr. V, — — var. grandiflorum Loj.-Poj. V, 26

98 (Geranium molle var. villosum Reichb. non Ten.) V, 26 palustre L. β trifidum Litw. VIII, 226 parviflorum Hdl.-Mzt. X, 307 \*- peregrinum Thell. IX. 549 phaeum L. subsp. A. austriacum Wiesb. VIII, 436  $(--\beta)$  lividum Koch) VIII, 436 - platyanthum Duth. IV, 364 - Pringlei Rose VI, 253. rotundifolium L. var. caespitulosum Loj.-Poj. V, 27 sanguineum L. α latipartitum Pet. VIII, 227 silvaticum B. parviflorum β eglandulosum Strobl VIII, 436 - L.  $\delta$  Stroblii Hay. VIII, 436 - - L. form. sublilacinum C. G. Westerld, IV, 18 Gerardia tarijensis R. E. Fr. IV, 205 (Geum ciliatum Pursh) VII, 215 - Fauriei Lévl. VIII, 281 \*- sachalinense Lévi. VIII, 281 (- triflorum Pursh) VII, 215 Gilia bicolor (Nutt.) Piper VIII, 15 (- gracilis var. glabella Suksd.) VIII, 15 (- grandiflora var. diffusa Mulf. VIII, 15 - humilis (Greene) Piper VIII, 15 - - var. glabella (Greene) Piper VIII, 15 - lithospermoides Brdg. III, 377 (- microsteris Piper) VIII, 15 - montana Nels. et Kdy. V, 287 (- tenella Benth.) VIII, 15 (Gilibertia protea (Champ.) Harms) VI, 46 Gilruthia Ewart nov. gen. IX, 65 - Osborni Ewart and White IX, 66 Gladiolus affinis De Wild. III, 165 - carmineus C. H. Wr. IV, 167 - morrumbalaensis De Wild. III, 162 Glaucium elegans F. et M. var. \*Born-mülleri Fedde III, 215 (- - f. leiocarpa Bornm.) III, 215 - grandiflorum Boiss. et Huet var. helissopelma Fedde I, 29 — var. \*malacocarpum (Hausskn.) Fedde III, 215 \*- Haussknechtii Bornm. et Fedde III, 215 (- malacocarpum Hausskn.) III, 215 \*Gleichenia Bradeorum Rosenst. X, 274 \* - Buchtienii Christ et Rosenst. V, 229 \*- candida Rosenst. V, 33 \*- hastulata Rosenst. X, 274 \*- nitidula Rosenst. X, 275 \*- yungensis Rosenst. V, 228 Globularia nana Lamk.  $\beta$  oscensis (Coincy) Pau VII, 86

(- oscensis Coincy) VII, 86

lanceolatum Hay. I, 43

Glochidium formosanum Hay. I, 56

V, 86 Glomera Reineckeana Schltr. IX, 96 (- samoensis Rolfe) IX, 96 \*Glossorhyncha celebica Schltr. X, 39 \*— Macdonaldii Schltr. III, 19 (Glyceria Canbyi Scribn.) VI, 74 (- capillaris C. J. Lindeb.) IX, 141 (- distans × maritima f. expansa Holmb.) IX, 142 (- - var. reptans Hartm.) VIII, 77 - fluitans R. Br. var. \*fallax K. Wein IX, 389 ( - latifolia Cotton) VI, 74 ( - maritima var. reptans (Hartm) Simm.) VIII, 77 (- - f. vilfoidea Gel.) VIII, 77 (- - [vilfoidea] Simm.) VIII, 77 \*- paupercula Holm III, 337 (- reptans Krok) VIII, 77 - vilfoidea Th. Fr.) VIII, 77 Glycosmis pentaphylla Correa var. angustata Hochr. VII, 10 Gnaphalium luteo-album L. var. minor F. M. Reader VII, 387 - - f. ramulosum Mer. VIII, 64 - Macounii Greene VI, 223 niitakayamense Hayata VI, 25 - proximum Greene VI, 224 Gnephosis Baracchiana A. J. Ewart and White VIII, 412 Gnidia Francisci Bol. VII, 157 - pulvinata Bol. IV, 200 Gochnatia Purpusi Brdg. III, 380 Godetia amoena Lilja var. albicaulis Jeps. VI, 104 — — f. Huntiana Jeps. VI, 104 – var. concolor Jeps. f. pygmaea Jeps. VI, 104 - var. Lindleyi Jeps. VI, 104 arcuata (Kell.) Jeps. VI, 106 - Blasdalei Jeps. VI, 105 Bottae Spach var. cylindrica Jeps. — — var. usitata Jeps. VI, 105 - caurina Abrams VIII, 12 deflexa Jeps. VI, 105 - Dudleyana Abrams f. Brandegeac Jeps. VI, 106 Goddardii Jeps. VI, 109 - var. Miguelita Jeps. VI, 109 Hansenii Jeps. VI, 107
hispidula Wats.) VI, 107 latifolia A. Nels, et P. B. Kdy. IV, 284 parviflora Jeps. VI, 107 - purpurea Don var. Elmeri Jeps. VI, 109 — var. lacunora Jeps. VI, 109 - var. procera Jeps. VI, 109 - quadrivulnera Spach var. apiculata Jeps. VI, 108

Glochidium umbratile Maiden et Betche

Godetia purpurea var. Davyi Jeps. VI, 108 — — f. flagellata Jeps. VI, 108 - - f. Setchelliana Jeps. VI, 108 — var. Hallii Jeps. VI, 108 — — var. rubrissima Jeps. VI, 108 - - var. vacensis Jeps. VI, 108 - sparsifolia Jeps. VI, 110 viminea Spach var. Congdonii Jeps. VI, 107 – var incerta Jeps. VI, 107 — var. Margaritae Jeps. VI, 107 Gomeza foliosa KI. et Reichb. f. var. brevifolia Cogn. VI, 63 \*Gomphostemma dentatum Muschl. IV, \*Gongronema Gaudichaudii Warb. III, 340 \* - Hemsleyana Warb. III, 341 Goniophlebium Pringlei Macon V, 253 Goniothalamus puncticulatus Boerl. et. Krds. X, 316 Gonocaryum fuscum Hochr. VII, 9 — fusciforme Hochr. VII, 9 melanocarpum Hochr. VII, 9 obovatum Hochr. VII, 9 - pyriforme Schefl. var. corrugatum Hochr. VII, 9 — var. planifolium Hochr. VII, 10 Gonolobus dubius Pitt. VIII, 480 magnifolius Pitt. VIII, 478
pseudobarbatus Pitt. VIII, 479 (- reflexus Hemsl.) VIII, 477 \*Goodyera amoena Schltr. X, 9 (- angustifolia Schltr.) VI, 41 \*- anomala Schltr. IX, 86 \*— Beccarii Schltr. IX, 25 (- biflora Hk. f.) VI, 41 (– biflora Krzl.) IX, 89 - brachiorrhynchos Schltr.) VI, 41 (- celebica Bl.) X, 9 (- cordata Nich.) VI, 41 (— discoidea Schltr.) VI, 41 - Erimae Schltr.) VI, 41 (- foliosa Benth.) VI, 41 - formosana Rolfe) VI, 41 (- fumata Thwait.) VI. 41 (- fusca Lindl.) VI, 41 - glanca Sm. V, 292 glauca J. J. Sm.) VI, 41 (- gracilis Hk. f) VI, 41 grandiflora Schltr.) VI, 41 grandis King u. Pantl.) VI, 41 hacijoensis Yat.) VI, 42 Hemsleyana King u. Pantl.) VI, 42
Henryi Rolfe) VI, 42 - hispida Lindí.) VI, 42 - lanceolata Ridl). VI, 42 Lehmanniana Krzl.) VI, 42 - macrantha Max.) VI, 42 macrophylla Lowe) VI, 42 Matsumurana Schltr.) VI, 42 (- Maurevertii Bl.) VI, 42

(Goodyera Menziesii Lindl.) VI, 79 - nebulara Rolfe) VI, 42 (- ochroleuca Bail.) VI, 42 papuana Ridl.) VI, 42
parviflora Bl.) VI, 42 - pendula Max.) VI, 42 - polygonoides Muell.) VI, 42 Prainii Hk. f.) VI, 42 - procera Hook.) VI, 42 - pubescens R. Br.) VI, 42 - pusilla Bl.) VI, 43 - recurva Lindl.) VI, 43 - repens Miq., non R. Br.) VI, 287 — var. ophioides Fern.) VI, 43 — reticulata Bl.) VI, 43 - robusta Hk, f.) VI, 43 (- rubicunda Lindl.) VI, 43 - - var. \*celebica (Bl.) Schltr. X, 9 (- Schlechtendahliana Reichb.f.) VI, 43 – f. similis (Bl.) Mak. VI, 287 (— scripta Schltr.) VI, 43 (— similis Bl.) VI, 287 - striata Reichb. f.) VI, 43 (- subregularis Schltr.) VI, 43 - tesselata Lodd.) VI, 43 - triandra Schltr.) VI, 43 (- velutina Max.) VI, 43 - viridiflora Bl. X, 9 (- viscosa Reichb. f) VI, 43 (- vittata Benth.) VI, 43 (- Waitziana Bl.) VI, 43 (- Waitziana Fleischm. et Rech.) IX. 86 (Gothofreda gracilis Morong) II, 107 \*Gouldia cirrhopetiolata Lèvl. X, 150 (Gourliea chilensis Gay) VIII, 489 - spinosa (Mol.) Skeels VIII, 489 \*Graffenrieda parviflora Cogn. VIII, 1 Grammangis stapeliiflora (Teysm. et Binnend.) Schltr. X, 191 Grammatophyllum scriptum \*Minahassae Schltr. X, 190 Gratiola officinalis var. latifolia Humbert peruviana L. var. \*pusilla Hassl. X, 348 Grevillea Berryana Ewart et White Grewia acuminata Juss, var. brevistipitata Hochr. V, 349 acuminata Juss. var. odorata Hochr. V, 349 - ceramensis (Boerl.) Hochr. VII, 15 \* - Chanetii Lèvl. X, 147 (Grindelia discoidea Nutt.) VIII, 270 - nana var, columbiana Piper VIII, (— — var. discoidea A. Gr. VIII, 270 Grisebachia Dregeana Benth. var. vestita A. Zahlbr. III, 255, VI, 367 - Pentheri A. Zahlbr. III, 254, VI, 367 Grumilea condensata Th. Val. V, 396 (Guadua paniculata Munro) VII, 374 \*- Weberbaueri Pilger I, 152

Guarea Gomma Pulle X, 288 \*- pendulispica C. DC. VII, 59 \*Guatteria boliviana H. Winkl, VII, 242 rigida R. E. Fr. II, 191 Gueldenstedtia Giraldii Harms f. elongata Pavol. IX, 317 (Guepinia Lepidium Desv.) X, 290 Guilandina ovalifolia (Urban) N. L. Br. VI, 245 Guilleminea gracilis R. E. Fr. IV, 35 Guioa microphylla Radlk. VIII, 196 Gunnera albocarpa (T. Kirk) Cock. VIII, 221 \*- Annae Schindler IX, 124 \*- Margaretae Schindler IX, 125 (- monoica Raoul var. albocarpa T. Kirk) VIII, 221 perpensa L. var. γ \*abyssinica Schindler IX, 125 Gurania pedata T. A. Spr. II, 140 \*- repandodentata Herzog VII, 69 Gutierrezia brachyris Macl. IV, 139 – var. patagonica (Speg.) Macl. IV, 139 — fulva J. Lun. IX, 403 \* - furfuracea Greene VII, 195 - Goldmanii Greene VII, 195 - Greenei J. Lun. IX, 403 - laricina Greene VII, 195 (- paniculata A. Gr.) IV, 139 \*Guzmania brevispatha Mez III, 45 (Gyas humilis Salisb.) X, 255 Gymnadenia Aschersonii M. Schulze III, 62 ×— Bornmülleri (S. nigra × rubra) D. T. et Saruth. III, 143

— conopea (L.) R. Br. f. subdensiflora C. G. Westerld. IV, 19 f. viridiflora L. Keller und H. Fleischm. VI, 32 f. unicuspis C. G. Westerld. IV, 19 ( — cylindrostachya Lindl.) V, 197 × - Facchinii (G. conopea × Orchis Iatifolia) D. T. et Sarnth. III, 143 (- gracilis Miq.) VIII, 107 Mitostigma (Blume) Mak. VIII, 107 (— pinguicola Bretschn.) VIII, 107 - rubra Wettst. var. stiriaca Rech. III. 334 (- tryphiaeformis Reichb.) VIII, 107 \*Gymnema formosanum Warb. III, 307 \*- macrothyrsa Warb. III, 308 \*Gymnogramme Balliviani Rosenst. IV, 314 (- lanceolata Catal.) VIII, 113 (- salicifolia Mak.) VIII, 113 \*— triplonema Schltr. IX, 435 \*— Türkheimii Schltr. II, 129 (Gymnopteris contaminoides Christ) VI, \*— turmerensis Kränzl. I, 89 Gymnostephium leve Bol. IV, 197

(Gymnothrix bambusiformis Fourn.) V,

(Gymnothrix cenchroides R. et Sch.) ( - distachya Fourn.) V, 73 (- gigantea Walp.) V, 76 - hordeoides Kth.) V, 67 (— Idifolia J. C. Presl.) V, 73 (— Preslii Kth.) V, 73 (— rigida Gris.) IV, 274; V, 75 (— Thouarsii Beauv.) V, 75 (— trystachya H. B. K.) V, 73 Gynura elliptica Yabe et Hayata 1, 21 (Gypsophila cretica S. ct S.) VIII, 48 (- fastigiata Vis.), V, 97 (- - var. Benacensis Rigo) VIII, 482 (- glandulosa Porta) VIII, 482 (- papillosa Porta) VIII, 482 \*- Visiani Bég V, 97

H. Habenaria Balansaei Cogn. IV, 55 \*- Beccarii Schltr. IX, 337 - Caaguazuensis Cogn. IV, 58 \*— chloroceras Kränzl. l, 89 \*- cyrtostigma Schltr. IX, 83 (- dolichostachya Krzl.) IX, 84 - Edwallii Cogn. IV, 57 \*- eurystoma Schltr. X, 248 \*- Ferdinandi Schltr. X, 249 \*- Fiebrigii Schltr. IX, 24 \* - galipanensis Kränzl. I, 88 (- halconensis Ames) IX, 212 \*- Hallieri (J. J. Sm.) Schiltr. IX, 338 - Hassleriana Cogn. IV, 54 Haumann-Mercki Hicken VIII. 304 \*- Hosseusii Schltr. Il, 81 \*— hymenophylla Schltr. IX, 212 inconspicua Cogn IV, 57
integripetmla Cogn. IT, 59 \*- keyensis Schltr. IX, 337 \*— monogyne Schltr. III, 45, IX, 84 \*— Muelleriana Schltr. IX, 435, X, 249 (— Orchidis Hook. f.) V, 197 \*— ovariophora Schltr. IX, 434 - pauciflora Reichb, fil. var. puriflora Cogn. IV, 55 Poissoniana Cogn. IV, 58 \*— porphyricola Schltr. II, 82 — samoensis F. v. M. et Krzl. IX, 84 \*— siamensis Schlir. II, 82 \*— staminodiata Schltr. X. 3 subfiliformis Cogn. IV, 56 (— superflua H. Fleischm. et Rech.) IX, 84 (— supervacanea H. Fleischm, et Rech.) IV, 84 (— tradescantiifolia H. Fleischm. et

Rech.) IX, 83

\*- Vaupelii Schltr. IX, 84 \*— Williamsii Schltr. X, 445 (Halacsya aurea Dörfl.) VII, 189 - Sendtneri Dörfl.) VII, 189 Halenia asclepiadea Borkh. II, 52 \*\_ bella Gilg II, 52

\*- caespitosa Gilg II, 53 \*- Hieronymi Gilg I, 52

- Purpusi Brandegee III, 376 - umbellata (R. et P.) Gilg II, 53 Halesia tetraptera L. f. dialypetala

Relider VII, 361

Halgania tomentosa (R. Helms) Ewart and White IX, 175 (Halimocnemis brachiata Rupr.) IX, 560

- Rezniczenkoana Litw. IX, 559 tianschanica Litw. IX, 560

\*Halorrhagis Burianum Schindler IX, 123 - scabra (Koenig) Benth. var. novaguineensis Th. Val. V, 387

(- tetragyna var. micrantha Benth.)

 verrucosa Maiden et Betche V, 187 Hamadryas sempervivoides T. A. Spr. I. 113

\*Hancea Cavaleriei Lévl. IX, 224 \*- Hemsleyana Lévl. IX, 223

\*- Prainiana Lévl. IX, 223 Haplophyllum bucharicum Litw. IX, 555

(- obtusifolium var. β Bunge) IV, 45 - var. ramosissimum O. Pauls.

IV. 45 Haptocarpum Ule nov. gen. VII, 190

- bahiense Ule VII, 190

(Harpaecarpus exiguus var. macro-cephalus Suksd.) VIII, 271

Harpagophytum Peglerae Stapf VII, 156 Harpalyce ferruginea Brdg. Ill, 376 Harperia Rose nov. gen. IV, 99

- nodosa Rose IV, 99

\*Hartwegia Bergeriana Schltr. III, 78 Haylockia andina R. E. Fr. IV, 38 (Hebeclinium ianthinum hort., non Hook.) VII, 177

\*Hechtia guatemalensis Mez III, 14 Hedeoma costata Hemsl. VIII, 311

— Drummondii Benth. VIII, 310

 polygalaefolia Bentlı, var. montana Dus. VII, 225

Hedera Helix L. var. cordifolia V. Cal.

(- protea Champ.) VI, 46

(Hedraeanthus hercegovinus Maly) VII,

 serpyllifolius (Vis.) DC. f. leucanthus Maly VII, 189

 tenuifolius ssp. \*hercegovinus Maly VII, 188

(Hedyotis pulvinata Balf. f.) VII, 163 (Hedysarum striatum Thunb.) X, 403 Heinsenia Lujae De Wild. III, 161 (Heleocharis tetraquetra Boeckl.)

(- Wichurai Boeckl.) VI, 287

Helianthemum apenninum Mill.

abstersum Cal. VII, 385 (— asperum Lag.) IX, 349 (— ciliatum Pers.) IX, 349 (- racemosum Dun.) IX, 350

- salicifolium Pers. var. ciliatum Davidoff IX, 564

(- vesicarium Boiss.) IX, 349

(- virgatum Schweinf. et Aschers.) IX,

 – var. γ ciliatum (Pers.) Coss. IX, 349

 – var. δ racemosum (Dun.) Coss. IX, 350

- var.  $\beta$  vesicarium (Boiss.) Dur. et Barr. IX, 349

Helianthus apricus J. Lun. IX, 404 - illinoensis H. A. Gleason III, 32

- nitidus J. Lun. IX, 404

- - var. camporum J. Lun. IX, 404 Helichrysum Balfourii Vierh. VII, 164 - Boormanii Maiden et Betche V, 85

- Ducis Aprutii Chiov. VI, 181 - - var. media Chiov. VI, 181

(- gracilipes Oliv. et Hiern b. lanatum Balf. f.) VII, 164

(- - c. profusum Balf. f.) VII, 104, 164 (- - d. stoloniferum Balf. f.) VII, 164 - litoreum Guss. var. apulum A.

Trotter IX, 191

- Paulayanum Vierh. VII, 164 - profusum (Balf. f.) Vierh. VII, 164 - Stoechas DC. vor. 3. macrocephalum

Mer. VIII, 64 var. pendulinum Con. VIII, 157

\*Heliconia robusta Pax VII, 107 Helicteres acuminata R. E. Fr. VIII, 376 (- corylifolia Sp. Moore) VIII, 378 - Gardneriana St. Hill. et Naud.)

VIII, 379

(- guazumaefolia Pilg., non H. B. K.) VIII, 376

 guazumaefolia H. B. K. var. Gardneriana (St. Hil. et Naud.) R. E. Fr. VIII, 379

(- - var. parvifolia K. Schum.) VIII, 379

hirsuta Lour. var. purpurea Hochr. VII, 14

- - var. rosea Hochr. VII, 14

- Lindmanii R. E. Fr. VIII, 378 - Pilgeri R. E Fr. VIII, 376

- retinophylla R. E. Fr. VIII, 377

\*Heliosperma Rohlenae Vandas VIII, 300 - Tommasini (Vis.) Rchb. var. glabrescens Vandas IX, 525

Heliotropium diffusum N. L. Britt. VI, 246

horizontale Small III, 291

- inaguense N. L. Britt. VI, 246 - inundatum Sw. var. chacoënse R.

E. Fr. IV, 205

Helipterum Guilfoylei A. J. Ewart VIII, 407 \*Hesperomecon filiformis Fedde III, 274 Helleborine longifolia Rendle et Britten \*- Greeneana Fedde III, 275 \*Hetaeria Francisii Schltr. IX, 161 VIII, 437 (- longipetala Ten.) VI, 44 (- oblongifolia Krzl.) IX, 88 (Helleborus abchasicus A. Br.) VII, 31 - samoensis Rolfe IX, 88 - casta diva Busch VII, 31 \*- similis Schltr. IX, 88 - ssp. abchasicus (A. Br.) Busch - Whitmeei Rchb. f. IX, 88 VII, 31 Heteropappus hispidus Less. f. 4 decipiens Kom. V, 275 ssp. Kochii (Schiffn.) Busch VII, 31 f. 2 disciflorus Kom. V, 274 ( - Kochii Radde) VII, 31 - - f. 1 longeradiatus Kom. V. 274 - Kochii Schiffn.) VII, 31 f. 3 sibiricus Kom. V, 275 (- - var. glaber Fedcz.) VII, 31 - - f. 5 thymifolius Kom. V, 275 Heterothalamus acaulis (Wedd. nom. - niger L. subsp. A. niger (L.) Hay. VIII, 319 nud.) R. E. Fr. III, 295 viridis L. var. \* subalpinus Gave boliviensis Wedd, var. latifolia R. V, 196 E. Fr. III, 295 Helminthia echioïdes Gaertn. var. pyg-Henchera acutifolia Rose V, 254 maea Pit. IX, 278 (— cylindrica var. alpina S. Wats.) Helogyne macrogyne (Phil.) B. L. Rob. VI, 173 IV, 146 (- columbiana Rydb.) VI, 173 - virgata (Rusby) B. L. Rob. IV, 147 - glabella var. columbiana (Rydb.) - Weberbaueri B. L. Rob. IV, 147 Piper VI, 173 (Helwingia Argyi Lévl. et Vant.) X, 442 - ovalifolia var. alpina (S. Wats.) - chinensis Bat. var. \*longipedicellata Piper VI, 173 Wangerin IV, 337 Hevea brasiliensis var. stylosa Huber \*Hemiboea Cavaleriei Lévl. IX, 328 \*- Esquirolii Lévl. IX, 329 Duckei Huber III, 385 \*- himalayensis Lévl. IX, 329 Randiana Huber III, 385 \*- marmorata Lévl. IX, 454 - Spruceana var. tridentata Huber (Hemihabenaria stenantha [Hk. f.] Finet var. auriculata Finet) IX, 24 III, 386 \*Hexadesmia confusa Schltr. X, 361 (Hemipilia cordifolia Ldl. var. cuneata Hibbertia stricta R. Br. var. Readeri Finet) IX, 22 A. J. Ew. VIII, 412 (- - var. yunnanensis Finet) IX, 22 Hibiscadelphus Rock gen. nov. X, 415 \*- cuneata Schltr. IX, 21 - Giffardianus Rock X, 416 \*- yunnanensis Schltr. IX, 22 - Hualalaiensis Rock X, 416 \*Hemipteris nov. gen. Rosenst. V, 38 - Wilderianus Rock X, 416 \*- Werneri Rosenst. V, 38, 376 Hibiscus bahamensis N. L. Britt. VI, 246 Hemitelia horrida (L.) vár. \*heterosora congestiflorus Hochr. III, 171 Rosenst. X, 275 - cucurbitaceus St. Hil. var. \*acumi-\*Hemsleya trifoliata Cogn. VI, 304 natus Hassl. VII, 378 – cupreus Pamp. VIII, 351 \*Heptapleurum Cavaleriei Lévl. IX, 326 \*Heracleum kansuense Diels II, 66 (- dominicus Hochr.) VII, 379 \*- millefolium Diels II, 65 \*- Fauriei Lévl. X, 120 \*Herminium coiloglossum Schltr. III, 15 - furcatus Willd, var. microcarpus \*- Souliei Schltr. IX, 22 \*- unicorne Kränzl. V, 199 Matt. IX, 253 furcellatus Desv. var. γ \*dominicus (Hochr.) Hassl. VII, 379 Hermodactylus Duclouxii Lévl. var. \*Mairei Lévl. VII, 340 — — var. scaber R. E. Fr. VIII, 391 Herniaria hirsuta L. var. pauciflora (- simplex L.) VIII, 488 Rohl. I. 36 - sudanensis Hochr. III, 170 Zervudachii Hdl.-Mzt. X, 304 — var. genuinus Hochr. III, 170 \*Herpestis Fauriei Lévl. X, 155 - - var. glabrescens Hochr. III, 171 (- Monnieria H. B. K.) VI, 196 - radicata B. et H.) IV, 139 - - f. grandiflorus Hochr. III, 171 - - f. minoriflorus Hochr. III, 171

Hesperis aprica Poir. var. isatidea Pav nanthoides-gigantellum) L. et Z. IV, 325 IX, 317 - adenothyrsum Sag. et Zahn subsp. (- nitens Viv.) IX, 349 adenothyrsum Sag. et Zahn \( \beta \) \*pilo-Hesperomannia Lydgatei Ch. N. Forbes sicens Rohl et Zahn VI, 236 IX. 572

Hicoria pseudoglabra Hollick IV, 100

\*Hieracium adenobrachion (= H. pre-

Herpetospermum grandiflorum A. Cogn.

III, 95

Hieracium adenothrysum ssp. \*baljense Rohl, et Zahn VI, 237

- aitanicum Pau III, 329

albanicum Freyn ssp. \*pivae Rohl.
 et Zahn VI, 239

(— amplexicaule Rupr.) IV, 241 — arvicola N. P. (= H. flor. prat.) subsp. bohemicum Vollm. II, 99 - atrocephalum Schmalh.) IV, 327

(- auricula f. alpina Boiss.) IV, 185 - - subalpina M. B.) IV, 184

— auriculoides (= H. Bauhini-echioïda)

Láng IV, 186

- - ssp. adjarianum Peter IV, 191 - - ssp. \*amaurobasis Litw. et Zahn IV, 188

— — var. 1. \*normale Zahn IV, 188 – – var. 2. \*subeglandulosum Zahn IV, 188

– ssp. arvense (Tausch) N. P. IV,

190 – ssp. \*basileucum Litw. et Zahn IV, 189

- - ssp. echiogenes N. P. IV, 191 - - ssp. mirum N. P. IV, 191

– ssp. pannonicum N. P. IV, 190

- -  $\alpha$  genuinum IV, 190

— — — 1. normale IV, 190 - - - - b. brevisetum N. P. IV, 190

-- a. longisetum N. P. IV, 190

 — – β \*subglandulosum Litw. et Zahn IV, 190

- - - \*floccifolium Zahn IV, 190 - - - a. \*verum Zahn IV, 190 - - ssp. \*rubro-pannonicum Litw.

et Zahn IV, 186 var. b.) \*substriatum Zahn

— var. a.) \*valde-striatum Zahn IV, 187 – ssp. \*sabiniceps Litw. et Zahn IV, 190

 – ssp. \*sabinocephalum Litw. et Zahn IV, 190

- - ssp. \*sublasiophorum Litw. et Zahn IV, 189

- - ssp. \*submirum Litw. et Zahn IV, 189

— — ssp. tanythrix N. P. IV, 191

- -  $\beta$  calotrichum N. P. IV, 191 - - ssp. \*teberdae-fontis Litw. et Zahn IV, 187

- - ssp. thracium N. P. IV, 191 - - 2. \*flocciceps Zahn IV, 191 - - 1. \*normale Zahn IV, 191

- Bärianum Arvet-Touvet I, 128; III, 144

 Bauhini Schult. ssp. \*adenocymoides Rohl. et Zahn VI, 226

- - ssp. adenocymum N. P. 1. \*normale Rohl, et Zahn VI, 226

Hieracium Bauhini ssp. adenocymum 2. \*pilosiceps Rohl. et Zahn VI, 226

- Bauhini Besser IV, 184

- - ssp. armeniacum N. P. IV, 184 - - ssp. Besserianum N. P. IV, 184

— — ssp. branae N. P. IV, 184

- ssp. cymanthum N. P. IV, 184 - ssp. fastigiatum Tsch. IV, 184 - Schult. ssp. heothinum  $\alpha$  ge-

nuinum N. P. f. b. \*subepilosiceps Rohl. et Zahn VI, 226

— Besser ssp. heothinum N. P.

var. \*glandulosiceps Litw. et Zahn

IV, 184

— - ssp. megalomastix N. P. IV, 184 - ssp. migrisetum N. P. IV, 184

- Schult. ssp. \*podgovicae Rohl. et Zahn VI, 225

 Besser ssp. pseudoauriculoides N. P. IV, 184

- - ssp. \*pseudosparsum Zahn IV, 184

- -  $\beta$  angustifolium N. P. IV, 184 \*Hieracium Biebersteinii (= sparsiflorum-laevigatum Zahn) Litw. et Zahn IV, 260

- -- ssp. \*Biebersteinii Litw. et Zalın IV, 260

- - ssp. \*hypopogon Litw. et Zahn IV, 261

- - var.  $\alpha$  genuinum IV, 262

— — var. β\*subtridentatum IV, 262 - ssp. pulchrisetum Litw. et Zahn
 IV, 262

- bifidum Kit. var. oligadenum H. Sudre VIII, 33

- - ssp. Vaccarii Besse et Zahn X, 256

— bifurcum (= H. echioides-pilosella) M. Bieb. III, 155, IV, 183

- - ssp. \*eubifurcum Zahn IV, 183 - - ssp. \*subvindobonense Zahn IV, 183

( - bifurcum Rupr. et Boiss.) IV, 183, 186

(- boreale Boiss.) IV, 242

 boreale Fr. b. lucanum Terracciano V, 139

- bracchiatum (= H. Bauhini [var. florentinum] pilosella) Bertol. subsp. alticaule Litw. et Zahn IV, 184

(- brassicoides A.-T.) X, 257

- Braunianum Zahn et Ch. III, 92 \*- bukovicae Rohl. et Zahn VI, 234 - bupleuroides Gmel. ssp. \*pseudoschenkii Rohl, et Zahn VI, 227

 caesium Fries grex Davallianum Zahn subsp. schladmingense Hayek et Zahn IV, 372

\*— callichlorum Litw. et Zahn IV, 264

\*- callimorphoïdes (H. [pratenseauricula] × pilosella) Zahn III, 388

Hieracium calodon (H. echioides-flo-rentinum) Tausch ssp. \*calodontopsis Litw et Zahn IV, 193

\*— calophylloides Rohl. et Zahn VI, 234

- capillosum Pau III, 325

- cardiophyllum Jord. var. vinosum H. Sudre VIII, 213

- carnosum Wiesb, subsp. carnosiforme Vollm. et Zahn II, 99

— — f. calvescens Vollm. et Zahn II, 99

- - - f. pilosulum Vollm. et Zahn II, 99

(- caucasicum A.-T.) IV, 262

- caucasicum N. P. ssp. caucasicum N. P. IV, 181

- - ssp. Hohenackeri Sch.-Bip. IV, 181

\*- Cernyi Rohl. et Zahn VI, 230

\*— — var. β valisnicae Rohl. et Zahn VI, 231

\*- chloroprenanthes (= H. prenanthoides < sparsiflorum) Litw. et Zahn IV, 266

– ssp. \*chloroprenanthes Litw. et Zahn IV, 266

- - ssp. \*obscuricaule Litw. et Zahn IV, 321

\*- coloriscapum Rohl, et Zahn VI, 240 - comatulum Jord. var. titanophilum H. Sudre VIII, 33

- commixtum Jord. var. Charbonnelii

Sudre VIII, 323

(- [?] complicata H. B. K.) IX, 199 (- constrictum A. Peter) IV, 323

- crinitum Sibth. subsp. 8. pseudoracemosum Zahn IX, 529

- crocatum Fries ssp. \*coniciforme Litw. et Zahn IV, 248

— ssp. conicum A. T. IV, 248 (— cydoniaefolium Boiss.) IV, 242

 cydoniifolium Vill. ssp. brassicoïdes Zahn X, 257

- cymosoides Zahn X, 400

(- cymosum L. ssp. sabinum Seb. et M.) IV, 181

- dacicum Uechtr. ssp. \*terekianum Litw. et Zahn IV, 263

- - var.  $\beta$  \*subpilosum Zahn IV, 263

 divisum Jord. ssp. \*hypopytis Litw. et Zahn IV, 237

- - var.  $\alpha$  \*genuinum Zahn IV, 238

 – – var. β \*hypophyllopodum Zahn IV, 238

 — ssp. Pollichiae Sch. Bip. β \*subpollichiae Litw. et Zahn IV, 237 - echioides Lunm. ssp. asiaticum N. P. IV, 181

-- - ssp. echioides N. P. IV, 181

Hieracium echioides ssp. echiodes  $\alpha$ genuinum N. P. IV, 181

- - - 1. adpressipilum N. P. IV, 181

- -- c. brevisetum N. P. IV, 181

- - - 2. patentipilum N. P. IV,

- erythrocarpum Peter ssp. \*erythrocarpoides Litw. et Zahn IV, 249

 ssp. erythrocarpum Peter var. β \*divisiforme Litw. et Zahn IV, 250 \_\_ \_ \_ \_ 1. \*normale Zahn IV, 250 \_ \_ \_ \_ \_ 2. \*subeglandulosum Zahn IV, 251

 — — var. α \*genuinum Zahn IV, 250

- - 1. \*normale Zahn IV, 250 – – – – b.) acutiusculum Zahn

IV, 250 — — — — a.) verum Zahn IV, 250 – – – 1. pilosiceps Zahn IV, 250

- - ssp. \*glomerellum Zahn IV, 249
- - ssp. \*heterodontoides Litw. et
Zahn IV, 257

- - var.  $\beta$  \*subdentatum Zahn IV, 258

- - ssp. \*macrolepioides Zahn IV, 258

— — ssp. \*samurense Zahn IV, 258 — erythrodontum Zahn subsp. 1. philippopolitanum Zahn IX, 527

- euchaetiforme Zahn subsp. Psko-

wiense Zahn III, 388

 euchaetium N. P. ssp. \*leptophytomorphum (= H. Bauhini-echioidespilosella) Litw. et Zahn IV, 191 - excellens Blocki III, 336

- florentinum All. subsp. pseudo-

vistulinum Oborny III, 155

 \*gigantellum (= H. prenanthoidesumbellatum - sparsiflorum) Litw. et Zahn IV, 325

(- glareosum A. Peter) IV, 325 gracile var. minimum A. Nelson IX, 486

- hypeuryum N. P. ssp. hypeuryum N. P. y \*breviglandulum Rohl. et Zahn VI, 225

- - ss. lamprocomum N. P.  $\beta$ \*stenophylloides Rohl, et Zahn VI, 225 - \*incaniforme (= H. Bauhini <

incanum) Litw. et Zahn IV, 193 - incanum M. Bieb. ssp. \*farino-

dermum Litw. et Zahn IV, 181 - - ssp. incanum (M. Bieb.) N. P. IV, 181

- - f. pilosiceps Litw. et Zahn IV, 181 - - ssp. verruculatum N. P. IV,

181

\*Hieracium incisipes Rohl. et Zahn ssp. incisipes Rohl, et Zahn VI, 229

- inuloides Tausch ssp. teberdense

Litw. et Zahn IV, 247

iuranum Fr. ssp. iuranum (Fr.) Zahn var. \*mollissimum Rohl. et Zahn VI, 234

- Knafii Celak. ssp. \*leucothyrsum Litw. et Zahn IV, 240

 laevigatum Willd, ssp. firmum Jord IV, 241

- - ssp. \*kubanicum Litw. et Zahn IV, 240

– ssp. \*lancidens Zahn IV, 241

- lasiophylloides Pau III, 325

(- lasiophyllum Arv.-Touv.) III, 335 - leptophyton N. P. ssp. \*microbauhini Zahn IV, 185

- - ssp. \*purpureibracteum Zahn

IV. 185

\*- leptoprenanthes (= H. prenanthoides-laevigatum-sparsiflorum)Litw. et Zahn IV, 324

- - \*var. pilosiceps Litw. et Zalın

IV, 325

- - \*var. verum Litw. et Zahn IV, 325 \*- Litwinowianum Zahn IV, 263

- longifidum Zahn IX, 531

 longiscapum Boiss et Kotschy var. \*sublongiscapum Zahn IV, 180 (— longissimum Peter) IV, 241

 lycopifolium Froel var. Scholzianum Pax VIII, 93

- macrodon N. P. ssp. macrodon N. P. var. mratinjense Rohl. et Zahn VI, 236

 macrodontoides Zahn ssp. \*pseudomacrodon Rohl, et Zahn VI, 236

-- var.  $\beta$  epilosiceps Rohl. et Zahn VI, 236

(- macrolepidiforme Zahn) IV, 244 (- magyaricum N. P.) IV, 184

\*— maschukense (H. incanum-cauca-sicum) Litw. et Zahn IV, 182

- ssp. \*caucasiciforme Litw. et Zahn IV, 183

– ssp. \*maschukense Litw. et Zahn
 IV, 182

- \*medschedsense (= H. [prenanthoides-sparsiflorum], > silvaticum Zahn) Zahn IV, 323

(- microtum Boiss.) IV, 263 - minutiflorum Pau IX, 192

\*— mirificissimum Rohl. et Zahn VI, 240

(— murorum Boiss.) IV, 250 (— murorum Rupr.) IV, 323

 Neilreichii A. Kerner ssp. \*ranisavae Rohl et Zahn VI, 227

×— neonigritum (macilentum×alpinum?) Pax VIII, 93

-- olympicum Boiss. subsp. 2. subcrinitum Zahn IX, 530

\*Hieracium orthocladum Zahn IV, 326 - ossaeum (H. sparsiflorum - pilo sissimum) Zahn IX, 532

\* pannoniciforme (= H. auriculoides >incanum) Litw. et Zahn IV, 191

— — var. \*subeglandulosum Zahn IV, 192

- - var. \*verum Zahn IV, 192

 pannonicum Naeg, et Pet, subsp. pannonicum Naeg. et Pet. f. sub-glandulosa Litw. et Zahn IX, 133

- ssp. \*chloripedunculum Rohl. et Zahn VI, 230

- paragogiforme Oborny III, 156

- petiolulatum Pau IX, 192

 pictiforme (pictum-silvaticum) Zalın ssp. pictiforme Zahn var. subsilvaticum Zahn X, 257

(- pilosella Boiss.) IV, 180

- Pilosella L. subsp. minutissimum Zahn VII, 186

— ssp parvulum N. P. IV, 180
— ssp. \*sericostolonum Litw. et
Zahn IV, 179

- - ssp. trichosoma N. P. IV, 180

— — ssp. vulgare N. P. IV, 180

 $\frac{-}{-}$  -  $\beta$  subvulgare N. P. IV, 180  $\frac{-}{-}$  -  $\frac{-}{-}$  3. hirsutum N. P. IV, 180

- piloselliflorum N. P. subsp. melanopsiforme Zahn III, 389

(- polybotrya Juss.) IX, 199 (- praealtum Rupr.) IV, 190

( - praealtum Vill.) IV, 184 - pratense Tausch ssp. \*centro-

rossicum Zahn IV, 180

— — var. \*ponticum Zahn IV, 180 (- prenanthoides Boiss.) IV, 247 (- prenanthoides Rupr.) IV, 322

 Vill. ssp. bupleurifolioides Zahn IV, 242

- - 2. \*subviolascens Rohl, et Zahn VI, 233

-- ssp. bupleurifolium Tausch β bupleurifolium Zahn f. \*variegatum Litw. et Zahn IV, 242

 — ssp. \*hypoglaucum Litw. et Zahn IV, 242

- - var. α \*genuinum Zahn IV, 243

- - - 1. \*normale Zahn IV, 243 — — — — a.) \*epilosum Zahn IV,

243 \_ \_ -- - b.)\*pilosiusculum Zahn

IV, 243

— — — — 2. \*subdentatum Zahn IV, 243 — — — — a.) \*latifolium Zahn IV, 243

— — — — b.) \*lanceolatum Zahn IV, 243

- - var.  $\beta$  floceisquamumZahn IV, 243

Hieracium prenanthoides ssp. lanceolatum Vill. IV, 242

 — ssp. perfoliatum Froel. α genuinum 1. normale Zahn IV, 242

 — ssp. strictissimum Froel α genuinum Zahn IV, 242

— — \*γ subserratum Litw. et Zahn IV, 242

- '- ssp. \*valdefoliatum Zahn IV, 233 \*- procerigenum (= H. Bauhini-procerum) Litw. et Zahn IV, 192

- procerum Fries ssp. procerum

(Fries) N. P. IV, 181

- - 2. calvatum N. P. IV, 181 — — — 1. normale N. P. IV, 181

- psammogenes Zahn ssp. oreites 2. subglabrum Zahn b. \*submaculatum Zahn VI, 228

— ssp. senile A. Kerner f. \*glabres-

cens Zahn VI, 228

\*- pseudoconstrictum (H. prenanthoides >[sparsiflorum > silvaticum] = H. pren. > pseudosvaneticum Zahn) Zahn IV, 323

— pseudojuranum (H. prenanthoides >

laevigatum) A.-T. IV, 247

- pseudosparsum (Uechtr.) Zahn IX, 532

 pseudosvaneticum Peter ssp. corymbulosum Somm. et Lev. IV, 259 — ssp. pseudosvaneticum Peter IV,

— — ssp. \*sobrinatum Litw. et Zahn

IV, 260 - - ssp. \*subsvaneticum Litw. et

Zahn IV, 259

\*- pseudotommasinii Rohl. et Zahn VI, 237

- - ssp. \*pseudotommasinii Rohl. et Zahn VI, 237

- - 2. \*calvescens Rohl et Zahn VI, 238

-- ssp. \*stupposiceps Rohl. et Zahn VI, 239

— — var. \*glaucifolium Rohl. et Zahn VI, 239

 — ssp. \*vardense Rohl. et Zahn VI, 238

- racemosum W. K. subsp. 3. chaetotrichum Zahn IX, 528

— — subsp. 5. italicum Fr. var. Athanasii Zahn IX, 529

\*- ratluense (= H. prenanthoides < [sparsiflorum-silvaticum]) (H. pren. < erythrocarpum Zahn) Zahn IV, 323

\*- rigidellum Litw. et Zalın IV, 265 -- var. α \*genuinum Litw. et Zahn IV, 265

— — var.  $\beta$  \*phyllopodum Litw. et Zahn IV, 266

Hieracium rupicolum Fr. var. 2. foliiferum Mer. VIII, 287

— Ruprechtii Boiss, ssp. \*Ruprechtii

(Boiss.) Zahn IV, 186

— ssp. \*tuscheticum Zahn IV, 186 sabaudum L. ssp. vagum Jord. IV, 242 — ssp. virgultorum Jord. IV, 242 (— sabinum Boiss.) IV, 181

 Scheppigianum Freyn ssp. Scheppigianum Freyn $\beta$  achyrophoroides Rohl. et Zahn VI. 232

— ssp. \*durmitoricum Rohl. et Zahn

VI, 232

\* - Schmalhausenianum Litw. et Zahn IV, 327

- silvaticum L. ssp. cardiophyllum Jord. b.) virens Jord. IV, 236

- - ssp. gentiliforme Zahn X, 401 - — ssp. \*medianiforme Litw, et Zahn IV, 236

- subsp. submarginellum Zahn III, 389

- sparsiflorum (Friv.) Fries ssp. \*beschtavicum Litw. et Zahn IV, 246 - - ssp. \*kiderense Zahn IV, 246

— ssp. macrolepis Boiss. var. β \*pilosius Litw. et Zahn IV, 244

 — ssp. simplicicaule Som. et Lev. IV, 244

- - var.  $\beta$  \*atriceps Litw. et Zahn IV, 245

- - var.  $\alpha$  \*genuinum Zahn IV, 245 \_ \_ \_ \_ 2. \*latifolium Zahn IV, 245

— — — 1. \*normale Zahn IV, 244 — — — — b.) floccipedunculum

Zahn IV, 244 — — — — a) \*verum Zahn IV, 244 - - subsp. 2. sparsiceps Zahn IX, 531

— ssp. svaneticiforme Litw. et Zahn IV, 245

(- spicigera Turcz.) IX, 199 \*- streptotrichum Zahn IV, 326

(- strictissimum A. Peter) IV, 326

(— strictum A. Peter) IV, 326
— stupposum Rchb. f. ssp. \*substupposum Rohl. et Zahn VI, 235
— — — 2. calvicaule N. P. f. 2b.
\*multifolium Zahn VI, 235

- - subsp. 2. ueskuebiense Zahn

IX, 530

\*- sublongissimum Zahn IV, 325

- subspeciosum Naeg. ssp. oxyodon Fr. α pseudorupestre N. P. b. \*sublatifolium Zahn VI, 228

 sulphureum N. P. (= H. florent.auricula) subsp. turfigenum Vollm. et

Zahn II, 99

(- svaneticum v. corymbiferum Somm. et Lev.) IV, 259

 tephroglaucum N. P. subsp. Niesslii Oborny III, 155

(Hieracium thapsiforme Freyn) VI, 231  $(-- ssp. gymnocephalum \beta plumu$ losum 2. nudicaule N. P.) VI, 231

— trebevicianum K. Maly ssp. \*obliquifidum Rohl, et Zahn VI, 228 - ssp. \*paucifidum Rohl. et Zahn VI, 229 — — ssp. subpleiophyllum Zahn  $\beta$ \*minutidens Rohl et Zahn VI, 228 (- tridentatum Boiss.) IV, 241 umbellatum L. var. 3. angustifolium Merino VIII, 287 - - var. Foucaudi Deysson IX, 543 — ssp. umbellatum L. α genuinum Griseb. IV, 241 - - - 2. salicifolium A.-T. IV, 241 - -  $\beta$  monticola Jord. IV, 241 — — — var. \*submonticola Litw. et Zahn IV, 241 umbelliferum N. P. subsp. cymanthiforma Zahn III, 389 - — ssp. \*filistolonum Rohl, et Zahn VI, 226 - ssp. \*njeguschiense Rohl. et Zahn VI. 227 (- undulatum Schousb.) VIII, 134 - valdepilosum Vill. ssp. elongatum f. pseudovillosiforme Zahn VI, 174 - Velenovskyi Freyn ssp. \*chaeto-thyrsoides Zahn IV, 322 - ssp. \*chaetothyrsum Litw. et Zahn IV, 322 (- vulgatum Boiss.) IV, 244 Fries ssp. \*acuminatifolium Litw. et Zahn IV, 238 - - - var.  $\beta$  acuminatifolium Litw. et Zahn IV, 238 - - 2.\*glandulosopedunculum L. et Z. IV, 239 - - - - 1. \*normale L. et Z. IV, 239 — — var.  $\alpha$  epichlorum Litw. et Zahn IV, 238 — — ssp. anfractum Fr. IV, 239 - - ssp. \*argillaceoides Litw. et Zahn IV, 239 - ssp. austrobavaricum Vollm. et Zahn II, 99 — ssp. \*membranulatum Litw. et
 Zahn IV, 239 Waldsteinii Tausch ssp. gymnocephalum y \*oligocephalum Rohl. et Zahn VI, 232 — — ´— f. \*pilosipedunculum Rohl. et Zahn VI, 232 — ssp. suborieni Zahn β \*lovcenicum Rohl. et Zahn VI, 231 \*- Yabei Lévl. et Vant. V, 279 \*Hieronyma boliviana Pax VII, 109 Hindsia Itatiaiae Dus. VII, 224

Hippagrostis Ioliaceus (Beauv.) O. Ktze. IV. 307 Hippeastrum Holmbergii Hick. VII, 144 - marginatum R. E. Fr. IV, 39 — tubispathum Pax var. grandiflorum Hick. VII. 144 \*Hippeophyllum celebicum Schltr. X, 25 \*Hippocratea huanucana Loes. I, 163 - Menyharthii Schinz VI, 155 – obovata Pitt. VII, 470 Hippocrepis commutata Pan III, 327 (Hippomarathrum pungens Loj.) VI, 37 Tinei Loj. Poj. VI, 37 \*Hippuris Fauriei Lévl VIII, 280 \*Hiptage Cavaleriei Lévl. X. 372 \*- Esquirolii Lévl. X, 372 javanica Bl. f. rubella Hochr. V. 349 Hiraea bahiensis Moric, var. paraguariensis Ndz. V, 62 - - var. typica Ndz. V. 62 - - f. dentulata (Juss.?) Ndz. V, 62 - - - f. Salzmanniana (Juss.) Ndz. V, 63 (- Blanchetiana Moric.) V, 63 - borealis Ndz. V, 59 – var. eglandulosa Ndz. V, 59 - - var. glandulifera Ndz. V, 59 (— cornifolia Willd.) IX, 201 (- cuneata Griseb.) V, 62 - - var. acuminata Ndz. V, 62 - - f. eglandulosa Ndz. V, 62
- - f. glandulifera Ndz. V, 62 – var. obtusa Ndz. V, 62 - - f. eglandulosa Ndz. V, 62 - - - f. glandulifera Ndz. V, 62 - demeravensis (Juss ) Ndz. V, 63 (- dentulata Juss.) V, 62 fagifolia (ĎC.) Juss. V, 63 – var. Blanchetiana (Moric.) Nzd. V, 63 - - f. latifolia Ndz. V, 63
- - f. longifolia Ndz. V, 63
- var. Candolleana Ndz. V, 63 - - f. Riedleyana Ndz. V, 63 — — f. typica Ndz. V, 63 - faginea (Św.) Ndz. V, 63 - - f. glandulifera Ndz. V, 64 - - f. typica Ndz. V, 63 (- fulgens Juss.) V, 63 (- - var. demerarensis Juss.) V, 63 - Gaudichaudiana Juss. V, 62 — – f. eglandulosa Ndz. V, 62 - - f. glandulifera Ndz. V, 62 (- hippocrateoides Pl. et Fr.) IX, 270 (- Houlletiana Juss.) V, 61, 62 (- Kunthiana Juss.) V, 60 (- macradena DC.) IX, 202 (- macrodisca Pl. et Tr.) IX, 267 (- (?) macroptera DC.) IX, 272 (- maritima Juss.) IX, 268 - obovata (H. B. K.) Ndz. V, 60 - - var. angustifolia Ndz. V, 60

Hiraea oboyata var. latifolia Ndz. f. Hordeum marinum Huds, subsp. Guseglandulosa Ndz, V, 60 sonea num Thell. V, 362 (— maritimum With.) V, 362 - - f. glandulifera Ndz. V, 60 - secalinum Schreb, var. parviflorum pachypoda Ndz. V, 58 (- parvifolia Ndz.) V, 62 Hack. IV, 348 - platyrrhachis Pl. et Tr.) IX, 270 Hosackia americana (Nutt.) Piper VII. 218 - [?] nitida H. B. K.) IX, 199 – var. pilosa (Nutt) Piper VII, 218 – Riedleyana Juss.) V, 63 – rigida Juss.) IX, 268 (- elata Nutt.) VII, 218 - - glabra Nutt.) VII, 218 — Salzmanniana Juss.) V, 62 — schizoptera Turcz.) IX, 270 - floribunda Nutt.) VII, 218 - mollis Nutt.) VII, 218 (- pilosa Nutt.) VII, 218 - septentrionalis Juss.) IX, 272 (- Simsiana Juss.) IX, 270 - Purshiana Benth.) VII, 218 - unifoliata Hook.) VII, 218 - Swartziana Juss.) V, 63 (- ternifolia (H. B. K.) Juss. V. 61 Houstonia gracilis Brdge. III, 378 - - var. granatensis Ndz. V, 61 \*Hoya amboinensis Warb. III, 341 - - - subvar. Humboldtiana Ndz. \*- chlorantha Rech. V, 13i V, 61 \*- filiformis Rech. V, 132 — — subvar. vulgaris Ndz. V, 61 \*- Hellwingiana Warb. Ill, 341 (- volubilis Moore) IX, 201 \*- Hollrungii Warb. III, 342 \*- maxima (Karst.) Warb. III, 342 - var. Wiedeana (Juss.) Niedz. V, 61 - transiens Ndz. V, 60 \*- megalaster Warb. III, 343 - velutina Ndz. V, 60 \*- mucronulata Warb. III, 343 (- violacea Pl. et Tr.) IX, 205 \*- pycnophylla Rech. V, 133 (- Wiedeana Juss.) V, 61 Hirtella Sprucei Benth. ssp. \*meridio-\*- refusa Warb. III, 344 (Hugonia Jenkinsii F. v. M.) V, 270 nalis Hassl. VII, 376 Hulsea caespitosa Nels. et Kenned. V, Holfmannseggia arida Rose V, 112 288 (- gracilis S. Wats.) V, 112 Humata alpina Moore var. \*edentula - Watsoni (Fischer) Rose V, 112 Rosenst. X, 324 (Holboellia chinensis Diels) V, 343 \*- Cromwelliana Rosenst. X, 324 (- cuneata Oliv.) V, 343 Hutchinsia drepanensis Loj. Poj. III, 332 Holcus lanatus L. var. glabrescens - grandiflora Sol.) V, 90 Zobel IV, 301 Hybanthus parviflorus (L. fil.) Fries VI, Holographis ilicifolia Brdge. III, 377 Hydatella inconspicua Cheesem. VI, 116 Holstia nov. gen. foss. O. Hagstr. V, 29 - splendens O. Hagstr. V, 29 Hydnobolites californicus Harkn. VII, 194 (Homalobus campestris Nutt.) VIII, 11 (Hydrangea arborescens alba grandiflora E. G. Hill) VII, 360 (- decumbens Nutt.) VIII, 11 – L. f. grandiflora Rehder VII, 360
– cinerea Small f. sterilis A. Rehder (Homopappus racemosus Nutt.) Vlil, 270 (Honkenya oblongifolia Torr. & Gr.) VIII, 343 VI, 169 Hookera bicolor (Suksd.) Piper VI, 77

— Douglasii (S. Wats.) Piper VI, 77 - integrifolia Hay. VI, 195 \*- sachalinensis Lévl. VIII, 282 Howellii (S. Wats) Piper VI, 77 \*- Taquetii Lévl. VIII, 282 - synandra Heller IV, 60 \*- tiliaefolia Lévl. VIII, 282 \*Hydrocharis Bodinieri Lévl. et Vant. Hoorebekia carthamoides (Hook.) Piper V, 10, VIII, 141 VIII, 270 – var. Cusickii (A. Gr.) Piper VIII, Hydrocleis cryptopetala Fries VI, 208 Hygrophila Thonneri De. Wild. X, 525 Hymenachne auriculata Chase V, 305 270 Greenei var. mollis (A. Gr.) Piper (- fluviatilis Nees) V, 306
(- indica Buese) V, 306
- palustris Chase V, 305 VIII, 271 - Hallii (A. Gr.) Piper VIII, 270 - hirta (A. Gr.) Piper VIII, 270 - lanuginosa (A. Gr.) Piper VIII, 270 (Hymenatherum belenidium DC.) IV, 139 - Lyallii (A. Gr.) Piper VIII, 270 Hymenocardia obovata Beille VIII, 319 racemosa (Nutt.) Piper VIII, 270 \*Hymenophyllum Bamlerianum Rosenst. - stenophylla (A. Gr.) Piper VIII, 271 X, 323

— Blumeanum Spr. var. \*novoguine-ensis Rosenst. V, 371 Hordeum compressum Gris. var. s uperatum Hack. IV, 347 - Bodinieri Lévl. et Vant. VI, 375

\*— Buchtienii Rosenst. V, 229

– var. tenuispicatum Hack. et Stuck. IV, 348 \*Hymenophyllum cristulatum Rosenst. V, 14

\*- dendritis Rosenst. VI, 308 \*- geluense Rosenst. V, 372 \*- Le Ratii Rosenst. IX, 71

\*- pumilio Rosenst. IX, 72 \*- Rolandi Principis Rosenst. IX, 72 \* - semiglabrum Rosenst. IX, 67

\*- subobtusum Rosenst. IX, 71

(Hyoscyamus physaloides & Turcz.) VIII, 167

(Hyoseris lucida L.) IX, 467

 radiata L. var. β lucida (L.) Durand et Barr. IX, 468

Hypecoum pendulum L. var. persicum

Fedde I, 29

Hypericum acutum Much. var. undulatum (Schousb.) Pau VIII, 134

— baeticum Boiss. III, 330, VIII, 134

 bithynicum Boiss. var. maius Boiss.) IX, 526

\* Bonatii Lévl. et Vant. VI, 111 - confusum Vandas IX, 526

\*- Esquirolii Lévl. Vl, 330

- humifusum f. \*suberectum H. Preuss VII. 106

 japonicum Thbg. var. \*plurinervium Lévi. VIII, 451

Kouytchense Lévl. VI, 375

- lateriflorum Lévl. VI, 375

- longifolium Lévl. VI, 375 - montanum L. f. \*imperforatum Vacc. VIII, 328

\*- Nakaianum Lévl. VIII, 452 (- neapolitanum Ten) V, 136

- perforatum L. var. moesiacum Velen. I, 133

(- petiolatum Miq., non Walt., nec. Franch. et Sav.) VI. 290

\*- porphyrandrum Lévl. VI, 330

- reflexum L. var. α lanuginosum Pit. IX, 210

 Roberti Coss. var. hispanicum Pau. III, 330

\*- sachalinense Lévl. VI, 330 \* - Taqueti Lévl. et Vant. V, 279

- tetrapterum Fries b. neapolitanum (Ten.) Terrac. V, 136

(- virginicum Miq.) VI, 290

- vulgatum Fr. subsp. austrobavaricum Vollm. et Zahn f. basitrichum Vollm. et Zahn II, 99

– – f. umbrosum Vollm. II, 99

Hypochaeris coronopifolia (Sch. Bip.) Macl. IV, 143

- illyrica Maly VI, 293

- Ieucantha (Speg.) Macl. IV, 143 - maculata L. f. glabrescens Witte II, 123

- magellanica (Schultz) Macl. IV, 143 - odorata (Walp.) Macl. IV, 143

Hypochaeris palustris (Phil.) Macl. IV, 143 - tenerifolia (Remy) Macl. IV, 143 Hypodematium Erythraeae Lanza IX, 414 \*Hypolepis Bamleriana Rosenst. X, 325 - Hauman-Mercki Hicken VII, 172

\*- neocaledonica Rosenst. X, 159 papuana Bail. IX, 547 (Hypopitys multiflora Scop) X, 144

\*Hyptis inundata Herzog VII, 66 mutabilis (Rich.) Briq, var. spicata

(Poit.) Briq. VIII, 311 - urticoides Kunth VIII, 311

(Hyssopus angustifolius Litw.) III, 390 - cretaceus Dubiansky III, 390 (- officinalis Claus) III, 390

— — var. angustifolius Schmalh III, 390 - tainacensis (Fisch.) Dub. III, 390 Hysterangium Gardneri Ed. Fischer VII. 194

## I.

Iberis Balansae Jord. var. brevicaulis Murb. V, 201

ciliata All. var. asperata Pau VI. 383

- Lagascana DC. var. Eliasii Sen. et Pau VIII, 211

Ibidium incurvum Jennings VI, 203 \*Ilex Amboroica Loes. VII, 61

- crenata Thunbg. f. microphylla Max. VIII, 346

\*- Dunniana Lévl. IX, 458 \*\_ loretoica Loes. I, 166 \*- microsticta Loes. I, 164

-- opaca Ait. f. xanthocarpa Rehder

- quitensis (Willd.) Loes. I, 166 \* - var.  $\beta$  \*glabra Loes. I, 166

\*- Weberbaueri Loes. I, 165 Illicium Silvestrii Pav. IX, 317 \*Illigera Dunniana Lévl. IX, 326 Impatiens Abbatis Hook. f. VIII, 177

- arguta Hook. var. Bulleyana Hook. f. VIII, 341

- atherosepala Hook f. VIII, 338
- attopeuensis Hook f. VIII, 173
- Aureliana Hook f. VIII, 172

- Balansae Hook. f. VIII, 177 - Boni Hook. f. VIII, 176 Capusii Hook, f. VIII, 178 - claviger Hook. f. VIII, 178

- cyanantha Hook. f. VIII, 179

 dorstenioides (Warbg.) Hook.V, 339
 Ganpiuana Hook. f. VIII, 340 Harmandi Hook. f. VIII, 175
indochinensis Hook. f. VIII, 174

– Lanessani Hook. f. VIII, 174 - lasiophyton Hook. f. VIII, 339 lepida Hook, f. VIII, 180

leptacaulon Hook. f. VIII, 340
Leveilléi Hook. f. VIII, 179

- Martinii Hook. f. VIII, 339

Impatiens Morsei Hook. f. VIII, 341
— piufanensis Hook. f. VIII, 338 - semounensis Hook. f. VIII, 173 Spireana Hook, f. VIII, 176 verrucifer Hook, f. VIII, 174 - zygosepala Hook, f. VIII, 175 (Indigofera arenaria A. Rich.) VII, 159
— griquana Schltr. III, 192; VI, 359
— Krookii Schltr. III, 193; VI, 360 \*- laxa Ulbr. II, 4 lespedezoides H. B. K. var. \*acutifolia Hassl. VIII, 125 \*- nairobiensis Bak. fil. X, 124 \*— Rojasii Hassl. VIII, 124 Semhaensis Vierh. VII, 159 \*— siamensis Hoss. IV, 291 — swaziensis Bol. VII, 125 \*- Weberbaueri Ulbr, II, 4 Indokingia gen. nov. W. B. Hemsl. V, 261 crassa Hemsl. V, 261 Inga gracilior T. A. Spr. II, 138 - olivacea T. A. Spr. II, 127 Inula britannica L. c. chinensis Kom. - - var. \*diminuta Dom. I, 13 – b. japonica Kom. V, 275  $--\beta$  linariifolia Turcz. f. simpléx Kom. V, 275 – d. ramosa Kom. V, 275 – var. \*sericeo-lanuginosa Dom. I, 13 — — a. sublanata Kom. V, 275 ×— Gutierrezi (I. Conyza × lutescens) Pau III, 330 montana L. var. foliacea Pau - Oculus Christi L. var. scabra Rohl. (— suaveolens Lange et Willk.) III, 330 \*- Taquetii Lévl. X, 351 viscosa L. var. angustifolia R. Maire VI, 4 Iodes oblonga Planch, var. moluccana Hochr. V, 348 (Iohrenia Candollei Boiss.) IX, 142 – paucijuga (DC.) Bornm. IX, 142 (- Persica Boiss.) IX, 142 Ionidium enneaspermum Vent. var. latifolium De Wild. X, 523 (— glutinosum Vent. var. parviflorum (L. fil.) Eichl.) VI, 204 utricularioides Ionopsis Lindl. var. angustifolia Cogn. I, 111 Ionoxalis alpina Rose VI, 254 - amplifolia (Trel.) Rose VI, 255 - bipartita Rose VI, 255 compacta Rose VI, 255 - confusa Rose VI, 255 - Conzattiana Rose VI, 256 cuernavacana Rose VI, 256 — decaphylla (H. B. K.) Rose VI, 256

Ionoxalis Drummondii (A. Gr.) Rose VI, 256 - furcata Rose VI, 257 Galeottii (Turcz.) Rose VI, 257
Gonzalesii Rose VI, 257 - Grayi Rose VI, 257
- gregaria Rose VI, 258
- Jacquiniana (H. B. K.) Rose VI, 258 - jaliscana Rose VI, 258 - Hernandesii (DC) Rose VI, 258 - lasiandra (Zucc.) Rose VI, 259 — latifolia (H. B. K.) Rose VI, 258 (Ipomoea acuminata Roem, et Schult, VIII, 230 ancisa J. D. House VIII, 228 (— angustifolia Choisy) VIII, 234 aprica J. D. H. VIII, 234argyreia Meissn.) IX, 196 — – var. \*Burchellii Hassl. IX, 196 — — var. \*discolor Hassl IX, 195 - -- var. \*lanata Hassl. IX, 196 — — f. \*linearifolia Hassl. IX, 196 — — f. \*oblongifolia Hassl. IX, 196 — — f. \*nitens (Chod. et Hassl.) Hassl. IX, 196 - - f. \*paraguariensis (Peter)
Hassl. IX, 195
- - f. salicifolia Hassl. IX, 196 — — var. \*Martii Hassl. IX, 196 (- aruguayensis Chod, et Hassl non Meissn. var. glabrata Chod. et Hassl.) IX, 155 (- bonariensis Hook. var. grandiflora Chod. et Hassl.) IX, 153 (— — var. rupestris Chod. et Hassl.) IX, 153 - - subsp. \*aspera Hassl. IX, 153 — — var. \*hispida Hassl. IX, 154 \_ \_ \_ \_ f \*lobata Hassl. IX, 154 — — — f \*subintegra Hassl. IX, 154 — — var \*pubescens Hassl. IX, 154 — — f. \*trichosepala Hassl. IX, 154 — — — var. \*tomentosa Hassl. IX, 154 -- - subsp. \*mollis Hassl. IX, 153 — — var. \*genuina Hassl. IX, 153 — — var. grandiflora Hassl. IX, 153 — — f. \*cordata Hassl. IX, 153 — — f. \*intermedia Hassl. IX, 153 — — var.\*pubisepala Hassl. IX, 153 - - var. \*rupestris (Chod. et Hassl.) Hassl. IX, 153 (- brachypoda Benth.) VIII, 230 - calophylla Wright) VIII, 232 (- capillacea var. patens A. Gr.) VIII, 233 (— capparoides Choisy) VIII, 235 \*— cernua (Moric.) Hassl. IX, 156 — var. \*ambigua (Meissn.) Hassl. IX, 156 - - f. \*chacoensis Hassl. IX, 156 — — f. \*platensis (N. E. Br.) Hassl. IX, 156

Ipomoea ceruua var. \*gennina (Moric.) Hassl. IX, 156

— — f. \*acutifolia Hassl. IX, 156 — — f. \*obtusifolia Hassl. IX, 156 \_ \_ \_ \_ subf. \*subsericea Hassl. IX, 156 — var. \*Meissneri Hassl. IX, 156 - - f.\*grandiflora Hassl. IX, 156 \_\_ \_ f. \*paraguariensis Hassl. IX, 156 \* - Chanetii Lévl. IX, 452 - cissoides (Lam.) Griseb. var guadaloupensis (Steud.) J. D. H. VIII, 230 - Curtiscii J. D. H. VIII, 235 desertorum J. D. H. VIII, 229 - durangensis J. D. H. VIII, 228

\* Fauriei Lévl. X, 154

- Fawcettii Urb. VIII, 231

(- filipes Benth.) VIII, 233

\* gracilipes Hassl. IX, 158 (- graminiformis Meissn. var. densifolia Chod. et Hassl.) IX, 159 (- Hassleriana Chod.) IX, 151 heterophylla Orteg. var. aemula J. D. H. VIII, 229 var. subcomosa J. D. H. VIII, 229 (- heterotricha Meissn.var. homotricha Chod. et Hassl.) IX, 154 (- hirtiflora Mart. et Gal.) VIII, 229 Hochstetteri J. D. H. VIII, 231
ignava J. D. H. VIII, 230
invicta J. D. H. VIII, 280 iostemma J. D. H VIII, 230 \*- Koloaensis Lévl. X, 154 lacteola J. D. H. VIII, 232 — lenis J. Ď. H. VIII, 228 Lindheimeri A. Gr. var. subintegra J. D. H. VIII, 229

Macalusoi Matt. IX, 253 - macrantha Peter) VIII, 231 \* - Martini Lévl. IX, 453 - megapotamica Choisy var. \*cordifolia Hassl. IX, 157 (- nitens Chod. et Hassl.) IX, 195, 196 - minuta R. E. Fr. III, 361 \*— minutiflora (M. et G.) J. D. H. VIII, 234 (- muricata Roth) VIII, 233 - nicoyana J. D. H. VIII, 233 (- nil Gardn.) VIII, 230 - ochracea (Lindl.) G. Don VIII, 235 oreophila J. D. H. VIII, 229 (- pandurata Conz. et Sm.) VIII, 232 (- paraguariensis Peter) IX, 195 (- paroensis Peter) VIII, 235 patens (A. Gray) J D. H. VIII, 233
 passifloroides J. D. H. VIII, 233
 phillomega (Vell.) J. D. H. VIII, 235 (- platensis N. E. Br.) IX, 156 - var. \*erecta Hassl. IX, 155 - var. \*genuina Hassl. IX, 154 \*quinque-partita Hassl. \_ \_ var. IX, 154

Ipomoea platensis puinque-partita f. \*subseptem-partita Hassl. IX, 154 - var. \*subnovem-partita Hassl. IX, 155 - plicata Urb. VIII, 231 (- polymorpha Gris.) III, 361 polymorpha Riedel var. \*discolor Hassl. IX, 155 — — f. \*canescens Hassl. IX, 155 — — f. \*argentea Hassl. IX, 155 \_\_ \_ \_ subf. \*elliptica (Chod. et Hassl.) Hassl. IX, 156 (- - var. elliptica Chod. et Hassl.) IX, 155 - populina J. D. H. VIII, 231 praecana J. D. H. 232 Pseudo-Calystegia Hassl. IX, 151 (- pubescens Lam.) V, 365 - pulchella Roth var. \*lineariloba Hassl. IX, 158 (- punctata Macf.) VIII, 230 — Purpusi J. D. H. VIII, 235 — quinquefolia Hochst.) VIII, 231 — rhomboidea J. D. H. VIII, 234 Robinsonii J. D. H. VIII, 236 \*— Rojasii Hassl. IX, 152 — rupicola J. D. H. VIII, 233 - sabulosa J. D. H. VIII, 232 — — var. hirtella J. D. H. VIII, 232 - var. mollicella J. D. H. VIII, 232 - sagittula J. D. H. VIII, 234 - seducta J. D. H. VIII, 234 (- setosa Gris.) VIII, 231 – var. campanulata (Hall. f.) J. D. H. VIII, 231 – var. Pavoni (Hallier f.) J. D. H. VIII, 231 \*- subalata Hassl. IX, 157 - subrevoluta Choisy var. \*genuina Hassl. IX, 159

- - f. \*acutiloba Hassl. IX, 159 — var. \*induta Hassl. IX, 159

(— tenuifolia (Vahl) Kuntze) VIII, 231

— trifida (H. B. K.) G. Don var.

ymalensis J. D. H. VIII, 235 (- turneroides Chod. et Hassl.) IX, 194 - tuxtlensis J. D. H. VIII, 235 - umbraticola J. D. H. VIII, 236 - Vahliana J. D. H. VIII, 230 \* Vaniotiana Lévl. IX, 453 (— villifera J. D. H.) VIII, 229 Iresine inaguensis Millsp. VII, 280 - keyensis Millsp. VII, 279 Iris caucasica var. oculata Max. IV, 95 (- Chamaeiris G. et G.) VII, 349 — Bert. var. α humilis Reyn. VII, – var. β majuscula Reyn. VII, 349 - dengerensis B. Fedtsch. IV, 95 \* - Duclouxii Lévl. VI, 113

Iris Eleonorae J. Holmb. VI, 220 (- Gran-Duffii Bornm. β melanosticta Bornm.) VI, 29 himalaica W. R. Dykes VIII, 381 - Kuschakewiczi B. Fedtsch IV, 95 (- lutescens Lamk. non alior.) VII, 349 (- lutescens G. et G.) VII, 349 Mariae Kusch, IV, 95 -- melanosticta Bornm. VI, 29 narynensis O. Fedtsch. IV, 96 (- olbiensis G. et G.) VII, 349 (- olbiensis Hén.) VII, 349 (- pallida Lam. var. dalmatica Pamp.) VII, 234 reticulata var. atropurpurea W. R. Dykes VIII. 381 — Taitii Foster V, 2 \*—yunnanensis Lévl. VI, 113 Irvingella nov. gen. v. Tiegh. V, 149

— Boto v. Tiegh V, 150

— Chevalieri v. Tiegh. V, 150 Harmandiana (Pierre) v. Tiegh. V, 151 - Klainci v. Tiegh. V, 150
- Malayana (Oliv.) v. Tiegh. V, 149
- Oliveri (Pierre) v. Tiegh. V, 149
- rubra v. Tiegh. V, 150
- Smithii (Hook. fil.) v. Tiegh. V, 149
- Spirei v. Tiegh. V, 140 - Spirei v. Tiegh. V, 149
- Tholloni v. Tiegh. V, 149
Irvingia caerulea v. Tiegh. V, 148
- Duparqueti v. Tiegh. V, 147 — erecta v. Tiegh. V, 148 — fusca v. Tiegh. V, 148 — fusca v. Tiegh. V, 148 (— glaucescens Engl.) V, 151 — Griffoni v. Tiegh. V, 147 — Harmandiana Pierre) V, 151 (- Hookeriana v. Tiegh. V, 147 laeta v. Tiegh. V, 148
malayana Oliv.) V, 149
nodosa v. Tiegh. V, 146 (- Oliveri Pierre) V, 149 — pauciflora v. Tiegh. V, 148 — platycarpa v. Tiegh. V, 149 (— Smithii Hook fil.) V, 149 - tenninucleata v. Tiegh. V, 148 — velutina v. Tiegh. V, 147 \*Ischaemum crassipes (Steud.) Thell. X, 289 (— Sieboldii Miq.) X, 283 Ischnolepis Jum. et Perr. de la Bathie gen. nov. X, 414 — tuberosa J. et P. X, 415 Ischnosiphon Baenitzii Pax VII, 108 – violaceus Pulle III, 285 Isertia alba T. A. Spr. II, 140 — Purdiei T. A. Spr. II, 141 ×Ismene festalis (Elisena [Ismene] longipetala ♂× lsm. calathina ♀) O. Worsley IV, 176 \*Isochilus alatus Schltr. X, 360 Isolona Sereti De Wild. var. grandifolia

De Wild. X, 528

\*Isopyrum trichophyllum Lévl. IX, 224
\*— tuberosum Lévl. VII, 340
\*Isostigma Herzogii Hassi. VII, 358
\*Itea Bodinieri Lévl. IX, 457
Ixonanthes grandiflora (Boerl. mss.)
Hochr. VII, 9
\*Ixora inodora Rech. IV, 229
\*— Upolensis Rech. IV, 229
\*— gigantea Rech. IV, 229

Jacaranda decurrens Cham. var. B \*glabrata Hassl. IX, 63 (- densicoma [Mart.) VIII, 151 \*- mutabilis Hassl. IX, 60 – var. γ \*angustiflora Hassl, IX, 62 – var. α \*genuina Hassl. IX, 62 – var. β \*parvifolia Hassl. IX, 62 - - f. \*integra Hassl. IX, 62 — — f. \*subcoaetanea Hassl. IX, 62 Jacquemontia Blancheti Moric. var. \*puberula Hassl. IX, 160 \* - densifolia (Chod. et Hassl.) Hassl. – var. \*involuta Hassl. IX, 160 — evolvuloides Meissn var. \*grandiflora Hassl. IX, 194 - - f. \*albiflora Hassl. IX, 194 - - - f. \*hirsutula Hassl, IX, 194 — — f. \*microphylla Hassl IX, 194 — — f. \*tomentosula Hassl. IX, 194 - fruticulosa Hall. f. var. \*genuina (Hall.) Hassl. IX, 160 — var. \*glandulifera Hassl. IX, 160 — f. \*angustifolia Hassl. IX, 160 — f. \*grandifolia (Chod. et Hassl.) Hassl. IX, 160 — — f. \*subsericea Hassl. IX, 160 — — – f. \*viscosissima Hassl. IX, 160 \* guaranitica Hassl. IX, 193 - heterantha Hallier var. \*multiflora Hassl. IX, 194 — hirsuta Choisy var. \*adenotricha Hassl. IX, 193 — — f. \*racemosa (Chod. et Hassl.) Hassl. IX, 194 (- - var. Pohlii Meissn. f. racemosa Chod. et Hassl.) IX, 194 reclinata House III, 291

\* - turneroides (Chod. et Hassl.) Hassl. IX, 194 (Jambosa tetraquetra Miq.) IV, 235

Jasione maritima Duf. var. campestris (Willk.) Merino VIII, 63

— var. sessiliflora (Boiss. et Reut.)
Pau et Merino VIII, 63

— Pontica (Boiss.) Hand.-Mzt. X, 399

 (- supina β Pontica Boiss.) X, 399
 Jasminum Barrelieri Webb et Berth. var α angustifolia Pit. IX, 280 Jasminum Barrelieri var.  $\beta$  latifolia Pit. IX, 280

\*— Esquirolii Lévl. X, 147 \*— Prainii Lévl. X, 148

(Jasonia glutinosa Lg.) III, 321 - obtusifolia C. Pau III, 321

Jatropha tepiquensis Costant. et Gall. V, 128, 129 (Jaundea Zenkeri Gilg) X, 245

– Innulata (Zucc.) Rose VI, 259

- occidentalis Rose VI, 259 — primavera Rose VI, 259 Pringlei Rose VI, 259

- Schiedeana (Zucc.) Rose VI, 260

stipitata Rose VI, 260
stolonifera Rose VI, 260 — tenniloba Rose VI, 260

— tetraphylla (Cav.) Rose VI, 260 vespertilionis (Zucc.) Rose VI, 261 Juglans Allardiana Dode X, 297

 Avellana Dode X, 297 cathayensis Dodé X, 298

— coarchata Dode X, 297 collapsa Dode X, 298
Draconis Dode X, 298

 Duclouxiana Dode VII, 90 fallax Dode VII, 91

 kamaonia Dode VII, 91 Lavallei Dode X, 297 Orientis Dode VII, 92

(- regia L. var. Beloudschistana C. DC.) VII, 92

 var. corcyrensis Sprenger VIII, 342 (— — var. kamaonia C. DC.) VII, 91

(-- var. sinensis C. DC.) VII, 93

- sigillata Dode VII, 93 — sinensis Dode VII, 92

subcordiformis Dode X, 298

Juncoides Piperi Cov.

luncus acutiflorus Ehrh. var. microcephalus (Koch) Husn. IX, 256

(— acutus C. A. M.) IX, 255 (— acutus A. megalocarpus I. a. 2.

conglobatus A. et G.) IX, 255 - acutus L. var. conglomeratus Buchenau f. conglobatus (Trautv.) Miscz. IX, 255

- war. effusus Buch, IX, 256

 var. multibracteatus (Tin.) Husn. IX, 256

— alpinus Vill. var. Requienii (Parl.) Husn. IX, 256

(- ambiguus Guss.) IX, 257 (— attenuatus Viv.) IX, 256

(— bicephalus Gren.) IX, 257 (- bottincus Wahl.) IX, 256

 brachystylus (Engelm.) Piper, VI, 76 – bufonius L. var.  $\delta$  ambiguus (Guss.) Husn. 1X, 257

(— — var. condensatus Cout.) IX, 258

 $(--\beta)$  fasciculatus Koch) IX, 255

Juneus bufonius var. \( \gamma \) foliosus (Desf.) Husn. IX, 257

— — f. frondescens Miscz, IX, 255 (— — i. grandiflorus J. A. et J. H. Schult.) IX, 255

- — var. ε hybridus (Brot.) Husn. IX, 257

(— — II. leucanthus A. u. G.) IX, 255

(— B. mutabilis A. u. G.) IX, 255 — f. mutabilis (Savi) Miscz. IX, 254 (— var. rostratus Hausm.) IX, 255

 — var. ζ Sorrentinii (Parl.) Husn. IX, 258

- compressus Jacq. var. Gerardi (Lois.) Husn IX, 256

- Covillei Piper VI, 76

(- effusus L. var. brunneus Engelm.) VI, 76

- var. fistulosus (Guss.) Husn. IX, 255

– – var. hesperius Piper VI, 76 (— falcatus var. paniculatus Engelm.) VI, 76

(— fasciculatus Bert.) IX, 257 (- fistulosus Guss.) IX, 255

 flavescens Host. III, 142 (— Iluitans Lmk.) IX, 256 (- foliosus Desf.) IX, 257 (- Gerardi Lois.) IX, 256

– glaucus Ehrh. var. (Hoppe) Husn. IX, 255 paniculatus

(— hybridus Brot.) IX, 255, 257 (— insulanus Viv.) IX, 255, 257

(— latifolius var. paniculatus Buch) VI, 76 Leersii Marss. var. praeflorens Ade et Vollm. II, 101

(- longibracteatus Boiss.) IX, 255

(- luzulinus Vill.) Ill, 142 (- multibracteatus Tin.) IX, 256

(- mutabilis Savi) IX, 255, 257 (- nigritellus Koch) IX, 256

- niponensis Buchen, var. \*hakodatensis Lévl. X, 352

 obtusiflorus Ehrh. var. Schillingeri Fisch. II, 101

- paniculatus Hoppe) IX, 255

(- ranarius Song. et Perr?) IX, 255, 257

(— Requienii Parl.) IX, 256 (- Sorrentinii Parl.) IX, 258

 supinus Moench var. cylindricus (Koch) Husn. IX, 256

– var. fluitans (Link) Husn. IX, 256

 – var. nigritellus (Koch) Husn. IX, 256

 — var. uliginosus (Roth) Husn. IX, 256

\*- × togakushiensis (prismatocarpus var. Leschenaultii × xyphioides) Lévl. X, 352

(— triformis var. brachystylus Engelm.) VI, 76

Juniperus communis L. f. globosa Medw. VIII. 448 — var. Jackii Rehder VII. 359 - - f. ovata Medw. VIII, 448 (- - var. montana Ait.) VI, 242  $(--\times nana Wettst.)$  VI, 242  $(--\varepsilon)$  prostrata Willk.) VI, 242 - foetidissima Willd. var. squarrosa Medw. II, 136, VIII, 448 (- intermedia Schur) VI, 242 morrisonicola Hay. VIII, 366 - nana Willd. b. montana (Ait.) v. Hay. VI, 242 (- sibirica α montana Beck) VI, 242 Jurinea Kirghisorum D. Janisch. III, 30 - Tzar Ferdinandi David. IX, 564 (Jussieua japonica Lévl.) VIII, 138 - prostrata (Roxb.) Lévi var. \*Fauriei Lévi. VIII, 138 var. \*Parmentieri Lévl. VIII, 138
var. \*Philippiana Lévl. VIII, 138 \*- socotrensis Lévl. IV, 226 \*Justicia alpina Lindau I, 159 (- pectinata Vahl) IX, 305 (- procumbens Ind. Kew.) IX, 307 K. \*Kadsura Cavaleriei Lévl. IX, 459 \*Kadua herbacea Lèvl. X, 153 Kaempferia Kirkii K. Schum. var. elatior Stapf VII, 174 Kakosmanthus costulatus (Pierre mss.) Dub. IX, 335 - Sarawakensis (Pierre mss.) Dub. IX, 335 Kalanchoe angolensis N. E. Br. IV, 125 - magnidens N. E. Br. IV, 125 - Marinellii Pamp. IX, 405 - marmorata Bak. f somaliensis (Hook. f.) Pamp. IX, 405 - Quartiniana A. Rich. var. micrantha Pamp. IX, 406 - van Tieghemi R. Hamet IX, 410 Karwinskia Humboldtiana (R. et S.) Zucc. VIII, 297 Katafa Cost. et Poiss. nov. gen. IX, 537 crassisepalum Cost. et Poiss. IX, 537 Kennedya retrorsa Hemsl. V, 79 (Kentrophyta montana Nutt.) VIII, 11 - viridis Nutt.) VIII. 11 Kerstingiella Harms nov. gen. VII, 191 -- geocarpa Harms VII, 191 \*Keteleeria Esquirolii Lévl. VIII, 60 - formosana Hay. VIII, 367 Khaya madagascariensis Jum. et Perr. de la Bath. VI, 378; VIII, 199 Kibera officinalis (L.) V. Cal. VIII, 544 — polyceratia (L.) V. Cal. VIII, 544 Kigelia erythraeae Matt. IX, 254 - Ikbaliae De Wild. III, 161 - somalensis Matt. IX, 254

Klainedoxa cuprea v. Tiegh. V, 152 - Dybowskii v. Tiegh, V. 153 - lanceolata (Baill, ms.) v. Tiegh, V, - latifolia (Pierre) v. Tiegh. V, 153 - Lecomtei v Tiegli. V, 154 - longifolia (Pierre) v. Tiegh. V, 153 - macrocarpa v. Tiegh. V, 154 - macrophylla (Pierre) v. Tiegli. V, 153 - sphaerocarpa v. Tiegh. V, 154 - spinosa v. Tiegli. V, 152 --- Tholloni v. Tiegh. V, 153 Trillesii (Pierre) v. Tiegh. V, 153 tripyrena v. Tiegh. V, 154
Zenkeri v. Tiegh. V, 154 Knautia balcanica Davidoff, I, 126 Kneifia Sumstinei Jennings VI, 202 Kochia Massoni Ewart VIII, 408 - Murrayana Ewart and Rees IX, 67 (Koeleria albescens DC. B. cimbrica Aschers.) IV, 11 Alboffii Dom. I, 142 \* - argentina Dom. II, 89 - Bergii Hieron. II, 90 — — var. \*minor Dom. II, 91 - var. \*aristulata Dom. II, 91 — — — subvar. \*micatula Dom. II, 91 — — var. \*fallacina Dom. II, 91 (- candata Griseb., non Steud.) II, 92 (- ciliata Kern, var. danica Dom.) IV, 12 (- glauca ssp. arenaria Dum. var. intermedia Dom.) IV, 11 — — var. Cimbrica Ostenf.) IV, 11 - - B. intermedia Aschers.) IV, 11 - - ssp. intermedia Dom.) IV, 11 - - b. intermedia Fries) IV, 11 (— (Schk.) DC. var. intermedia (Ahlq.) Dom.) IV, 11 (— — — subvar. pseudolobata Dom.) IV, 11 gracilis Pers. var. \*boliviensis Dom. II, 93 - - var. cenisia Dom. I, 143 — — var. obscura Vel. I, 137 \*- Grisebachii Dom II, 92 — — var. \*rijoensis Dom. II. 93 — — var. \*catamarcensis Dom. II, 93 \*- Hieronymi Dom. II, 89 \*- Hosseana Dom. X, 54 - - var. \*capitata Dom X, 55 - var. \*Tafelii Dom. X, 55 — — var. \*typica Dom. X, 55 - - subvar, \*includens Dom. X, 55 (— intermedia Ahlq.) IV, 11 \*- Niederleinii Dom. II, 91 - var. \*mutica Dom. II, 92 - - var. \*pseudo-Bergii Dom. II, 92 phleioides Pers. var. pseudolobu-lata Degen et Dom. I, 142

Koeleria pseudocristata Dom. var. \*andicola Dom. II, 94

pyramidata (Lam.) var. danica Dom. IV, 12

— — subvar. pilifera Dom. IV, 12 subvar. pseudopubiculmis Dom. IV. 12

- splendens Presl b.) grandiflora Bertol. f. subpubescens Rohl. I, 24. — f. verticillata Rohl. I, 24

Kompitsia nov. gen. Cost. et Gall. VI, 380

 elastica Cost. et Gall. VI, 380 Kosteletzkya Chevalieri Hochr. III, 172 (Kränzlinella Tunguraguae O. Ktze.) X,

(Krameria canescens A. Gr., non Willd.) VI, 254

(-- var. paucifolia Rose) VI. 254

- diffusa Rose u. Paint. VI, 253 glandulosa Rose u. Paint. VI, 254

 Grayi Rose u. Paint. VI, 254 interior Rose u. Paint. VI, 254

– paucifolia Rose VI, 254

Krynitzkia barbigera Gray var. inops T. S. Brdg. IV, 12

( - Suksdorffii Greenm.) VIII, 267 \*Kuhlhasseltia Merrillii Schltr. IX, 437 \*Kummerovia Schindl. nov. gen. X, 403 \*- striata Schindl. X, 403

Kunzea bracteolata Maid. et Betch. V.

\*Labatia (?) bilocularis H. Winkl. VII,

\*Labordea (?) Fauriei Lévl. X, 157

\*Lactuca alliariaefolia Lévl. et Vant. VIII, 141

\* Beauverdiana Lévl. VIII, 450

\*— Cavaleriei Lévl. VIII, 450 \*- hoatiensis Lévl. VIII, 449

\*- Kouyangensis Lévl. VIII, 450 \*— multipes Lévl. et Vant. VI, 331

\*- Nakaiana Lévl. et Vant. VIII, 141 \*- nummularifolia Lévl. et Vant. VIII,

 perennis L. f. \*integrifolia Dom. I, 13 — — var. subintegrifolia Bornm. IX, 143

\*— quercus Lévl. et Vant. VIII, 140

\*- Senecio Lévl. et Vant. VIII, 140

\*— Sonchus Lévl. et Vant. VIII, 449 \*— Taquetii Lévl. et Vant. VIII, 140 \*— Taraxacum Lévl. et Nom. VIII, 141

\*Lagenocarpus bracteosus C. B. Cl. II, 145

Lagochilus Paulsenii Brip. VI, 70 Lamium amplexicaule × purpureum P. Cout. VIII, 461

(— coronatum Vant.) IX, 224

\*X— Coutinhoanum Fedde (L. amplexic. × purp. Cout.) VIII, 461

Lamium glaberrimum W. Tal. VI. 119 (- humile Max.) VIII, 111

- maculatum L. δ immaculatum Sireitsch. VIII, 227

Landolphia guyanensis (Aubl.) Pulle III, 290

- mamavo Cost. et Poiss. VIII, 817 — mamolava Cost. et Poiss, VIII, 317 \*Langlassea eriocarpa Wolff IX, 420,

Lantana Bahamensis N. L. Britt. V, 183 - balsamifera N. L. Britt. VI, 247

\*- costaricensis Hay. II, 162 \*— Cummingiana Hay. II, 161 — demutata Millsp. VII, 283

- depressa Small III, 292

\*— glandulosissima Hay. II, 161 — hispida H. B. K. IX, 363 \*- malabarica Hay. II, 163

\*— maxima Hay. II, 164 \*- ovata Hay. II, 163

- ovatifolia N. L. Britt. VI, 247 — polyacantha Schauer IX, 363

radula Sw. ssp. glabrescens v. Hay. VI, 124

\*- Sprucei Hay. II, 162 \*— urticoides Hay. II, 162 \*- veronicifolia Hay. II, 163

Lappa nemorosa Körn. var. \*microcephala Erdn. II, 96

 officinalis All. × tomentosa Lam. f. intermedia Erdn. II, 96

— — × — f. subofficinalis Erdn. II, 96 — — × — f. decalvata Erdn. II, 97

- Palladini B. Marcow. II, 135 Lappula anoplocarpa Greene VI, 29 Larix Cajanderii Mayr VIII, 90

— decidua Mill. var. & alba (Carr.) v. Hay. VI, 241

— — lusus virgata (Hemp. u. Wilh.) v. Hay. VI, 241

(— europaea var. alba Carr.) VI, 241 (— — var. virgata Hemp. u. Wilh.) VI, 241

- Principis Rupprechtii Mayr VIII, 90 Lasiocoma Bol. nov. gen. VII, 131 — petrophiloides (DC.) Bol. VII, 132

Lasiopetalum longistamineum Maid. et Betch. V, 81

Lasiopogon brachypterus O. Hoffm. III, 258; VI, 371

Lasiorrhiza achillaeifolia (Hook. et Arn.) Macl. IV, 142

candidissima (Gill. et Don) Macl. IV, 142

— gossypina (H. et A.) Macl. IV, 142

gracilis (Alb.) Macl. IV, 142
Hahnii (Franch.) Macl. IV, 142 - Hoffmanni (Dus.) Macl. IV, 143

— ibari (Phil.) Macl. IV, 142 - lanata (Alb.) Macl. IV, 143

lanigera (O. Hoffm.) Macl. IV, 143

116 Lasiorrhiza patagonica (Speg.) Macl. IV, 143 – purpurea (DC.) Macl. IV, 143 - scrobiculata (DC.) Macl. IV, 143 - stricta (Phil.) Macl. IV, 143 - suaveolens (DC.) Macl. IV, 143 (Lastrea borneensis Hk.) X, 324 (- Filix mas var. deorso lobata Moore) VI, 184 (— — var. incisa Moore) VI, 184 (Lathraea gesnerioides König) VII, 163 Lathyrus annuus L. f. luxurians Rohl. I, 22 Dominianus Litw. IX, 556 \*— Fauriei Lévl. VII, 230 hirsutus L. var. α typicus Schust. 11. 95 — — var.  $\beta$  pusillus Schust. II, 95 laxiflorus (Desf.) Kuntze var. glabratus (Griseb.) Hand.-Mzt. X, 308 - paluster L. var. heterophylloides Schust. II, 95 \*- Vanioti Lévl. VII, 230 vernus Bernh. β flaccidus Ces. Pass. c Gib. b. angustifolius Bolz. VIII, 254 - — f. variegatus Schust. II, 95 \*Laurembergia Mildbraedii Schindl. IX, 124 (Laurus umbellata Thunbg.) III, 152 Lavandula Buchii Webb et Berth. var. Tirajanae Pit. IX, 379 pedunculata Cav. β brevicoma P. Cout. VIII, 462 — α longicoma P. Cout. VIII, 462 — — var. maderensis Benth. IV, 44 – stoechas L. var. 1. albiflora Mer. VII, 366 — — var. 2. elongata Mer. VII, 366 Leandra caquetana T. A. Spr. II, 139 Lebetanthus myrsinites (Lam.) Macl. IV, 138 \*Lecanorchis Ridleyana Schltr. IX, 428 Lectandra nov. gen. Sm. V, 299

— parviflora Sm. V, 299 Lecythis costaricensis Pitt. VIII, 473 – praealta T. A. Spr. II, 138 Ledum columbianum Piper VIII, 13 \*Leea Dielsii Lévl. VIII, 58 nova-guineensis Th. Val. V, 384 \*— theifera Lévl. VIII, 58 Leersia dubia Aresch. X, 299 (- oryzoïdes Sw.) III, 137 Legousia falcata (Ten.) Fritsch VIII, 257 – pentagonia (L.) Thell. V, 367 (Leontice Ewersmanni Bunge) IV, 45 - Leontopodium L. var. Ewersmanni (Bunge) O. Pauls. IV, 45 Leontodon autumnalis L. forma major E. Steiger IV, 71

— — var. Merinoi Pau VIII, 286

Leontodon farinosus Mer. et Pau VIII, 287 - finalensis Bickn. VII, 348 (- graecus Boiss. et Heldr.) VIII, 287 — hispidus var. alpicola Chen. III, 91 — f. bicephalus E. Steig. IV, 71 — — var. 3. pinnatifidus Mer. VIII, 287 (- incanus var. tenuiflorus f. finalensis Bickn. VIII, 494 (- montanus C. A. M.) VI, 149 ×— nivatensis (Mer.) Pau (L. Borgi × microcephalus Pau) VIII, 135 — pyrenaicus Gouan var. cadubricus Pamp. VII, 187 (— var. nivatensis Mer.) VIII, 135 — a. pubescens Vacc. VIII, 364 — b. Sommieri Vacc. VIII, 364 Taraxaci Lois. var. minor Mer. VIII, 286 – tenuiflorus Rchb. var. finalensis Bickn. VIII, 494 Leontopodium japonicum Thunb. var. \*sandwicense Lévl. X, 121 (Leonurus ambiguus Mak.) VIII, 110 \*Lepanthes acuminata Schltr. X, 355 \*— guatemalensis Schltr. X, 355 \*— ināequalis Schltr. X, 356 \*— Koehleri Schltr. X, 386 \*— oreocharis Schltr. X, 483 \*— scopula Schltr. X, 356 \*— stenophylla Schltr. X, 396 \* Tuerckheimii Schltr. X, 357 \*- Werklei Schltr. X, 396 Lepechinia spicata Willd. VIII, 310 (Lepia Bonanniana Presl) V, 89 (— stylosa Webb) V, 90 (Lepidium abyssinicum Hochst.) V, 122 (— aethiopicum Welw.) V, 127 — africanum (Burm.) DC. var. aethio-picum (Welw.) Thell. V, 127 — — var. Burchelli Thell. V, 127 — — var. capense (Thunbg.) Thell. V, 126 — — var. serratum (Thunbg.) Thell. V, 127 — — f. glabratum Thell. V, 127 — var. typicum Thell. V, 126 — alpigenum A. Rich. V, 123 - Armoracia Fisch. et Mey. ssp. 1. abyssinicum (Hochst) Thell. V, 122 — ssp. intermedium (A. Rich.) Thell. V, 92 - - var. alpigenum (A. Rich.) Thell. V, 123 — — var. typicum Thell. V, 122 - atlanticum (Ball.) Thell. V, 88 (— Bonannianum Guss.) V, 89 (— calycotricum Kze.) VIII, 133 (— calycotrichum Deb.) V, 89 campestre R.Br.f. prostratum Vollm. II. 94

(— capense Burch.) V, 127

Lepidium hyssopifolium (Desv.) (Lepidium capense Thunbg.) V, 126 var. integerrimum Thell. V, 363 (- chalepense L.) V, 87 (- iberioides Desv.) V, 94 (- corsicum Gay) V, 90 (— iberis Sieb.) V, 94 (— intermedium A. Gr.) V, 92 (— intermedium A. Rich.) V, 123 (- densillorum Schrad.) V, 92 - dhayense Munb. V, 89 (- divaricatum Soland.) V, 92 (- linoides Thunbg.) V, 92 - subsp. III. Eckloni (Schrad.) (- - var. pumilum Sond.) V, 95 Thell. V, 94 (— Magnolii Bub.) V, 89 (— medium Greene) V, 92 — — var. hirtellum (Sond.) Thell. — monticola Brandeg. III, 374 (— nebrodense Guss.) V, 89 (— nudicaule L.) X, 289 (— oxyotum DC.) V, 90 V, 95 - - var. pumilum (Sond.) Thell. V, 95 \_ \_ \_ var. silvaticum (Eckl. et Zeyh.) Thell. V, 95 (- petrophilum Coss.) V, 90 - ssp. I. eudivaricatum Thell. V,92 (- phlebopetalum F. v. M.) V, 81 - - var. dissectum Thell. V, 92 (- pinnatum Eckl. et Zeyh.) V, 95 - - ssp. II. linoides (Thell.) Thell. - Thunbg. var. pinnato - incisum V, 92 Thell. V, 125 — — var. iberioides (Desv.) Thell. — var. typicum Thell. V, 125 (— pubescens Tineo) V, 89 (— rosulatum Tornab.) V, 89 V, 94 — — var. subdentatum (Burch.) Sond. V, 93 rotundum DC. var. phlebopetalum
 Maid. et Betch. V, 81 - - var. typicum Thell V, 93 (- diversifolium Pers.) V, 126 (- ruderale Melliss) V, 94 (- Draba Desne.) V, 88 (- - var. aethiopicum Hiern) V, 127 - Draba L. ssp. chalepense Thbg. (- - var. alpigenum Oliv.) V, 123 - sativum L. ssp. I. eusativum Thell. (- - var. chalepense Spach) V, 87 V, 91 - var. matritense (Pau) Thell. V, - - var. Schimperi Thell. V, 91 - - var. silvestre Thell. V, 91 362 — b. lucanum Terracc. V, 136 — ssp. II. spinescens (DC.) Thell. - b. lucanum Terracc. V (- Eckloni Schrad.) V, 94 - erinaceum Boiss.) IV, 163 (- flexuosum Eckl. et Zeyh.) V, 126 V, 91

— Schinzii Thell. V, 124

— Schweinfurthii Thell. V, 123 - granatense Coss.) V, 190 (- Gussoni Schrad.) V, 89 (— serratum Thunbg.) V, 127 (— Sieberi W. Mann) V, 89 (— silvaticum Eckl. et Zeyh.) V, 95 - heterophyllum Boiss.) V, 90, 91 (- hirtellum Sond.) V, 95 (— hirtum DC.) V, 89 – var. brachystylum (Willk.) Pau (- spinescens DC.) V, 91 (— stylatum Lag. et Rodr.) V, 90 (— subdentatum Burch.) V, 93 VIII, 133 - ssp. VII calycotrichum (Kunze) Thell. V, 90 (- texanum Buckl.) V, 92 - var. calycotrichum (Kze.) Pau - virginicum L. ssp. euvirginicum VIII, 133 Thell. V, 91 (- - ssp.III. dhayense (Munby) Thell.) - - var. sublateriflorum Thell. V, 363 (— ssp. I. euhirtum Thell.) V, 89 (— ssp. II. nebrodense (Rafin.) — ssp. texanum (Buckl.) Thell. V, 91 (Lepidophyllum abietinum (Phil.) Reiche) Thell.) V, 89  $(--\beta)$  nebrodense Fiori et Paol.) V, - phylicaeforme (Meyen) Hieron. III, Lepisanthes assamica Radlk. VIII, 186 — ssp. VI oxyotum (DC.) Thell. basicardia Radlk. VIII, 188
granulata Radlk. VIII, 187 (-- var. parviflorum Pau) VIII, 133 -- ssp. IV petrophilum (Coss.) - Lamponga Radlk. VIII, 188 Listeri (King Mss.) Radlk. VIII, 187 Thell. V, 90 (Leptinella peduncularis DC.) IV, 139 (- var. psilopterum Willk.) VIII, 133 \*Leptochilus Bradeorum Rosenst. IX, 70 — ssp. V stylatum (Lag. et Rodr.) Thell. V, 90 - contaminoides var. \*lobulata Christ (- - α typicum Fiori et Paol.) V, 89 VI, 351 cuspidatus (Prsl.) var. \*marginalis

Rosenst. IX, 426

(- humifusum Coss.) V, 90, 91

(- humifusum Requien) V, 90

(Leptochloa bipinnata Hochst.) VIII, 300

- perennis Hack, IV, 113

– virgata Beauv. var. Hack. VI, 345 \*puberula

(Leptocoryphium penicilligerum Speg.) IV, 273

\*Leptodermis Esquirolii Lévl. IX, 324 Leptoloma A. Chase nov. gen. IV, 30

- coenicola (F. Muell.) A. Chase IV,30 — cognata (Schultes) A. Chase IV, 30 - divaricatissima (R. Br.) A. Chase

- macratenia (Benth.) A. Chase IV, 30 Leptopteris alpina Bak. var. \*major Rosenst. X, 342

(Leptosiphon bicolor Nutt.) VIII, 15 Leptospermum parviflorum Th. Val. V, 386; VII, 182

Lepyrodiclis cerastioides Kar. et Kir.

var. integra Litw. VI, 63 Lereschia Flahaultii J. Woron. II, 137; III, 391

(Leria integrifolia Cass.) IV, 141 Leschenaultia Drummondiana Col. VII,

\*Lespedeza angulicaulis (Harms mss.) Schindl. IX, 522

\*— Balfouriana (Diels mss.) Schindl. 1X, 522

(- Buergeri Maxim.) IX, 514 \*— Dielsiana Schindl. X, 404

\*— dubia Schindl. IX, 514 (— eriocarpa Max.) IX, 519

(- eriocarpa Diels) IX, 520

(— — DC. var. polyantha Franch.) 1X, 520

\*— Fauriei Lévl. VII, 230

\*- Feddeana Schindl. X, 405 \*- Forrestii Schindl. X, 406 \*— Friebeana Schindl. IX, 514

\* Giraldii Schindl. IX, 518

\*— glauca Schindl. IX, 517 \*— Henryi Schindl. IX, 517 \*— ichangensis Schindl. IX, 515

\*— indica Schindl. IX, 515 (— macrocarpa Diels) IX, 516, 518

(— macrocarpa Hemsl.) IX, 515 (— macrostyla Max.) IX, 514

\* Meeboldii Schindl. IX, 521

\*— Muchleana Schindl. IX, 517

\*— polyantha Schindl. IX, 520

\*— Rosthornii Schindl. IX, 516

\*— speciosa Royle IX, 519

(— stipulacea Max.) X, 403

( — striata Hook. et Arn.) X, 403 Lesquerella flexuosa Brdg. III, 374 \*Lettsomia Seguini Lévl. IX, 452

Loucanthemum ageratifolium C. Pau III,

— pluriflorum C. Pau III, 323

— valentinum C. Pau III, 323

- vulgare Lamk. var. 1. Casali Mer. VIII, 64

Leucanthemum vulgare var. 2. crassifolium (Lange) Mer. VIII, 64

\*Leucas Acloquei Lévl. IX, 222

\*— Barbeyana Lévl. IX, 247 (Leuceria achillaeifolia Hook. et Arn.)

(— candidissima Gill. et Don) IV, 142 (— gossypina Hook, et Arn.) IV, 142

(- gracilis Alb.) IV, 142 - Hahnii Franch.) IV, 142

(- Hoffmanni Dus.) IV, 143 (— ibari Phil.) IV, 142 (— Ianata Alb.) IV, 143

 Ianigera O. Hoffm.) IV, 143 patagonica Speg.) IV, 143

— purpurea Hook, et Arn.) IV, 143

- stricta Phil.) IV, 143

Leucophaë argosphacelus Webb Berth. var. α genuina Pit. IX, 380

var. γ spicata Pit. IX, 381

var. β tomentosa Pit. IX, 381

\*Leucolaena borneensis Schltr. IX, 428 - canariensis Webb et Berth. var. α Orotavensis Pit. IX, 380

— — var.  $\beta$  Mercedesi Pit. IX, 380

Lotsyi Pit. IX, 381

- Massoniana Webb et Berth. var.

β albida Pit. IX, 380 - Penzigii Pit. IX, 380

\*Leucosceptrum Bodinieri Lévl. IX, 224 Leurocline mauritanica Ed. Bonnet IX,

Leyssera montana Bol. IV, 197 Liabum polymnioides R. E. Fr. III, 251 Lichtensteinia Kolbeana Bol. IV, 195 Ligularia Hodgsonii Hook. var. sacha-

linensis Koidz. IX, 137 - jaluensis Kom. var. rumicifolia Kom.

V, 277

\*Ligusticum acuminatum Koelme I, 9

– acutissimum Koehne 1, 8 \*- Esquirolii Lévl. X, 147

— macrocarpum Koehne I, 10

 ovatum Wolff IX, 421 — Prattii Koehne I, 11

 Regelianum hort. Siebold; descr. Koehne I, 9

\*— Taquetii Lévl. X, 378 \*— Thea Lévl. et Dunn X, 147

\*Lilium Fauriei Lévl. et Vant. V, 282

\*— graminifolium Lévl. et Vant. V, 283

— longiflorum L. var. \*purpureoviolaceum Lévl. Vl, 264

\*— Majoense Lévl. VI, 265

\*— Pyi Lèvl. VI, 263

\*— Taqueti Lévl. et Vant. V, 283

\*- Tenii Lévl. VI, 263

\*Limeum echinatum H. Walter VIII, 55 \*— myosotis H. Walt. VIII, 56

\*— nummulifolium H. Walt. VIII, 55

\*Limnanthemum coreanum Lévl. VIII,

(— nymphaeoïdes Link) VIII, 437

(— peltatum Gmel.) VIII, 437 \*— Taquetii Lévl. VIII, 285

- verrucosum R. E. Fr. IV, 206 Limnophila trichophylla Kom, V, 273 Limodorum pinetorum Small III, 264 (-- striatum Thbg.) X, 255

(Limonia glutinosa Blanco) VIII, 489 - patagonicum (Speg.) Macl. IV, 138 (Linanthus bicolor Greene) VIII, 15

(Linaria Broteri Rouy) VIII, 217 caesia (Lag.) DC. var. γ Broteri (Ronv) P. Cout. VIII, 217

 $(--\beta)$  decumbers Lge.) VIII, 217 (— — β maritima f. Broteri Samp.) VIII,

217 – – f. decumbens Samp.) VIII,

 – var. β polygalaefolia (Hoffgg. et Lk.) P. Cout. VIII, 217

(- dealbata Hoffgg. et Lk.) VIII, 217 - Elatine Desf. var. eriopoda Duff. VII, 348

 filifolia β glutinosa Fic. VIII, 217 – var. β Welwitschiana (Rouy)

P. Cout. VIII, 217

\*- kulabensis B. Fedtsch. X, 380 (- lanigera Hoffgg. et Lk.) VIII, 216

- Masedae Mer. et Pau VII, 363 (- meonantha Hoffgg. et Lk.) VIII, 218 - minor Desf. var. sanguinea Reyn. VII. 348

- pinifolia (Poir.) Thell. X, 291 (- polygalaefolia Hoffgg. et Lk.) VIII, 218

(- racemigera Rouy) VIII, 217

(- reticulata Desf.) X, 291 - Ricardoi P. Cout. VIII, 217

— spartea (L.) Hoffmgg. et Lk.  $\beta$ expansa Samp. IV, 384; VIII, 218

— var.  $\delta$  meonantha (Hoffgg. et Lk.) P. Cout. VIII, 218

(- β ramosissima Bth.) VIII, 218

(- Welwitschiana Rouy) VIII, 217 (— — γ ramosissima Lge.) VIII, 218

(- - γ virgatula Samp.) VIII, 218

(- spuria β racemigera Lange) VIII,

(— supina γ maritima Fical.) VIII, 217 triornithophora L. var. debilis Mer. VII, 363

- Urbanii Pitard IX, 379

\*— vulgaris Mill.f.\*perglandulosa Rohl.

1, 14 \*- - f. \*verticillata Rohl. I, 14 \*Lindera Bodinieri Lévl. X, 371 \*— camphorata Lévl. IX, 459

\*Lindera Cavaleriei Lévl. X, 371 \*— Dielsii Lévl. X, 370

\*— Esquirolii Lévl. IX, 327 \*— yunnanensis Lévl. X, 371

\*Lindsaya Christii Rosenst. IV, 292

\*- crassipes Rosenst. V, 36 \*- Francii Rosenst. IX, 73

(— Merrillii Copel.) V, 370 \*— Werneri Rosenst. V, 37

\*Linociera Hassleriana (Chod.) Hassl. VIII, 44

Linum Carteri Small III, 266 (— catharticum Posp.) VIII, 436

(- catharticum L.) VIII, 436 — — subsp. A. catharticum (L.) v.

Hay. VIII, 436 - subsp. B. suecicum (L.) v. Hay.

VIII, 436

\*— Cavaleriei Lévl. et Vant. V, 9 — Curtissii Smail III, 266

 Jimenezi Pau III, 327 ) — Munbyanum Bonnet) V, 204 — numidicum Murb. V, 204 \*Liparis celebica Schltr. X, 28

\*— concava Schltr. IX, 283

confusa J. J. Sm. X, 28 (— disticha Schltr.) X, 29 \*— ficicola Schltr. X, 26 \*— Finetiana Schltr. X, 29

(- gibbosa Finet) X, 29 \* Le Ratii Schltr. IX, 213

— Minahassae J. J. Sm. X, 28 \*— minima Ldl. X, 28

- phyllocardium Schltr. IX, 94 - var. \*minor Schltr. IX, 95

\*— punctifera Schltr. X, 27 \*- quadribullata Schltr. X, 29 \*— rotundifolia Cogn. VI, 305

savaiiensis Fleischm. et Rech. IX,94

\* stricta Schltr. IX, 95 \*— Werneri Schltr. X, 250

\*Lipochaeta asymetrica Lévl. X, 122

\*— Fauriei Lévl. X, 122 \*— variolosa Lévl. X, 122 \*Lippia adpressa Hay. II, 87

- Berlandieri Schauer IX, 363 - bicolor Kunth et Bouch. IX, 365 — callicarpifolia H. B. K. IX, 365

– – var. \*Briquetiana Loes. IX, 366

\*- candicans Hay. II, 86 Ivcioides Steud. IX, 363 - geminata H. B. K. IX, 365

- myriocephala Cham. Schldl. IX, 364

- nodiflora Rich. IX, 364 - pedunculata Pears. IV, 25

\*— pedunculosa v. Hay. II, 87 (— Pringlei Briq.) IX, 365

\*— reticulata Hay. II, 87 sidioides Cham. f. flaccida v. Hay.

VI, 124 – Wrightii Gray IX, 363 \*— Yucatana Loes. IX, 364 Lissochilus Mahoni Rolfe III, 190

morrumbalaensis De Wild, III, 163

 Ugandae Rolfe III, 190 Eschscholtziana Max. (Listera

Cham.) VI, 283 - japonica Franch, et Sav. non Bl.)

VI. 283 — nipponica Mak. VI, 285

— ovata (L.) Br. trifoliata Bolz. IX, 187

- Savatieri (Max.) Mak. VI, 283

– Yatabei Mak. VI, 285 Listrostachys hamata R. A. Rolfe IV, 167 Lithachne pineti (Wright) A. Chase IX, 38 Lithospermum albiflorum Vaniot II, 156

(— euchromon Royle) IV, 47 — Komarowianum Lévl. VIII, 280

- Iucanum Terracc. V, 139

- tschimganicum B. Fedtsch. III, 56 Litorella lacustris L. f. stolonifera Semler II. 100

\*Litsea Cavaleriei Lévl. X, 371

\*- coreana Lévl. X, 370 \*— Dunniana Lévl. IX, 460

\*— Esquirolii Lévl. IX, 459 \*— Lobelia Cavaleriei Lévl. IX, 460

minutiflora C. Pau III, 322

puberula var. pauciflora B. F. Bush

IV, 215

— strictiflora (Rydb.) Lun. VIII, 247 Lobogyne bracteosa Schltr. IX, 96 Lobularia intermedia Webb et Berth. var.  $\delta$  argyrea Pit. IX, 206

— — var.  $\beta$  elongata Pit. IX, 206

— — var. intricata Pit. IX, 206

 — var. ε Palmensis Webb subvar. alba Pit. IX, 206

— — subvar. violacea Pit. IX, 206 var. subspinescens Pit. IX, 206

\*Lockhartia costaricensis Schltr. III, 81 Loeflingia Tavaresiana Samp. IV, 383

Lolium temulentum L. var. macrochaetum A. Br. subvar. laeve Thell. V, 362

- — var. semiglabrum Litw. IV, 10 Lomatium artemisiarum Piper VIII, 13 (— macrocarpum var. artemisiarum Piper) VIII, 13

\*Lonchitis reducta C. Chr. IX, 370 Lonchocarpus sericeus H. B. K. subsp. \*paraguariensis Hassl. VIII, 207

- speciosus Bol.) II, 15

Lonicera alpigena L. var. \*phaeantha Rehd. VI, 272

- altissima O. E. Jennings VI, 120 × amoena Zabel var. Arnoldiana (L. Korolkowii × tatarica) Rhed. VIII, 346

\*— anisocalyx Rehd. VI, 271 (- chrysantha Graebn.) VI, 269 \*- Fauriei Lévl. et Vant. V, 100

 Fernandii Franch. f. c. Beissneriana Zab. VIII, 346

Lonicera Fernandii f. a. Franchetii Zab. VIII, 346

– f. d. leycesterioides (Gräbn.) Zab. VIII, 346

- f. b. vesicaria (Kom.) Zab. VIII, 346

\*- Graebneri Rehd. VI, 273

(- hispida Max. non Pall.) VI, 271 - Koehneana Rehd. var. \*chrysanthoides Rehd. VI, 275

— — var. \*intecta Rehd. VI, 275

— — var. \*pallescens Rehd. VI, 274 — Korolkowi Stapf var. \*aurora Koehne VIII, 31

\*- leptantha Rehd. VI, 274 \*- mamillaris Rehd. VI, 269

(— Maximowiczii Graebn., non Reg.) VI, 273

mitis Rehd. VI. 271

- var. Hobsonii Rehd. VI, 271

- modesta Rehd. VI, 273 (— Morrowii Graebn.) VI, 269 — myrtilloides Purp. VII, 361 \*— nubigena Rehd. VI, 270

\*— Pampaninii Lévl. X, 145 — perulata Rehd. VI, 272

- prostrata Rehd. VI, 275 \*- proterantha Rehd. II, 66 \*- Rehderi Lévl. X, 145

\*- shensiensis Rehd. VI, 269 \*- vaccinioides Rehd. VI, 272 \*Lopezia Glazioui Lévl. IV, 226

Lophanthus Cypriani Pav. IX, 274 Lophogyne capillacea Pulle III, 287 Lophopappus cuneatus R. E. Fr. III, 253 Loranthus aurantiacus Engl. var, parviflorus Engl. V, 336

- Dregei Eckl. et Zeyh. var. sub-

curvifolius Engl. V, 336 Menyhardtii Engl. V, 336Owatarii Hayata VI, 199

 quinquangulus Engl. V, 336 - sambesiacus Engl. V, 337

Lotononis swaziensis Bol. VII, 124 - trifolioides Schltr. III, 191; VI, 358 Lotoxalis angustifolia (H. B. K.) Rose VI, 261

dichotoma Rose VI, 261

— fasciculata (Turcz.) Rose VI, 261

— glabrata (Bak.) Rose VI, 261 — Neaei (DC.) Rose VI, 261

 occidentalis Rose VI, 261 — pentantha (Jacq.) Rose VI, 261

— psilotricha (Turcz.) Rose VI, 261 — yucatanensis Rose VI, 262

- tephrodes (Turcz.) Rose VI, 262

Lotus Borzii Pit. IX, 274

 corniculatus L. b. Iucanus Terracc. V, 138

(- dorycnoides Poir.) IX, 275

- glaucus Ait. var. γ angustissimus Pit. IX, 275

Lotus glaucus vat.  $\zeta$  sessilifolius (DC.) Pit. 1X, 275

– var. δ suffruticosus Pit. IX, 275

 – var. ε villosissimus Pit. IX, 275 \*— Mascaënsis Burch, VII, 328

(- pentaphyllos Lk.) IX, 275

(— sericeus Pursh) VII, 218 (— sessilifolius DC.) IX, 275

Loxocalyx ambiguus Mak. VIII, 110 — humilis Max. VIII, 111

\*— Vaniotiana Lévl. IX, 224

Loxogramme salicifolia Mak. VIII, 113 Lucinaea billitonensis Val. IX, 311 (Lucuma spinosa Mol.) VIII, 489

(— splendens DC.) IV, 138 Lühea microcarpa R. E. Fries VIII, 385 — — var. \*polymorpha Hassl, VIII, 43

- rugosa Pulle X, 407

Lugonia micrantha Malme III, 362 \*Luisia boninensis Schltr. II, 171 \*— celebica Schltr. X, 191

Lunasia amara Blanco var. costulata Hochr. VII, 11

– – var. genuina Hochr. VII, 11

(— costulata Miq.) VII, 11

Lupinus alpicola (Henders.) B. L. Rob. VII, 216

(- arcticus S. Wats.) VII, 217

- canescens var. amblyophyllus B. L. Rob. VII, 216

 laxiflorus f. theiochrous B. L. Rob. VII, 218

 leucophyllus var. plumosus (Dougl.) B. L. Rob. VII, 216

(— nootkatensis Kjellm.) X, 511 — Donn var. Kjellmanii C.

Ostenf. X, 511

– ornatus subsp. bracteatus B. L. Rob. VII, 217

- Piperi B. L. Rob. VII, 215

Piperi ssp. imberbis B. L. Rob. VII, 216

(- plumosus Dougl.) VII, 216

- subalpinus Piper et B. L. Rob. VII, 217

- subsericeus B. L. Rob. VII, 216 - Suksdorfii B. L. Rob. VII, 216 Luvunga borneensis Hochr. V, 348

Luzula campestris DC. var. intermedia Koidz. 1X, 136

— ssp. multiflora Lej. var. pallescens (Hoppe) Husn. IX, 259

(- flavescens Gaud.) Ill, 142 - luzulina (Vill.) D. T. et Sarnth. Ill,

142 – nemorosa (Pollich) E. Meyer var.

flaccida Buchen. Ill, 142

(— pallescens Hoppe) IX, 259 ×— Schulzorum (L. nemorosa × nivea B. rubella R. et O. Schultz) D. T. et Sarnth. III, 142

Lychnis flos-cuculi L. b. nana Bolz. VIII, 254

\*— nesophila Holm III, 338

Lycium spathulifolium N. L. Britt. V, 184 \*Lycopodium andinum Rosenst. V, 239

\*- Bradeorum Christ VIII, 20 \*- Haeckelii Herter V, 22

 pseudo-squarrosum Pamp. VII, 187 (— squarrosum Drake de Cast.) VII, 187

\*Lycopus Cavaleriei Lévl. VIII. 423

\* coreanus Lévl. VIII, 423

 europaeus L. var. \*sinensis Lévl. VIII, 423

 exaltatus L.fil. α glabratus Sireitsch. VIII. 227

(- lucidus var. Maackianus Max.) V.

 Maackianus Kom. V, 273 (- sinuatus Regel) V, 273

Lygodesmia juncea (Pursh) D. Don var. racemosa Lun. VIII, 247

Lygodium dimorphum Copel. X, 343 novoguineense Rosenst. IX, 427; X, 343

Lysimachia Bodinieri Petitm. IV, 318 – daphnoides A. Gr. var. \*Fauriei Lévl. X, 156

latronum Lévl. et Vant. Vl, 372

Léveilléi Petitm. IV, 317

longisepala Ch. N. Forbes IX, 372

 marginata Macl. IV, 138 - mixta Mer. VII, 362

 remota Petitm. IV, 317 \*Lysionotus Cavaleriei Lévl. VI, 264; IX, 328

\*Lythrum Argyi Lévl. IV, 330

Salzmanni var. ambiguum A. Fouill. VIII, 212

## M.

(Maba hermaphroditica Zoll.) VII, 16 Teysmannii Hiern f. latifolia Hochr.

Zollingeri Hochr. VII, 16

\*Macaranga alchorneoides Pax Lingelsh. III, 25

 quinquelobata Beille VIII, 319 - Thonneri De Wild, X, 427

Machaeranthera canescens var. viscosa (Nutt.) Piper VIII, 271

latifolia Nelson V, 219
paniculata Nelson V, 220

\*Machilus camphoratus Lévl. IX, 460

– formosana Hay. VI, 198 Macodes celebica Rolfe X, 10

Macrocalyx Cost. et Poiss. nov. gen. 1X, 538

- tomentosa Cost. et Poiss. IX, 538 \*Macrocarpaea chlorantha Gilg II, 53

\*— Weberbaueri Gilg II, 54 \*Macrolobium stenosiphon Harms III, 51 Macronema lineare var. canescens A. Nels. IX, 485 (- molle Greene) VIII, 271 \*- tortuosum Herzog VII, 68 (Macrorhynchus australis Phil.) IV, 143 (— pterocarpus F. et M.) IV, 144 (— pumilus DC.) IV, 144 (Macrotomia cyanochroa Boiss.) IV, 48 euchromon (Royle) O. Paulsen IV, 47 (- onosmoides Rgl. et Smirn.) IV, 47 (— perennis Boiss.) IV, 47 Macrozanonia Cogn. nov. gen. IV, 381 — macrocarpa (Bl.) Cogn. IV, 381 (Madia capitata Nutt.) Vill, 271 exigua var. macrocephala (Suksd.) Piper VIII, 271 (- filipes var. macrocephala Suksd.) VIII, 271 - madioides (Nutt.) Piper VIII, 271 (- Nuttallii A. Gr.) VIII, 271 – sativa var. capitata (Nutt.) Piper VIII, 271 (— — var. congesta Torr. et Gr.) VIII, 271 Maerua racemosa Lanza IX, 412 \*Maesa aurea Lévl. X, 375 \*— Blinii Lévl. X, 376 \*— Boni A. DC. VIII, 353 \*— Cavaleriei Lévl. IX, 462 \* Dunniana Lévl. IX, 463 \*\_ Elmeri Mez III, 97 \*— Esquirolii Lévl. IX, 462 \*— Labordei Lévl. IX, 462 \*— Martini Lévl. IX, 462 \*— myrsinoides Lévl. X, 375 \*— parvifolia A. DC. VIII, 353 \*— scandens Lévl. X, 375 \*— singuliflora Lévl. X, 440 Magnolia grandiflora L. ssp. Kathariniana Bedelian VII, 237 - Martini Lévl. VI, 374 Mahonia Aquifolium f. albo-variegata v. Schwerin VIII, 348 - - f. amabilis v. Schw. VIII, 348 — — f. aucubiflora v. Schw. VIII, 348 — f. aureo-variegata v. Schw. VIII, — f. lutescens v. Schw. VIII, 348 arguta Hutch. VIII, 365 \* ganpinensis (Lévl.) Fedde VI, 372 (Majanthemum bifolium DC. var. dilatatum Wood) VI, 78 - b. unifolium Bolz. IX, 406 (Malachium coeruleum Jaub. et Spach) VII, 287, 386 (Malacocarpus Courantii Salm-Dyck) VIII, 224 (— tephracanthus K. Schum.) VIII, 224 \*Mallotus Esquirolii Lévl. IX, 327, 461 (— Esquirolii Lévl.) X, 144 \*- Léveilléanus Fedde X, 144 Malmea nov. gen. R. E. Fr. II, 190

— obovata R. E. Fr. II, 190

(Malpighia (?) faginea Sw.) V, 63 (— obovata H. B. K.) V, 60 — volubilis Sims) IX, 270 Malus baccata (L.) Borkh. var. himalaica (Max.) C. K. Schn. III, 178 – var. mandschurica (Max.) C. K. Schn. III, 178 – — var. mandschurica (Max.) Koidz. IX, 136 — — var. sibirica (Max.) C. K. Schn. III, 178 coronaria (L.) Mill. var. ioensis (Wood) C. K. Schn. III, 178 ( dasyphyllus Borkh, III, 178 - florentina (Zucc.) C. K. Schn. III, - fusca (Raf.) C. K. Schn. III, 178 ×— Hartwigi (M. baccata × Halliana) Koehne VI, 337 \*— kansuensis (Batal.) C. K. Schn. III, — Macounii Greene IV, 208 (- Pratti (Hemsl.) C. K. Schn.) III, 178 - pumila Mill. var. domestica (Borkh.) C. K. Schn. III, 178 – var. Niedzwetzkyana (Dieck) C. K. Schn. III, 178 – var. paradisiaca (Med.) C. K. Schn. III, 178 – var. praecox (Pall.) C. K. Schn. III, 177 silvestris Mill. var. hortulana C. K. Schn. III, 177 transitoria (Batal.) C. K. Schn. III, — trilobata (Labil.) C. K. Schn. III, 179 — var. oxyloba (Boiss.) C. K. Schn. III. 179 yunnanensis (Franch.) C. K. Schn. III, 179 \*Malya hawaiensis Lévl. X, 120 – moschata L. var. decalvata K. Johansson IX, 493 — — f. subglabra K. Joh. IX, 493 Malvastrum amblyphyllum R. E. Fr. IV, 105 \*— Buchtieni Pax VII, 243 - hypomadarum Sprague VIII, 367 scabrum Grcke. var. \*paraguariense Hassler VIII, 34 Mamillaria camptotricha Dams III, 144 Celsiana Lem. var. guatemalensis Eichlam VIII, 240 ceratites Quehl VIII, 431 chapinensis Eichlam et Quehl VIII, 236

— Delaetiana Quehl VI, 301

- hidalgensis J. A. Purp. IV, 350

- Joossensiana Quehl VI, 300

- Knippeliana Quehl IV, 288

difficilis Quehl VI, 301Eichlamii Quehl VI, 294

Mamillaria pseudoperbella Quehl VIII,

- ramosissima Quehl VI, 301

- Rüstii Quehl III, 127

senilis Lodd, var. Diguetii Weber
 11, 72
 Manettia pauciflora Dus. VII, 224

\*Mandevilla superba Herz. VII, 60 Mangifera? parvifolia Boerl. et Krds. X, 319

(Mansoa truncata Spr. 1X, 53 Marattia subgen. \*Mesocarpus Rosenst. V, 376

\*— novoguineensis Rosenst. X, 342 \*— Rolandi Principis Rosenst. X, 162

\*— Werneri Rosenst. V, 44 Marila saramacana Pulle X, 409 (Mariscus cayennensis Urb. VIII 94

(— cyperoides Urb.) VIII, 93 (— flavus Vahl) VIII, 94

(— gracilis Vahl) VIII, 94 (— Sieberianus Nees) VIII, 93 (Marlea costata Boerl.) IV, 338

\*Marrubium lamioides Muschl. IV, 271 (— vulgare L.) IX, 534

 $-\beta$  lanatum Benth.) VIII, 308

Marsdenia brevisquama Jum. et P. de la Bathie IX, 303

— madagascariensis Cost. et Gall. IV,

- nicoyana Pitt. VIII, 478

parvifolia Brdg. III, 376
 rostrata R. Br. var. Dunnii

— rostrata R. Br. var. Dunnii Maid. et Betch. IV, 282

— truncata Jum. et P. de la Bathie 1X, 303, 539

\*Marsilia paradoxa Diels III, 86
— quadrifolia L. b. terrestris Hay. IV, 186

Martretia Beille nov. gen. VIII, 319 Mascagnia ambigua (Juss.) Gris. f. 2 paraguayensis Ndz. IX, 273

(— americana Bert. mss.) IX, 202— anisopetala (Juss.) Griseb. f. 1.typica Ndz. IX, 267

— Barclayana (Bth.) Ndz. 1X, 273

— brevifolia Gris. var.  $\beta$  paniculata Ndz. IX, 267

— chlorocarpa (Juss.) Gris var. α cristata Ndz. 1X, 269

— var.  $\beta$  typica Ndz. IX, 269

— — subvar. I. eglandulosa Ndz. IX, 270 — — subsp. II. glandulifera Ndz.

IX, 270
— complicata (H. B. K.) Ndz. IX, 199

condifolia (Juss.) Gris. var. β cornifolia (Willd) Ndz. IX, 201

— – var. α typica Ndz. IX, 201

(- coriacea Gris.) IX, 268

Mascagnia hippocrateoides (Pl. et Tr.) Ndz. IX, 270

— var.  $\beta$  platyrrhachis (Pl. et Tr.) Ndz. 1X, 270

— – var. α typica Ndz. IX, 270

- jamaicensis Urb. et Ndz. IX, 271

(— leucanthele Gris.) IX, 268

macradena (DC.) Ndz. IX, 202
macrodisca (Pl. et Tr.) Ndz. IX, 267
f. 2. oblonga Ndz. IX, 267

— macroptera (DC.) Ndz. IX, 277

- – var. α flabellariicarpa Ndz. lX 272

— var. β Jussieuana Ndz. IX, 272

metallicolor Ndz. IX, 268
mexicana Ndz. IX, 272

- multiglandulosa Ndz. IX, 267

- nervosa Ndz. IX, 204

- nitida (H. B. K.) Ndz. IX, 199

ovatifolia (H. B. K.) Gris. f. 3. cordata Ndz. IX, 205

— f. 1. oblongifolia (Bertero) Ndz. IX, 205

— f. 2. typica Ndz. 1X, 205

— polybotrya (Juss.) Ndz. IX, 199

- Pringlei Ndz. IX, 201

 psilophylla (Juss) Ndz. f 2. peruviana Ndz. IX, 272

pubiflora (Juss.) Gris. var. α grandifolia Ndz. 1X, 270

— — var.  $\beta$  typica Ndz. 1X, 270

— rigida (Juss.) Gris. subsp. I. coriacea (Gris.) Ndz. IX, 268

— — subsp. II typica Ndz. IX, 268 (— schizoptera Turcz.) IX, 270

— sepium (Juss.) Gris. ssp. l. acuminata Ndz. IX, 199

- — var.  $\eta$  aequatorialis Ndz. IX,

— — var. 9 glabrata Ndz. IX, 201

— — var.  $\beta$  macrophylla Ndz. IX, 200

— — var.  $\gamma$  Salzmanniana Ndz. IX,

— — var. δ typica Ndz. IX, 200
— ssp. II. bierosa (Moric.) Gris.

var. ζ mediterranea Ndz. IX, 200
— septentrionalis (Juss.) Ndz. IX, 272

— sericans Ndz. var. α boliviensis Ndz. IX, 269

— – var.  $\beta$  paraguariensis Ndz. IX,

- sericea (Engelm.) Ndz. IX, 273

(— Simsiana Gris.) IX, 270, 271

Spruceana Ndz. IX, 267tenuifolia Ndz. IX, 202

— — var.  $\beta$  amazonica Ndz. IX, 203

– var. α Eggersiana Ndz. IX, 203

Mascagnia vacciniifolia Ndz. IX, 203 – var. α glabrata Ndz. IX, 204 – var. β hispidula Ndz. IX, 204 - violacea (Pl. et Tr.) Ndz. IX, 205 - volubilis (Sims) Ndz. IX, 270 Mascarenhasia Geayi Cost. et Poiss. VIII, 317 - Kidroa Cost. et Poiss. VIII, 317 \*Masdevallia Buchtienii Schltr. X, 450 — carinata Cogn. VI, 55 \* Johannis Schltr. X, 359 \*- odontochila Schltr. IX, 29 \*— perpusilla Kränzl. l, 179 \*Mastersia borneensis Harms IX, 369 \*- Sarasinorum Harms IX, 369 \*Mastixia Korthalsiana Wang. IV, 335 — — var.  $\beta$  \*macrophylla Wang. IV, — var. α \*typica Wang. IV, 336 \*— Margarethae Wang. IV, 335 \*— Meziana Wang. IV, 336 \*— philipinensis Wang. X, 273 Matisia Dowdingii T. A. Sprague II, 125 \*Matricaria coreana Lévl. et Vant. VIII, (- grandiflora Britton) X, 510 - inodora L. var. grandiflora (Hook.) C. H. Ostenf. X, 510 (-- var. nana Macoun) X, 510 (— — var. phaeocephala Rupr.) X, 510 (Matthiola acaulis Schweinf, et Aschers.) IX, 349 - acaulis DC. subsp. \*caulescens Muschl. III, 214 — — war. \*ecornuta (Boiss.) Muschl. 111, 214 — — — var. \*hirta (Boiss.) Muschl. 111, 214 subsp. \*typica Muschl. III, 214 (— humilis DC. var. ecornuta Boiss.) 111, 214 (— — var. hirta Boiss.) III, 214 – — var. ε pusilla Dur. et Barr. IX, 349 livida DC. f. \*eglandulosa Muschl. 111, 214 — — f. \*integrifolia Muschl. III, 214 — — f. \*typica Muschl. III, 214 pseudoxyceras Conti var. β perennis Dur. et Barr. IX, 349 (Mattia albida Wettst.) IX, 542 - brachyantha Boiss.) IX, 541 — canescens DC.) IX. 542 — eriantha Ledeb.) IX, 541 - eriantha Stev.) IX, 541 lanata Schult.) IX, 541 var. glabrata Boiss.) IX, 541 (— punctata DC.) IX, 541 (— umbellata C. Koch) IX, 542  $(--\beta \text{ armeniaca DC.})$  IX, 542

\*Mauria boliviana Herz. VII, 60

Maxillaria acicularis Herb. var. \( \beta \) brevifolia Cogn. I, 94 \*— cobanensis Schltr. X, 295 \*— dolichophylla Schltr. X, 458 \*— Herzogiana Kränzl. VI, 20 – madida Lindl, var, monophylla Cogn. VI, 61 \*— microphyton Schltr. VIII, 457 — minuta Cogn. I, 93 — nardoides Kränzl. I, 90 Neowiedii Rchb. var. β longifolia Cogn. 1, 94 \*- pachyacron Schltr. IX, 165 — Parahybunensis Cogn. 1, 92. \*— polybulbon Kränzl. VI, 19 \*— Türckheimii Schltr. X, 295 (Mayepea Hassleriana Chod.) VIII, 44 \*Maytenus manabiensis Loes. I, 161 phyllanthoides Benth. var. \*ovali-folia Loes. VIII, 291 \*— verticillata DC. var. y \*Lehmannii Loes. 1, 161 Mazus rugosus Lour. var. rotundifolia Franch. et Sav. IX, 323 \*Meconella kakoethes Fedde III, 275 (Meconopsis betonicifolia Franch.) IV, discigera Prain IV, 219 (— horridula var. rudis Prain) IV, 217 (- integrifolia Bulley) IV, 218 — pseudointegrifolia Prain IV, 218 (- racemosa Franch. IV, 217 — rudis Prain IV, 217 - sinuata Prain var. latifolia Prain VII, 177 (- - var. Prattii Prain) IV, 217 speciosa Prain IX, 143torquata Prain IV, 219 (Medicago apiculata Willd.) IX, 351 — arabica var. minor Loj. Poj. V, 27 (— denticulata  $\delta$  apiculata Hal.) IX, 351 (— hispida  $\beta$  apiculata Hal.) 1X, 351 (— — var. denticulata [Willd.] Urb.) II, 2 - lanigera C. Winkl. et B. Fedtsch. 111, 55 — lappacea Desv. var.  $\beta$  apiculata (Willd.) Dur. et Barr. IX, 351 - lupulina L. var. umbelloides Brach. VIII, 211 \*×— sabulensis Lévl. (M. littoralis × M. marina) VII, 200 (- Tinei Loj. Poj.) V, 27 - Todaroana Loj. Poj. V, 27 \*Mediocalcar Lawesii Schltr. IX, 284 \*— paradoxum Schltr. IX, 96 Malaleuca linearifolia Sm. var. alternifolia Maid. et Betch. V, 56 Melampyrum heracleoticum Boiss. et Heldr. var. trichocalycinum (Vandas) Maly VII, 185

Melochia hermannioides St. Hil. var. Melampyrum pratense L. forma albi-\*lanceolata Hassl. VIII, 122 dosulfureum C. G. Westerld. IV, 16 - var. \*lacinulata K. Sch. et Hassl. – var. angustifolium Litw. V, 319 VIII, 122 — α vulgatum Pers. f. umbrosum (- lacinulata K. Sch. et Hassl. VIII, 122 C. G. Westerld IV, 16 - Missionum Ekm.) VIII, 123 — silvaticum L.  $\alpha$  typicum C. G. (- Morongii Britt.) VIII, 121 (- - var. denudata R. E. Fr.) VIII, 122, Westerld. f. decumbens C. G. Westerl. IV, 16 - — f. subovatum C. G. Westerld. parvifolia H. B. K. var. pasciculata (Benth.) Hassi. Viii, 121 IV, 16 — — f.\*microphylla Hassl. VIII, 121 — — — subf. \*transiens Hassl. - vulgatum Persoon f. paradoxum O. Dalıl II, 144 solstitiale Ronning. V, 32 VIII, 121 Melandryum rubrum (Weig.) Garcke — — f. typica Hassl. VIII, 121 subsp. \*lapponicum Simmons VIII, — — var. \*genuina (H. B. K.) Hassl. VIII, 121 181 Melanosinapis amplexicaulis (Desf.) V. \_ \_ \_ f. \*induta Hassl. VIII, 120 — var. \*Morongii (Britt.) Hassl. VIII, Calest. VIII, 544 — boetica (Boiss.) V. Cal. VIII 544 121 (— communis Spenn.) VIII, 544 — nigra (L.) V. Cal. VIII, 544 — — f. \*genuina Hassl. VIII, 121 \_\_ \_ \_ f. \*intermedia Hassl. VIII, 121 Melanthera ligulata Small III, 294 \_ \_ \_ \_ subf. \*denudata (R. E. \*Melasma strictum (Benth.) Hassl. X, Fr.) Hassl. VIII, 121 \_ \_ \_ f. \*heterophylla Hassl. VIII, \*\_ - var. \*uninerve Hassl. X, 348 122 \*Melastonia Cavaleriei Lévl. et Vant. — — f. tomentosa Hassl. VIII, 122 \_ \_ \_ f. \*typica Hassl. VIII, 122 111, 21 Esquirolii Lévl. VIII, 61 — pyramidata L. var. \*pseudo-tomen- polyanthum Bl. var. parviflora Th. tosa Hassl. VIII, 122 - ramulifera (Miq.) R. E. Fr. VIII, 373 Val. V, 387 stricta K. Sch. f. \*Missionum(Ekm.) Hassl. VIII, 123 \*Melica adhaerens Hack. VI, 158 argyrea Hack. IV, 279
bella var. intonsa Piper VI, 74 - tomentosa L. var. mattogrossensis ciliata L. b. lucana Terracc. V, 137 R. E. Fr. VIII, 372 - cordobensis Hack. IV, 344 St. Hil. f. albo- ulmarioides - fugax var. madophylla Piper VI, 74 villosa R. E. Fr. VIII, 372 (- Harfordii var. minor Vasey) VI, 74 (- ulmifolia Benth.) VIII, 373 \*Melodinus Bodinieri Lévl. II, 113 — var. tenuior Piper VI, 74 (— papilionacea Gris.) IV, 279 (— var. hyalina Doell.) IV, 279 \*\_ Cavaleriei Lévl. ll, 113 \* Chaffanjoni Lévl. II, 114 (- - var. laxiflora O. Ktze.) IV, 279 \* Duclouxii Lévl. II, 114 - secunda Rgl. var. interrupta Hack. \*\_ Seguini Lévl. II, 114 \*Melodium Dunnii Lévl. IX, 453 - Stuckertii Hack. IV, 279 \*Melodorum retusum Lévl. IX, 458 Melicope novo-guineensis Th. Val. V, \*Melothria carnosula Cogn. V, 258 \*— Rechingeri Cogn. V, 257 380; 1X, 314 Melilotus arenaria Grecesc. X, 215 \*Memora cuspidata Hassl. IX, 57 - macrorhiza P. b. lucanus Terracc. - f. \*cirrhifera Hassl. IX, 59 — f. \*parvifoliolata Hassl. IX, 58 V, 137 ×Mentha amphioxya (aquatica × parie-Melinis ruficoma (Hochst) Chiov. VI, 6 tarifolia) Borb. II, 64 \*Meliosma? Cavaleriei Lévl. IX, 457 aquatica var γ brevidentata P. Cout. Melittis Melissophyllum L. var. oblongifolia Rohl. 1, 23 – var. β Broteriana P. Cout. VIII, (Melocactus guatemalensis Gürke et Eichl.) VI, 130, 300 458 — var. persica Briq. VI, 71 Maxonii (Rose) Gürke VI, 300 (- arvensis var. lanata Piper) VIII, 267 (- tephracanthus Link et Otto) VIII, 224

(Melochia Benthami K. Sch.) VIII, 373 (— carthaginensis Willd.) VIII, 373

- decumbens R. E. Fr. VIII, 372

(- pasciculata Benth.) VIII, 121

(— var. perardi Briq.) VIII, 267 (— borealis Michx.) VIII, 267

- bulgarica Borb. Il, 112

- calliopsis Borb. II, 64

Mentha canadensis var. borealis (Michx.) Piper VIII, 267

(— — var. glabrata Benth.) VIII, 267 — — var. lanata Piper VIII, 267

- crinoides Heldr. IV, 302

 daurica Fisch, f. sobolifera Kom. V, 273

f. umbrosa Kom. V, 273

×— eriosoma Borb. II, 112 (— hirsuta Brot.) VIII, 458

- intrusa (M. rotundifolia × viridis) Cout. VIII, 458

- lamprosoma Borb. II, 112

 longifolia L. f. Linnaeana v. Hay. 11, 144

— — Huds. subsp. modesta Brig. var. Pamirensis Brig. V1, 72

— — subsp. Royleana Brig. var. intercedens Briq. VI, 71 \*— Malinvaldi Lévl. et Vant. III, 21

— moesiaca Borb. II, 112

×— perarguta (aquatica × ballotaefolia) Borb. II, 64

— Pulegium L. b. lucana Terracc. V.

— — var.  $\beta$  tomentella (Hoffgg. et Lk.) T. Cout. VIII, 459

(— rotundifolia var. glabra Brot.) VIII,

 silvestris L. f. glabrata Terracc. V, 139

f. montana Terracc. V, 140
f. murensis Terracc. V, 140
f. nemorosa Terracc. V, 139

×— spathulifrons (abruptiflora × Schleicheri var.) Borb. 11, 80

(— tomentella Hoffgg. et Link) VIII, 459

Mentzelia pinetorum Heller IV, 63 - propingua Aresch. X, 302

Menyanthes trifoliata L. b. macrophylla Bolz. VIII, 255

- c. microphylla Bolz. VIII, 255 (Menziesia aleutica Spreng.) VIII, 112 (- phylicifolia Fisch.) VIII, 112

— polifolia Sm.) VIII, 437

Merathrepta americana (Scribn.) Piper VI, 74

 californica (Boland.) Piper VI, 74 - intermedia (Vasay) Piper VI, 74

— — var. Cusickii (Williams) Piper VI, 74

- pinetorum Piper VI, 73

 unispicata (Thurb.) Piper VI, 74 \*Mercurialis acanthocarpa Lévl. et Vant. 111, 21

 perennis L. f. robusta Groß III, 126 Meriania hexamera T. A. Spr. II, 139 \*- pulcherrima Herz. VII, 63

\*Merostachys multiramea Hack. VII, 326 \*Merremia Hassleriana (Chod.) Hassl. 1X, 151

– var. \*robusta Hassl, IX, 151

Mertensia ambigua Piper VIII, 158

brachycalyx Piper VIII, 159
Horneri Piper VIII, 160

- infirma Piper VIII, 158 — laevigata Piper VIII, 158 - leptophylla Piper VIII, 159 micrantha Nels. V, 218

— nutans var. subcalva Piper VIII, 161

- pubescens Piper VIII, 160 — pulchella Piper VIII, 159

— var. glauca Piper VIII, 160 (— Sendtneri Janka) VII, 189

(- serbica Janka) VII, 189 (Meryta macrocarpa Baill.) VI, 48

(— macrocephala Baill.) VI, 48 — schizolaena Baill) VI, 48

Mesembrianthemum apodanthum Schltr. et Diels VIII, 148

 ebracteatum Schltr. et Diels VIII, 149 — gymnocladum Schltr. et Diels VIII,

149 odontocalyx Schltr. et Diels VIII, 149

— Paxianum Schltr. et Diels VIII, 150 — rhopalophyllum Schltr. et Diels VIII, 148

- Schultzei Schltr. et Diels VIII, 148 Mesona elegans Hay. VI, 197 Mesopanax n. gen. Viguier VI, 45

— capitatus (Jacq.) Vigu. VI, 46 — Liebmannii (March.) Vigu. VI, 46 - proteus (Champ.) Viguier VI, 46 (Mespilus sanguinea var. chlorocarpa

Koch) III, 224 Messerschmidia angustifolia (Webb et

Berth.) Pit. 1X, 280 (— fruticosa var. angustifolia Webb et Berth.) IX, 280

Metalasia pallida Bol. VII, 126 - strictifolia Bol. VII, 127

(Metastelma decipiens Pitt., non Schltr.) VIII, 475

\*— fallax Pitt. VIII, 475

 sepicola Pitt. VIII, 476 \*Michelia Cavaleriei Lévl. IX, 459

Miconia acutipetala T. A. Spr. 11, 139 \*— Buchtienii Cogn. VIII, 2 \*— congesta Cogn. VIII, 2

\*— longicuspis Herz. VII, 64 — perplexans T. A. Spr. II, 139 (Micrantheum demissum F. v. M.) IX, 64 (Microcarpaea montevidensis (Sprengel)

R. E. Fr.) IV, 119

\*Microchloa convergens Dom. X, 119 \*— indica (L. f.) Hack. VII, 373

\*— tenella Dom. X, 119

\*Microlepia pseudohirta Rosenst. IX, 425 Micromeles alnifolia Koehne var. \*tiliaefolia (Koehne) C. K. Schn. III, 152

— cuspidata (Bertol.) C. K. Schn. III, 151

 Decaisneana C.K. Schn. var. \*Keissleri C. K. Schn. III, 151

(Micromeles Folgneri C. K. Schn.) III, 152 - granulosa (Bert.) C. K. Schn. III, Hemsleyi C. K. Schn. III, 152
Schwerini C. K. Schn. III, 151 - Thomsoni (Hook. fil.) C. K. Schn. 111, 151 Micromeria cristata Grsb. f. canescens Vand. 1X, 534 - juliana Bth. var. canescens (Guss.) Vand. 1X, 534 (- longiflora Tod. VI, 115 (- microphylla Benth. var. b. imbricata? Balf. fil.) VII, 162 (-- var. a. remota Balf. Iil.) VII, 162 \* Pitardii Bornm. VI, 1 (- pusilla Phil.) IV, 138 Microrhamnus ericoides A. Gr. VIII, 297 \*- Taquetii Lévl. VIII, 284 (Microsteris humilis Greene) VIII, 15 (- glabella Greene) VIII, 15 \*Microstylis boliviana Schltr. X, 448 \*- Buchtienii Schltr. X, 449 \*- celebica Schltr. X, 30 (- cordifolia Rolfe) X, 33 \* cucullata Schltr. 1X, 341 \*— elegantula Schltr. III, 17 \*— klabatensis Schltr. X, 33 \*— lokonensis Schltr. X, 30 \*- lunata Schltr. IX, 162 \*— mixta Schltr. 449 \*— Miyakei Schltr, IX, 437 \* monticola Schltr. III, 17 migrescens J. J. Sm. X, 33

migrescens J. J. Sm. X, 33

pandurata Schltr. Ill, 77

migrescens J. J. Sm.) V, 293

pleistantha Schltr. IX, 340

migrescens J. J. Sm.) V, 293 - Reineckeana Krzl. IX, 93 repens Rolfe X, 33
Ridleyi J. J. Sm. V, 293
samoensis Schltr. IX, 93 soleiformis J. J. Sm. V, 293
spiralipetala Cogn. V, 317 \*— termensis Kränzl. I, 91

\*— tetraloba Schltr. IX, 94

\*— Tonduzii Schltr. III, 106

\*— trichopoda Schltr. X, 32 - trigonopetala J. J. Sm. X, 29 \*- truncicola Schltr. X, 31 \*— umbraticola Schltr. X, 31 \*- vitiensis Schltr. X, 249 \*Microtaena (?) coreana Lévl. IX, 223 - Esquirolii Lévl. 1X, 222 \*- mollis Lévl. 1X, 222 \*Microtatorchis celebica Schltr. X, 208 \*-samoensis Schltr. IX, 111 \*Mikania boliviensis Lingelsh. VII, 251 \*- cinnamomifolia Lingelsh. VII, 251 - Houstoniana B. L. Rob. IV, 154 (— Houstonis Willd.) IV, 154 \*— rubella Lingelsh. VII, 250 (Milium Treutleri O. Ktze.) III, 242

(- velutinum DC.) IV, 29

Milletia pallens Stapf. V, 353 Nieuwenhuisii J. J. Sm. VI, 383
Thonneri De Wild. X, 425 \*Miltonia superba Schltr. III, 249 Mimosa adenocarpa Benth. var. \*genuina (Benth.) Hassl. IX, 7 \_ \_ \_ f. \*aculeata Hassl. IX, 7 \_ \_ \_ f. inermis Hassl. IX, 7 — — var. \*multiglandulosa Hassl. IX, 8 — var. subinermis Bentlı. f. \*bahiensis Hassl. IX, 7 — — f. \*paraguariensis Hassl. IX, 7 (- adianthifolia Schum.) VIII, 488 \* amambayensis Hassl. IX. 13 — var. \*glabrata Hassl. IX, 13 - apodocarpa Benth. var. \*genuina (Benth.) Hassl. IX, 1
— var. \*hostilis (Mart.) Hassl. IX, 1 — var. \*intermedia Hassl. IX, 1 \*- argillicola Hassl. VIII, 558 - subsp. \*major Hassl. VIII, 558 \_ \_ \_ var. \*intermedia Hassl. VIII, 559 asperata L. var. δ \*cinerea (Vell.) Hassl. IX, 16 \_ \_ \_ f. 4. \*glabrescens Hassl. IX, 18 — — — f. 3.\*longepedunculata Hassl. 1X, 18 \_ \_ \_ f. 1. \*pseudo - intermedia Hassl. IX, 17 - - f. 2. \*pubescens (Benth.) Hassl. IX, 17 — — var.  $\beta$  \*elliptica (Benth.) Hassl. 1X, 16 — var. α \*genuina Hassl IX, 15 \_\_ \_ \_ f. 1. \*aspera Hassl. IX, 15 \_ \_ \_ f. 2. \*mollis Hassl. IX, 15 — — var.  $\gamma$  \*intermedia Hassl. lX, 16 \_\_\_\_ f. 1. \*armata Hassl. IX, 16 \_\_\_ f. 2. \*inermis Hassl. IX, 16 (- asperrima Benth.) VIII, 560 Balansae Micheli var. \*Rojasiana Hassl. VIII, 557 - bimucronata (DC.) O. Ktze. IX, 2 — — ssp. 11. Hassl. IX, 3 \*hexandra (Micheli) - - var.  $\beta$ \*genuina Hassl. IX, 3 \_\_\_\_ f. \*Micheliana Hassl. IX, 3 \_\_\_ f. \*Vepres Hassl. IX, 4 — — var. α \*intermedia Hassl.IX,3 — — ssp. I \*sepiaria (Benth.) Hassl. \_ - var. γ\*adenocarpa Hassl. IX, 3 - - var.  $\beta$  \*gymnocarpa Hassl. 1X, 2 — — var. α \*trichocarpa Hassl. 1X, 2 \*\_ Chodati Hassl. IX, 12 (- cinerea Vell.) IX, 14, 16

128 (Mimosa cinerea var.  $\beta$  pubescens Benth.) IX, 14 - cordistipula Benth. IX, 4 — subsp. \*multiglandulosa Hassl. 1X, 4 — — var. α \*pubescens Hassl.1X,5 — — var. β\*tomentosa Hassl. IX.5 - daleoides Benth, var. \*paraguarien= sis (Chod. et Hassl.) Hassl. IX, 1 (— — f. paraguariensis Chod. et Hassl.) Hassl. IX, 1 dolichocephala Harms var. \*sabulicola (Chod. et Hassl.) Hassl. IX, 6 (— elliptica Benth.) IX, 14, 16 eurycarpa Herz. VII, 53 \*- Fiebrigii Hassl. IX, 9 (- filiformis Chod. et Hassl.) IX, 8 - gracilipes Harms var. \*suffruticosa Hassl. VIII, 557

— — f. \*armata Hassl. VIII, 557

— — f. \*inermis Hassl. VIII, 557 gracilis Benth, var. α \*genuina (Benth) Hassl. IX, 5 — — f. \*Iongepedunculata Hassl. – var. β \*intermedia Hassl. IX, 5 — var. γ \*serpens (Chod. et Hassl.) Hassl. IX, 6 – – f. \*glabrifolia (Chod. et Hassl.) Hassl. IX, 6 \*— grandistipula Herz. VII, 53 - Sect. II. Habbasia Benth. series \*Pseudocymosae Hassl. IX, 10 - Hassleriana Chod. var. \*genuina (Chod.) Hassl. IX, 8 — — f. \*intermedia Hassl. IX, 8 – var. \*reducta Hassl. IX, 8 — subsp. \*microphylla Hassl. lX, 8 — — var. \*multijuga Hassl. IX, 9 — — var. \*virgata Hassl. IX, 8 (- hexandra Micheli) IX, 3 itatiaiensis Dus. VII, 262
lasiocarpa Benth. f. \*glabriflora Hassl. IX, 6 \*- lepidota Herz. VII, 53 (- lupinoides Chod. et Hassl.) VIII, 559 monadelpha Chod. et Hassl. var. \*hirsuto-puberula Hassl. IX, 14 — monticola Dus. VII, 261 nervosa Bong. var. \*lupinoides(Chod. et Hassl) Hassl. VIII, 559

- - f. \*ferruginea Chod. et Hassl.

— — f. \*glabrescens Chod. et

— — f. \*hirsuta Chod. et Hassl.

nervosa Bong, var. \* macrophylla

(— papposa Benth. var. uninervis Chod.

VIII, 559

VIII, 559

Hassl. VIII, 559

Hassl. VIII, 559

et Hassl.) VIII, 559

Mimosa Paraguariae Mich. IX, 6 — — var.  $\beta$  \*chacoensis Hassl. IX. 7 – var. α \*genuina (Mich.) Hassl. 1X, 7 – – f. \*induta Hassler, IX, 7 \*— Rojasii Hassl. IX, 9 - rudis Benth. var. \*asperrima (Benth.) Hassl. VIII, 560 — var. \*genuina Hassl. VIII, 560
— — f. \*intermedia Hassl. VIII, 560 – – f. \*latifoliolata Hassl. VIII, 560 (- sabulicola Chod. et Hassl.) IX, 6 (- sepiaria Benth.) IX, 2 ( - serpens Chod. et Hassl. var. glabrifolia Chod. et Hassl.) IX, 6 - - var. glabrifolia Chod. et Hassl. f. \*hirsutissima Hassl. IX, 6 \*- uninervis (Chod. et Hassl.) Hassl. VIII, 559 (— Vepres Lindm.) IX, 4 Minulus alpinus (A. Gr.) Piper VIII, 268 (- caespitosus Greene) VIII, 268 Cusickii (Greene) Piper VIII, 268 (— Douglasii A. Gr.) VIII, 268 (- luteus var. alpinus A. Gr.) VIII, 268 (— nanus var. subuniflorus Hook. et Arn.) VIII, 268 (- Scouleri var. caespitosus Greene) VIII, 268 - subuniflorus (Hook, et Arn.) Piper VIII, 268 Minuartia austriaca (Jacq.) Hay. VII, 33 - condensata (Presl.) Hand.-Mzt. X, 305 Eurytanica (Boiss.) Hand.-Mzt. X, 305 - Gerardi (Willd.) Hay. VII, 33 - hirsuta (M, u, B.) Hand.-Mzt. X, — subsp.frutescens(Kitaib.) Hand.-Mzt. X, 305 — — subsp. vestita (Fenzl.) Hand.-Mzt. X, 304 — liniflora (L.) Hay. VII, 33 pinifolia (Fenzl.) var. robusta Hand.-Mzt. X, 305 - setacea (Thuill.) Hay. VII, 33  $--\beta$  banatica (Heuff.) Hay. VII, 33 - sedoides (L.) Hiern var. ciliata (Hut.) Hay. VII, 34 (Miscanthus condensatus Hack.) VIII, 488 Mitella japonica Miq. var. integripetala Mak. VI, 288 Mitostigma barbatum Malme I, 138 ( — gracilis Bl.) VIII, 107 - parviflorum Malme I, 140 - speciosum Malme I, 139 - subniveum Malme I, 137 — tubatum Malme I, 139 \*Mitrasacme lutea Lévl. IV, 331 Mitrocarpus brevis K. Schum. III, 358

Mniochloa A. Chase IX, 39 – pulchella (Gris.) A. Chase IX, 39 - strephioides (Gris ) A. Chase IX, 40 Moehringia trinervia f. \*caespitosa H. Preuss VII, 106 (Moenchia coerulea Boiss.) VII, 287 - mantica (L.) Bartl. f. coerulea (Boiss.) Janch. VII, 287 (Molinia capillaris Hartm.) IX, 141 coerulea (L) Moench var. pseudarundinacea Murr III, 140 (— distans var. reptans Hartm.) VIII, 77 (Moltkia aurea Sendtn) VII, 189 - Sendtneri Boiss.) VII, 189 (Monanthes agriostaphis Christ, III, 26 \*-- chlorotica Bornm. III, 26 laxiflora (DC.) C. Bolle var. \*eglandulosa Bornm. III, 26 - var. \*genuina Bornm. III, 26 Monelasmum bracteatum v. Tiegh. VI, 9 canaliculatum v. Tiegh. VI, 10
contractum v. Tiegh. VI, 10
coriaceum v. Tiegh. VI, 11 - cupreum v. Tiegh. VI, 10 denticulatum v. Tiegh. VI, 10 excelsum v. Tiegh. VI, 10 inflatum v. Tiegh. VI, 9 Jollyanum v. Tiegh VI, 11 - Krebedjense v. Tiegh. VI, 11 laxum v. Tiegh. VI, 9 - lucidum v. Tiegh. VI, 9 nanense v. Tiegh. VI, 11 Monniera aquatica (Aubl.) Macl. IV, 139 (Monoceras robustum Miq. VII, 44) (Monochilus plantagineus Rchb. f.) IX, 91 Monogramme paradoxa (Fee) Bedd. var. \*novoguineensis Rosenst. VIII, Monotagma surinamense Pulle III, 285 Monotaxis grandiflora Endl. var. minor Ewart IX, 67 (Monotropa glabra Bernh.) X, 144 (- hypophegea Wallr.) X, 144 hypopitys var. α glabra Roth f. 3. glomerata H. Andr. X, 143 - - f. 2. ramosa H. Andr. X, 143 — — f. 1. typica H. Andr. X, 143 – var. γ hirsuta Roth f. 1. cylindrica H. Andr. X, 144 <u> — — f. 4. fusca H. Andr. X, 144</u> — — f. 2. nutans H. Andr. X, 144 - - var.  $\beta$  hypophagos (Dumort.) H. Andr. X, 144 - - var. vineosa H. Andr. X, 143 (- spathulata var. exigua Robins.) VI, 169 (Montia Howellii S. Wats.) VI, 169 Moricandia nitens Dur. et Barr. IX, 349 (- dumosa Boiss.) IX, 349

- divaricata Coss.) IX, 349

(- spinosa Pomel) IX, 349

(Moricandia suffruticosa var. nitens Schweinf, et Aschers.) IX, 349 \*Morinda bracteata Roxb. var. latifolia Val. IX, 312 Moringa Borziana Mattei IX, 319 Morkillia Rose et Paint, nov. gen. VIII, - acuminata Rose et Paint, VIII, 243 mexicana (Moç. et Sessé) Rose et Paint VIII, 243 \*Mormodes lobulatum Schltr. VIII, 456 \*Morrenia Hassleriana Malme VI, 346 Mortonia Greggii Gr. VIII, 295 (Morus? altissima Miq.) VII, 182 \*— Cavaleriei Lévl. X, 146 (- nigra Mats.) VIII, 112 - rubra L. var. japonica Mak. VIII, 112 \*Mosla Argyi Lévl. IX, 248 "— Cavaleriei Lévl. IX, 247 \*- coreana Lévl. IX, 248 Mouriria anomala Pulle IX, 137 - Plasschaerti Pulle X, 411 \*Mucuna Esquirolii Lévl. VII, 231 \*Muehlenbergia trifida Hack. VIII, 518 Muntingia calabura L. IX, 356 Muraltia spicata Bol. IV, 194 Musa Perrieri Claverie II, 121 Muscari longifolius Rigo II, 127 \*Musineum Ehrenbergii Wolff VIII, 524 (Mussaenda frondosa var. grandifolia Hook.) VIII, 335
— longituba Th. Val. V, 394 (- macrophylla Wall.) VIII, 335 – parvifolia Th. Val. V, 394 — Sanderiana H. N. Ridl, VIII, 384 \*— sutepensis Hoss. X, 62 — Treutleri Stapf VIII, 335 Mutisia Kurtzii R. E. Fr. III, 300 (- microphylla Phil.) III, 299 - Philippii R. E. Fr. III, 299 (Myagrum Alyssum Mill.) VIII, 370 (- dentatum Willd.) VIII, 370 (- hispanicum L.) V, 364 (— sativum γ L.) VIII, 370 Mycetia javanica (Bl.) Korth. var. anthotricha Val. IX, 312 \*Myginda eucymosa Loes. et Pitt. VIII, 293, 470 - Gaumeri Loes. VIII, 295 Myosotis albida (T. Kirk) Cheesem. VIII, 222 (- alpestris Schmidt) VIII, 182 f. parviflora Pau IX, 192 - Astoni Cheesem. IX, 409 caespitosa Schultz var. borealis Vesterl. X, 366 — — var. \*nana Stadlm. II, 165  $(--\gamma \text{ stolonifera DC.}) \text{ VI, } 187$ (- capitata subsp. albida T. Kirk) VIII,

(Myosotis capitata var. albiflora J. B. Armstg.) VIII, 222

(— lingulata Lehm.  $\beta$  stolonifera DC.) VI, 187

- palustris With. var. retrohirsuta Litw. V, 319

f. viridis K. R. Kupff. VI, 125
stolonifera Gay) VI, 187

— sylvatica Hoffm. subsp. alpestris (Schm.) Simm. VIII, 182

(- - var. alpestris Koch) VIII, 182 - versicolor Perr. var. canariensis Pit. IX, 281

— Welwitschii Boiss. et Reut, var. β stolonifera (Gay) P. Cout. VI, 187

Myrica Paivae Berg. var. \*gracilis
Lingelsh. VII, 243

Myricaria edulis (Vell.) Skeels VIII, 488 Myrmecocystis cerebriformis Harkn. VII, 193

(Myrobalanus Balansae O. K.) VIII, 45 Myrosma polystachya Pulle X, 282 (Myroxylon amara [Span.] Warb. et Engl.) IX, 407

(Myrrhis Claytoni Michx.) IV, 137 \*Myrsine Cavaleriei Lévl. X, 376

\*— Fauriei Lévl. X, 154, 373 \*— Feddei Lévl. X, 376

\*- molokaiensis Lévl. X, 154, 373

sandwicensis DC. var. \*punctata
 Lévl. X, 157, 444

– var. \*mauiensis Lévl. X, 157, 444
\*– Vanioti Lévl. X, 157, 476

(Myrtiphyllum ligustrifolium Northr. VII, 283

(Myrtus agni Molina) IV, 137

Mystacidium appendiculatum De Wild. III, 164

Nagelia denticulata var. \*nervosa (Decne) C. K. Schn. III, 183

— var. \*psilantha C. K. Schn.

III, 183
\*— Pringlei (Koch) C. K. Schn. III, 183

Nama argenteum Brand IX, 389

(— glandulosum Peter) X, 280 — humifusum Brand IX, 388 (— stenocarpum Rose) IX, 388

\*Namation A. Brand nov, gen X, 280

\*— glandulosum (Peter) Brand X, 280

\*XNania Fauriei (N macropus Hook.

XN. polymorpha Gaud.) Lévl. X, 150

×N. polymorpha Gaud.) Lévl. X, 150 ×— Feddei (N. polymorpha Gaud. ×N.

macropus Hook.) Lévl. X, 150 — macropus Hook. var. \*microphylla Lévl. X, 149

polymorpha Gaud var \*glaberrima
 Lévl. X, 149

– var. \*incana Lévl. X, 149
– var. \*nummularifolia Lévl. X, 149

— — var. \*sessilis Faurie X, 149 (Narcissus biflorus Curt.) IX, 406

Narcissus poëticus × Tazzetta Henon c. tetramerus Bolz. IX, 406

— — b. triflorus Bolz. IX, 406
 Nardophyllum staehelinoides(DC.) Macl. IV, 139

(Nardosmia laevigata subfaeminea DC.) V, 277

(- saxatilis Turcz.) V, 277

Nardurus maritimus (L.) Janchen VIII, 257

(— unilateralis [L.] Boiss.) VIII, 257 Nashia nov. gen. Millsp. VII, 283 — inaguensis Millsp. VII, 283

Nassauvia abbreviata (Hook. et Arn.) Macl. IV, 141

- Candollei Macl. IV, 141

— Darwinii (Hook. et Arn.) Macl. IV,

- Dusenii O. Hoffm. IV, 141

 Lagascae (Hook. et Arn.) Macl. VI, 141

- laxa (Phil.) Macl. IV, 141

struthionum (Phil.) Macl. IV, 142
subspinosa (Phil.) Macl. VI, 142

ulicina (Hook.) Macl. IV, 142
\*Nassella corniculata Hack. VI, 155

\*— flaccidula Hack. VI, 154 \*—— lumilior Hack. VI, 155

(Nasturtium calycotrichum O. Ktze.) V,90

(— chalepense O. Ktze.) V, 87 (— erinaceum O. Ktze.) IV, 163 (— hirtellum O. Ktze.) V, 95

(- humifusum Gillet et Magne) V, 90

- Kouytchense Lévi. VI, 375 (— nebrodense Raf.) V, 89 (— officinale R. Br.) VIII, 436 (— oxyotum O. Ktze.) V, 90

(- petrophilum O. Ktze.) V, 90 - proliferum Heuff. var. brevicarpum

Vand. IX, 524 — pyrenaicum (L.) R. Br. f. incisum E. Steig. III, 236

(- spinescens O. Ktze.) V, 91 (- spinosum Desv.) V, 91

(— stylatum O. Ktze.) V, 90 (Nauclea formosana Mats.) VI, 196

Neea pulcherrima Heim. VI, 83 (Nematopogon densicoma [Mart.] Bur.

et K. Schum.) VIII, 151
\*Nematosciadium Wolff nov. gen. IX, 418

\*— Schiedei Wolff IX, 418, 419 Neobrittonia Hochr. n. gen. III, 90

— acerifolia Hochr. III, 90

Neochevaliera Beille nov. gen. VIII, 319
\*Neokoehleria Schltr. nov. gen. X, 385
\*— equitans Schltr. X, 390

\*— peruviana Schitr. X, 391

\*Neolehmannia Micro-Cattleya Kränzl. I, 180

Neoschimperia nov. gen. W. B. Hemsl. V, 263

- heterophylia Hemsl. V, 263

(Neottia bisida Bl.) VI, 41

(-- colorata Bl.) VI, 41 (- parviflora Bl.) VI, 42

- procera Ker-Gawl.) VI, 42 pubescens Willd.) VI, 42

repens Buerg.) VI, 287 reticulata BI.) VI, 43

(- rubicunda Bl.) VI, 43

Nepenthes madagascariensis Poir, var. cylindrica Dub. V, 30.

- Montrouzierii Dub. V, 30

 Vieilliardii Hook, var. Deplanchei Dub. V, 30

(Nepeta Boissieri var. laciniata Wk) VIII. 136

 Cataria C. β immaculata Sireitsch. VIII, 227

- fallax Briq. VI, 68 \*- Fauriei Lévl. 245

\*- Ferriei Lévl. IX, 245 - lanceolata Lamk, var, pyrenaea Pau

- Nepetella L. var. Boissieri (Wk.) Pau VIII, 136

Paulsenii Briq. VI, 66
Prattii Lévl. IX, 245

- reniformis Briq. VI, 67 \*- Sintenisii Bornm. X, 421

\*- Souliei Lévl. IX, 221

- spicata Benth. var. \*incana Lévl. IX, 245

\*- urticifolia Lévl. IX, 245 \*- Vaniotiana Lévl. IX, 220

Veitchii Duth V, 5Wilsoni Duth. V, 4

\*Nephelaphyllum Beccarii Schltr. IX, 338 (Nephelium chryseum? Radlk. [non Bl.] VIII, 193

dasyneurum Radik. VIII, 195

(- mutabile var. pallens Hiern) VIII, 193

obliquinerve Radlk. 195

- pallens Radlk. VIII, 193 - subfalcatum Radlk. VIII. 194

- tuberculatum Radik. VIII, 194 Nephrodium achalense (Hieron.) Hick,

VII, 169 Arechavaletae (Hieron.) Hick. VII, 169 - argentinum (Hieron.) C. M. Hick.

— var. major Hick. VIII, 275

 connexum Hick. IV, 140 (- Dryopteris Michx.) VI, 185

- effusum (Swartz) Bak. var. tenue Hick. VIII, 276

- Etchichuryi Hick. VIII, 275

- Galanderi (Hieron.) Hick. VII, 169 fragrans (L.) Richards a. \*remotiusculum Kom. IX, 394

(- Kuhnii Hieron.) X, 213 \*- Iepidota Kom. IX, 394 - Lilloi Hick. VII, 169

Nephrodium Lorentzii (Hieron.) Hick. VII. 169

oligocarpum var. crassistipitatum

(Hieron.) Hick. IX, 141

 parasiticum var. glabrindusiatum (Hieron.) Hick. IX, 141

- pseudomontanum (Hieron.) Rosenst. VII, 169

- Siambonense (Hieron.) Hick. VII, 169

spinulosum γ remotum Bak. VI, 185

Nervilia Aragoana Gaud. IX, 85 \*- grandiflora Schltr. IX, 85

\*- Fuerstenbergiana Schltr. 331

\* – purpurea (Hay.) Schltr. X, 6 \* – sciaphila Schltr. X, 5

\*- taitoensis (Hay.) Schltr. X, 6

(Neumayera austrica Rchb.) VII, 33 Nicotina Forgetiana W. B. Hemsl. III,

Nidorella angustifolia O. Hoffm. III, 256;

Krookii O. Hoffm. III, 257; VI, 370 Nierembergia angustifolia H. B. K. var. \*intermedia Hassl. IX, 121

(Nitraria Billardieri DC.) VIII, 420 - Roborowskii Kom. VIII, 420

(- Schoberi Aitch.) VIII, 420

(– – Gmel. var. γ Billardieri Kom.) VIII, 420

Nolina Altamiranoana Rose V, 254

- elegans Rose V, 115 Nelsoni Rose V, 115
pumila Rose V, 116

Nomaphila siamensis C. B. Clarke I, 176 Nonea paniculata Grecescu X, 216 Nothofagus megalocarpa C. Reiche VIII,

251 (Nothopanax Bockii Harms) VI, 45

(- Davidii (Franch.) Harms) VI, 45 (- Delavayi (Franch.) Harms) VI, 45

- parvum (Kirk) Cock. VIII, 221

(- Rosthornii Harms) VI, 45 \*Nothoscordum Mairei Lévl. VII, 384 \*Notochlaena Buchtienii Rostenst. V,

\* - Herzogii Rosenst. VI, 175 \*Notochloe Dom. nov. gen. X, 117

\* microdon Dom. X, 117 \*Nototriche bicolor Pax VII, 111 \*Notylia Buchtienii Schltr. X, 458

\* - coffeicola Schltr. X, 393

- Durandiana Cogn. I, 110 Glaziovii Cogn. I, 110

\*- Koehleri Schltr. X, 393 Iyrata Sp. Moore var. β major

Cogn. I, 111 - microchila Cogn. I, 108

— stenantha Rchb. var.  $\beta$  angustifolia Cogn. I, 111

(Nuphar centricavatum Schuster II, 94

— juranum Magn. VI, 28

— pumilum (DC.) Spreng. var. \*stellatifidum Schuster II, 94

Nymphaea alba L. var. \*intermedia Gave V, 196

(— alba var. oocarpa Casp.) VIII, 320 (— biradiata Sommerauer) VIII, 320 \*— Esquirolii Lévl. et Vant. III, 350

(- gracilis Zucc.) V, 191

Nymphoides peltatum (Gmel.) Rendle et Britten VIII, 437

Oberonia Betchei Schltr. IX, 92

\*— borneensis Schltr. VIII, 563 \*— celebica Schltr. X, 23 \*— exaltata Schltr. X, 21 — glandulosa Ldl. IX, 93

\*— hastata Schltr. X, 21 — heliophila Rchb. IX, 93

\*-- Hosseusii Schltr. II, 84

\*— Hosseush Schitt, II, 94

\*— inversiflorum J. J. Smith X, 487

(— iridifolia Krzl.) IX, 92

\*— mahawoensis Schltr. X, 25

\*— masarangica Schltr. X, 22

\*— neglecta Schltr. IX, 26

\*— Odoardi Schltr. IX, 431

\*- Odoardi Schltr. IX, 431

\*- pleistophylla Schltr. X, 22 (— pusilla F. M. Bailey) IX, 433 \*— rhizophoreti Schltr. X, 23

\*- sarawakensis Schltr. IX, 342

\*— siamensis Schltr. II, 84 \*— singalangensis Schltr. IX, 432 \*— tomohonensis Schltr. X, 24

(- verticillata Krzl.) IX, 92 \*- vulcanica Schltr. X, 24

(Obione pusilla Wedd.) IV, 37 Ochna Klainei van Tiegh. VI, 15 — rubricaulis van Tiegh. VI, 15 Ochnella aurea van Tiegh. VI, 12 — axillaris van Tiegh. VI, 12

- capitata v. Tiegh. VI, 12

Chevalieri van Tiegh. VI, 13
ndellensis van Tiegh. VI, 13

ovalifolia van Tiegh. VI, 13
tenuipes van Tiegh. VI, 12 Ochrocarpus sanguineus Jum. et Perr. de la Bathie IX, 569

\*Ocotea amplissima Mez. III, 68

\*- architectorum Mez III, 70

\*- caniflora Mez III, 69 \*- cardinalis Mez III, 69

\*- gracilipes Mez III, 71 \*-- monzonensis Mez III, 71

\*- subrutilans Mez III, 70 \*Octarrhena Amesiana Schltr. IX, 439

\* - angraecoides Schltr. IX, 217

\*- celebica Schltr. X, 189 \*- ensifolia Schltr. IX, 217

\*— nana Schltr. IX, 217 \*- oberonioides Schltr. IX, 217

\*- saccolabioides Schltr.

\*Octomeria tenuis Schltr. X, 455 Octotheca nov. gen. Vigu. VI, 47

plerandroides Vigu. VI, 47
 Odonia acapulcensis Rose V, 109

brachystachys (Benth.) Rose V, 109
incana Rose V, 109

— multiflora (Robins.) Rose V, 109

- retusa Rose V, 109

viridiflora Rose V, 109
Wrightii (A. Gr.) Rose V, 109
Odontadenia Kochii Pilg. VIII, 151 Odontites serotina Rehb. b. albiflora

Terracc, V, 139

\*Odontochilus klabatensis Schltr. X, 12 ×Odontoglossum Ariadne (O. nobile  $9 \times 0$ . Wattianum Crawshayanum 6

Crawshay VI, 356

X— Astarte (O. Harryanum Q X O. tripudians 3) Crawshay VI, 355

X— Astraea (O. Fascinator Q X Wattianum Crawshayanum 3) Crawshay

VI, 355

(— Warscewiczii Rchb. f.) III, 249 Oenone guyanensis Pulle III, 286 (Oenothera arcuata Kell.) VI, 106

(- biennis var. canescens Torr. et Gr.) VIII, 12

 – var. strigosa (Rydb.) Piper VIII, 12 \*- Heribaudi Lévl. VIII, 280

(— Lindleyi Dougl.) VI, 105 (— marginata Nutt.) VIII, 12

(- Nuttallii Torr. et Gr.) VIII, 12

\*- scabra Krause I, 168 \*- serratifolia Krause I, 168

(— tanacetifolia Torr. et Gr.) VIII, 12 \*- Weberbaueri Krause I, 169

Oldenlandia pulvinata (Balf. f.) Vierh. VII, 163

- - f. congesta Vierh. VII, 163 - f. laxa Vierh. VII, 163

\*Oleandra Werneri Rosenst. V, 40 Olearia divaricata Cock. VIII, 223

— homolepis F. v. M. var. pilosa A.

J. Ewart VIII, 410

pachyphylla Cheesem. IX, 408

 speciosa J. Hutch. V, 78 - Toppi A. J. Ewart and White VIII,

\*Olmedia Habas Pax VII, 108 (Olyra concinna Hook. f. IX, 39)

- laterale (Presl) A. Chase IX, 38 (- nana Doell) IX, 39

- pineti Wright) IX, 38

polypodioides Trin) IX, 39
semiovata Trin. var. \*pubescens

Hack. VIII, 46

( - strephioides Gris.) IX, 40

(- strictiflora Hemsl.) IX, 39 (- sympodica Doell.) IX, 39

 yucatana A. Chase IX, 38 (Omphalobium obliquum Presl) X, 247

(- pictum Blanco) X, 247

(Omphalodes cappadocica Alb. Pr.) IX, 192

— (Willd.) DC. var. intermedia

Kusn, IX, 192 – var. Wittmanniana (Stev.) Kusn. IX, 192

(- cornifolia  $\beta$  subsericea C. A. Mey.) IX, 192

\*Onagra fusca Krause I, 167 (- strigosa Rydb.) VIII, 12

\*Oncidium Beyrodtianum Schltr. VIII,

\*— bolivianum Schltr. X, 459

\*— Cabagrae Schltr. IX, 292 \*- costaricense Schltr. IX, 30

\*- guatemalense Schltr. X, 362

\*- Johannis Schltr. X, 362 \*- megalous Schltr. IX, 30 \*— Pittierii Schltr. IX, 31

\*- Tonduzii Schltr. IX, 31
\*- Turialbae Schltr. IX, 3 - ultrajectinum Pulle IV. 373 Versteegianum Pulle X, 283

\*— Williamsii Schltr. X, 459

Oncoba angustifolia De Wild, III, 161 \*Onobrychis paucijuga Bornm. III, 131 Ononis angustissima Lam. var.  $\beta$  falcata (Viv.) Dur. et Barr. IX, 351

(- falcata Viv.) IX, 351

— Hackelii Lge.  $\beta$  augustata Samp. IV, 383

leptocarpa C. Pau III, 322

- Natrix L. var. glaberrima Loj. Poj. V, 27

(— γ stenophylla Boiss.) IX, 351 - polysperma Barr. et Murb. V, 205 - pusilla L. f. macrantha Vacc. VIII,

- rotundifolia f cuneata Vacc. VIII,

329 (Onopordon arenarium Pomel) IX, 468 × Beckianum (acanthium × illyricum)

John VII, 336 - longissimum Pau III, 326

 Sibthorpianum Boiss, et Heldr. var.  $\beta$  arenarium (Pomel) Dur. et Barr. IX, 468

\*Onosma asperrimum Bornm. VIII, 542 — β \*latifolium Bornm. VIII, 542

- Cyrenaicum Dur. et Barr. IX, 468 (— echinatum Viv., non Desf.) IX, 468

\*- Haussknechtii Bornm. VIII, 543 \*- macrophyllum Bornm. VIII, 539

\*- nemoricolum Hausskn. et Bornm. VIII, 541

\*- Sintenisii Hausskn. VIII, 540

- Trapezunteum Boiss, et Huet X, 309 Ophioglossum vulgatum var. Englerianum Ulbr. VIII, 49

\*Ophiopogon Argyi Lévl. IX, 77 \*— Cavaleriei Lévl. VI, 266

\*- Fauriei Lévl. et Vant. V, 283

\*- lofouense Lévl. IX, 78 Regnieri D. Bois III, 367 \*- Taquetii Lévl. VIII, 171

(Ophryosporum solidaginoides var. Bonplandianus (Sch Bip.) Hieron.) IV, 146 Ophrys ambusta K. Picard III, 31

apifera Huds, b. pauciflora Terr. V,

140

 Arachnites (L.) Lam. f. elongata A. Terr. VIII. 492

— – f. longebracteata A. Terr. VIII, 492

×— araniferiformis (O. super-aranifera × Bertolonii) D. T. et Sarnth. III, 143 bombyliflora Lk. f. elongata A Terr. VIII, 492

- fusca Lk. f. maxima Terr. VIII, 493 × - Grampinii (O. aranifera × tenthredinifera) F. Cort. I, 141

- Iutea Cav. f. grandiflora Terr. VIII, 493

Reinholdii H. Fleischm. VI, 125

- ripaensis Porta VIII, 485

- tenthredinifera W.  $\beta$  neglecta (Parl.) f. gracilescens A. Terracc. VIII, 492 Oplismenus compositus (L.) P. Beauv.

var. loliaceus (Lam.) Hack. IV, 307 (- Ioliaceus (Lam.) P. Beauv.) IV, 307

Opuntia aulacothele Weber II, 79 - Chapistle Weber II, 76

Darrahiana Weber II, 77
elata var. Delaetiana Weber II, 79 - Grosseiana Weber II, 78

- guanicana (K. Schum.) Gürke VIII, 225

- leptarthra Weber II, 80

- Nashii N. L. Britt. V, 181 purpurea R. E. Fries III, 365
subterranca R. E. Fr. III, 365

testudinis Crus Weber II, 77
utahensis J. A. Purp. VIII, 428

- velutina Weber II, 78 vivipara Rose IX, 138 Wagneri Weber II, 80

Orania Beccarii Bailley IX, 547 Orchis candida Terracc. VIII, 493

(- chusua Don var. nana King et Pantl.) IX, 434

- conopea L. var. \*latifolia Gave V, 196

\*- cylindrostachya Kränzl. V, 197 Cyrenaica Dur. et Barr. IX, 472

× — Darcisii (O. fragrans × picta) Murr III, 143

\*- Delavayi Schltr. IX, 433

X— Gelmiana (O. purpurea × simia)D. T. et Sarnth. III, 143

( — habenarioides King et Pantl.) V, 197 — Kromayeri M. Schulze III, 62

(- vulgare L.) IX, 534

Origanum vulgare Brot, non L.)VIII, 460 Orchis latifolia L. var. carnea R. Neum. laxiflora a, typica f, albiflora Terracc. VIII, 493 — — f. grandiflora Terracc. VIII, 493 - L. var. elabiata R. Keller II, 148 ( - maculata L. var. ochrantha Panč.) - f. recurvifolia M. Brenner X, 320 Morio L, var. albicans Linding. II, 101 — var. albiflora Linding. II, 101 - war. carnea Sabr. VII, 236 — var. flava Sabr. VII, 236 — var. incarnata Linding. II, 101 -- - var. subpicta Sabr. VII, 236 \*- nana (King et Pantl.) Schltr. IX, 434 ochrantha (Panč.) Fleischm, VII. 239 – var. Wettsteinii Fleischm. VII. 239 — palustris Jacq. var. micrantha Dom. I, 131 — papilionacea L. a. typica f. vexillifera A. Terracc. VIII, 493 - pauciflora v Fischer V, 198 \*— Pontica Fleischm. et Hand.-Mzt. X, 401 serbica H. Fleischm. VII, 237 - tridentata Scop. a. typica f. commutata (Tod.) Terracc. VIII, 493 ustulata L. var. angustiloba A. Trott. IX, 190 f. rubriflora J. Vetter VI, 32 Oreiostachys Gamble nov. gen. VI, 328 - Pullei Gamble VI, 329 Oreocarya hispida A. Nels. et P. B. Kenned. IV, 285 — spiculifera Piper VIII, 161 \*Oreocharis Cavaleriei Lévl. VII, 258 \*- Esquirolii Lévl. IX, 329, 447, X, 64 \*- Léveilléana Fedde X, 64 \*- Notochlaena Lévl. IX, 330 \*— parvula Schltr. X, 483 \*— primuloides Lévl. IX, 330 \*- sericea Lévl. IX, 329 (Oreopanax capitatus Decne. et Planch.) VI, 46 (- Liebmannii March.) VI, 46 (Oreopolus patagonica Speg.) IV, 139 Oreorchis Seguini Lévl. V, 222 Oreothyrsus glabrisepalus Lind. var. pubisepalus Th. Val. V, 391 (Origanum creticum Brot., non L.) VIII, 460 (— macrostachyum Brot.) VIII, 460

(- - Hoffgg. et Link) VIII, 460

- virens Hoffgg, et Link  $\alpha$  genuinum

— β macrostachyum P. Cout, VIII,

 $(--\beta \text{ spicatum Rouy}) \text{ VIII, 460}$ 

(— virens Ficalh.) VIII, 460

(- virens Rouy) VIII, 460

P. Cout. VIII, 460

460

 $(--\beta)$  prismaticum Ficalh.) VIII, 460 (- - var. virens Brot.) VIII, 460 Ormenis nobilis J. Gay var. 2. augustiflora Mer. VIII, 64 (Ormocarpum bibracteatum Bak.) VI. 165 \*Ornithidium Biolleyi Schtr. IX, 29 \*- bracteatum Schltr IX, 217 \* - costaricense Schltr. VIII, 456 Löfgrenii Cogn. I, 95 \*— parvulum Schltr. IX, 292 \*— Tonduzii Schltr. III, 250 \*- Weberbauerianum Kränzl. I, 91 Ornithocephalus graciliscapus Cogn. VI, 62 \*- xiphochilus Schltr. III, 251 Ornithogalum barba caprae Aschers, et Barb. IX, 473 \*- Kurdicum Bornm. V, 135 (— Leichtlinii Stapf) V, 135 — montanum Cyr. IV, 303 — — c. angustifolium Terracc. IV, 303 — g.) graciliflorum Terracc. IV, 304 — — e.) macropodum Terracc. IV, 304 — — b.) microcarpum Terracc. IV, 303 — — d.) pauciflorum Terracc. IV, 303 — — f.) plicatum Terracc. IV, 304 (- Persicum Hausskn.) V, 135 (Ornithopus ebracteatus Brot) VIII, 437 \*Orobanche Bodinieri Lévl. IX, 451 - Cyrenaica Beck IX, 469 minor Sm. f. concillata Beck IX, 138 \*— Myrtilli Lévl. et Labbé VII, 259 rigens Lois, var. nigricans G. Beck III, 124 (Orobus hirsutus  $\beta$  glabratus Griseb.) X, 308 Nicolai Rohl. I, 25 niger L. f. longipes Rohl. I, 22 - vernus L.f. latissimus C.G. Westerld. IV, 19 (Orthopogon Ioliaceus Spreng.) IV, 307 \*Orthosiphon Delavayi Lévl, IX, 218 (Oryza clandestina A. Br.) III, 137 - oryzoides (L.) Dalla Torre et Sarnth. III. 137 (Oryzopsis lejocarpa Speg.) IV, 277 (— napostaënsis Speg.) IV, 277 Osmorrhiza brevistylis DC.) IV, 137 - Claytoni (Michx.) Macl. IV, 137 Osmunda regalis L. var. \*sublancea Christ V, 284 Ostenia Buchen, n. gen. III, 90 - uruguayensis Buchen. III, 91 (Osteomeles pyracantha Decne.) III, 223 Schwerinae C. K. Schn. III, 222 Osteospermum elegans Bol. VII, 151 — tripinnatum Bol. IV, 199 Osyricera ovata Bailey VIII, 80 (Otopetalum Tunguraguae F. C. Lehm. et Krzl.) X, 292

Otophora resecta Radik. VIII, 189 Ottelia latifolia De Willd III, 164 (- sinensis Lévl.) V, 10 Oubangia denticulata v. Tiegli. V, 118 - Duchesnei (Engl.) v. Tiegh. V, 119 - Klainei v. Tiegh. V, 119 - laurifolia (Pierre) v. Tiegh V, 118 - Tholloni v. Tiegh. V, 118 (Oudneya africana R. Br.) IX, 349 Ouratea intermedia De Wild. X, 428

- Thonneri De Wild. X, 429 \*Ourisia modesta Diels VII, 114 Ourouparia formosana (Mats.) Hayat.

VI. 196

Ovidia tenera Macl. IV, 137 (Oxalis angustifolia H. B. K.) VI, 261 – corniculata L. var. \*trichocaulon

Lévi, VIII, 284

(- decaphylla H. B. K.) VI, 256 Deppei Lodd) VI, 260

(- divergens var. amplifolia Trel.) VI, 255

(- Drummondii A. Gr.) VI, 256 (- fasciculata Turcz.) VI, 261 (- Galeottii Turcz.) VI, 257 (- Hernandesii DC.) VI, 258 - insignis T. A. Spr. II, 126

(— Jacquiniana H. B. K.) VI, 258 (— Jasiandra Zucc.) VI, 259 (- latifolia H. B. K.) VI, 258

— loricata Dus. I, 115 (— lunulata Zucc VI, 259 (— madrensis S. Wats.) VI, 262 morrumbalaensis De Wild. III, 165

(- Neaei DC.) VI, 261

— — var. glabrata Bak.) VI, 261

- pentantha Jacq.) VI, 261 - psilotricha Turcz.) VI, 261 (- Schiedeana Zucc.) VI, 260

- striata L. var. decumbens Bitt, VI, 119

(- tetraphylla Cav.) VI, 260 (- tephrodes Turcz.) VI, 261

(- vespertilionis Zucc.) VI, 262

Oxandra Riedeliana R. E. Fries II, 190 \*Oxyanthera carinata (Bl.) Schltr. X, 186 Oxycoccus oxycoccus var. intermedius (A. Gr.) Piper VIII, 14

Oxypetalum argentinum Malme I, 121

- brachystemma Malme I, 115 - cordifolium (Vent.) Schltr. VIII, 531

- curtiflorum Malme I, 120

— Dusenii Malme II, 103 - huilense Pitt. VIII, 532

 longipes Malme I, 116 – obtusifolium Malme II, 105 \*- reflexum Malme VI, 347

- sublanatum Malme II, 104 - tridens Malme I, 118 - tubatum Malme II, 102

- uruguayense Malme I, 117

Oxytenanthera Borzii Matei IX, 411 \*\_ Hosseusii Pilg. III, 116

-? ruwensorënsis Chiov. VI, 180 \*Oxytropis argyroleuca Bornm. III, 131

baldshuanica B. Fedtsch. IV, 319
Boguschi B. Fedtsch. IV, 318
guntensis B. Fedtsch. IV, 318

 mumynabadensis B. Fedisch. IV, 319 - Roaldi C. H. Ostenf. X, 511

roseaeformis B. Fedtsch. IV, 319

Pachylophus canescens Piper VIII, 12 marginatus (Nutt.) Piper VIII, 12 \*Pachyphyllum falcifolium Schltr. X, 460 \*- minus Schltr. X, 460 Pachypodium Baroni Cost. et Bois V,

248 - Drakei Cost. et Bois V, 249 - Geavi Cost. et Bois V,

- ramosum Cost. et Bois V, 247 (Pacourea guyanensis Aubl.) III, 290 \*Padus acrophylla C. K. Schn. I, 70

- brachypoda (Batal.) C. K. Schn. var. \*pubigera C. K. Schn. I, 70 - napaulensis (Ser.) C. K. Schn. f.?

I, 68 (- racemosa var. pubescens C. K.

Schn.) IX, 36 (- serotina pyramidalis C. K. Schn.)

VI, 335 (- velutina (Batal.) C. K. Schn.) I, 69

- Wilsoni C. K. Schn. I, 69 \*Paederia Dunniana Lévl. X, 146 \*- Esquirolii Lévl. X, 146

(Paeonia Biebersteiniana Rupr.) VII, 23 corallina Retz. subsp. triternata (Pall.) Boiss var. coriifolia (Rupr.) Busch VII, 23

(- - var. Wittmanniana f. macro-

phylla Alb.) VII, 23 (- hybrida Pall.) VII, 23

(— macrophylla Lomak.) VII, 23 (— tenuifolia Huth) VII, 23

- – L. var. Biebersteiniana (Rupr.) Busch VII, 23

(— — β hybrida Lipsk.) VII, 23

(- triternata f. coriifolia Rupr.) VII, 23

- Veitchii I. Lynch VIII, 383 - Wittmanniana Stev. f. macrophylla

Alb. VII, 23

Palaguium Vidalii (Pierre mss.) M. Dub. X, 512

\*Palicourea glabrata H. Winkl. VIII, 3

\*- mollis H. Winkl. VIII, 4 \*- obliqua H. Winkl. VIII, 4

(Pallenis spinosa b. montana N. Terracc.

V, 138 Palovea riparia Pulle III, 287

\*Paltonium vittariiforme Rosenst. X, 341 (Panargyrus abbreviata Hook, et Arn.) IV, 141

(Panagyrus Darwinii Hook. et Arn.) (- Lagascae DC.) IV, 141 - laxa Phil.) IV, 141 (- subspinosa Phil.) IV, 142 (Panax amplifolium Bak.) VI, 47 (- Davidii Franch.) VI, 45 — Delavayi Franch.) VI, 45 (- simplex Forst, f. var. parvum T. Kirk) VIII, 221 (- Zippelianum Miq.) V, 388 Pandanus Ijzermanni Boerl. et Koorders (Panicularia elata Nash) VI, 74 - nervata var. elata (Nash) Piper VI, 74 (Panicum adustum Nees) IV, 29 — var. \*leianthum Hack. VI, 342 (— aequiglumae Hack. et Arech.) IV, 273 (— aristidoides Willd.) V, 75 (— auriculatum Willd.) V, 305 (— autumnale Bosc.) IV, 30 (- badium Scribn, et Merr.) IV, 29 - barbinode Trin. f. \*pilifera Hack. X, 381 \*— Benthami Dom. X, 59 - Borzianum Mattei IX, 318 bulawayense Hack VI, 323 (- chloroticum Nees) VI, 343 - coenicolum F. Muell.) IV, 30 (— cognatum Schultes) IV, 30 (— coryophorum Kunth) V, 306 (- curvatum L.) V, 306 debile Dsf. var. aequiglumae Hack. IV, 273 (— divaricatissimum R. Br.) IV, 30 (- divergens Muhl., non H. B. K.) IV, 30 \*- Dusenii Hack. VIII, 513 erectum Pollacci IX, 494 (— fasciculatum y carthaginense Arech.) VI, 343 \*- Fiebrigii Hack. VIII, 46 - firmum Aresch. X, 299 - Friesii Hack. IV, 87 (- frondescens Mey.) V, 305 \*— fultum Hack. VI, 342 \* - globoidenm Dom. X, 119 (- grumosum Nees) VI, 343 - Hochstetteri Steud. var. gracilis Chiov. VI, 5 (- hordeoides Lam.)! V, 67 (- indicum L.) V, 306 - insulare (Lin.) Mey. var. penicilligerum (Speg.) Hack. IV. 273 – – var. sacchariflorum (Raddi) Hack. IV, 273 — var. tenerrimum (Kth.) Hack. IV, 273 (— lachnanthum Torr., non Hochst.) (— laterale Presl) IX, 38 – laxum Sw. var. \*amplissimum Hack. VI, 343

Panicum Lilloi Hack. IV, 306 (- loliaceum Lam.) IV, 307 (- macratenium Benth.) IV, 30 malacophyllum (Tr.) O. Ktze. var. cordobense O. Ktze. IV, 271 (- myosurus Rich.) V, 306 -- mynrus Lam.) V, 306 \* notochtonum Dom. X, 60 (- paludicola Nees) V, 305 (- palustre Trin.) V, 305 - pinifolium Chiov. VI, 5 (- Pittieri Hack.) IV, 29 (- polystachyum Presl) V, 305 - proliferum Lam, var. \*chloroticum (Nees) Hack. VI, 343 var. decompositum (R. Thell. V, 360 (- purpuracens H. B. K.) IV, 308 queenslandicum Dom. X, 58 \*- retiglume Dom. X, 19 — rivulare Trin. var. grumosum (Nees) Hack. VI, 343 rugulosum Trin. var. \*condensatum Hack. VI, 344 f. \*effusum Hack. VI, 343
saccharatum Buckl.) IV, 29 (- sacchariflorum Steud.) IV, 273 sanguinale L. var. digitatum Hack. subvar. anisotrichum Hack. VI, 206 — war. scabriglume Hack. V, 335 spectabile Nees var helodes Hack. IV, 273 - stenotaphroides Nees) IV, 30 - stoloniferum Poir.) V, 306 - strumosum Presl) V, 306 - tenerrimum Kunth) IV, 273 (- vaginatum Gr. et G.) IV, 306 - velutinosum Nees f. violascens Stuck, IV, 274 (- vilvoides Trin.) V, 306 (- vulpinum Willd.) V, 67 Papaver aegadicum Loj. Poj. III, 332 \*- anisotrichum K. Wein IX, 228 - apicigemmatum Fedde I, 47 balanocarpum K. Wein IX, 244 \*- cinerascens K. Wein IX, 242 \*— coloradense Fedde VII, 256 \*- columbianum Fedde VII, 255 \*- commixtum K. Wein IX, 226 dubium L. b. lucanum Terracciano V, 136 \*- fastidiosum K. Wein IX, 242 \*- Fauriei Fedde VII, 257 \*x - Feddeanum (P. rhoeasxstrigosum) K. Wein IX, 172 - humifusum Fedde I, 47 - humile Fedde I, 45 \*— interjectum K. Wein IX, 243 — intermedium Becker var. caudati-

folium Fedde subvar, parvicaudatum

\*— intricatum K. Wein IX, 241

Fedde I, 30

Papaver Kerneri Hay.  $\beta$ puniceum

Hav. VIII, 320

 nudicaule L. ssp. \*radicatum (Rottb.) Fedde var. y \*coloradense Fedde VII.

 – – var. α \*columbianum Fedde VII, 255

- - var.  $\beta$  \*pseudocorydalifolium Fedde VII, 256

– ssp. xanthopetalum (Trautv.) Fedde var. \*Fauriei Fedde VII, 257 obtusifolium Desf. var. angusti-

folium Loj. Poj. III, 331 — – var. \*Barbeyi Fedde I, 46 \*— omphalodeum K. Wein IX, 228

\*- Osswaldii K. Wein IX, 173 \*- paucisetum K. Wein IX, 227 - Postii Fedde I, 47

\*- propinguum K. Wein IX, 225

\*- pseudocorydalifolium Fedde 256

- radicatum Rottb. var. Hartianum Simmons VIII, 77

-- rapiferum Fedde I, 31

 rhoeas var. \*crassicostatum K. Wein IX, 463

- - var. \*fallax K. Wein IX, 464

- var, \*lepidum K. Wein IX, 464

— var. montenegrinum Rohl I, 34 — var. omphalophorum Fedde I, 29 - - var. rumelicum (Velen.) Fedde I, 30

(— — var. vestitum Gr. et Godr.) III, 332

(- Roubiaei Vig?) III, 332

\*- Schinzianum Fedde VIII, 573 — Sendtneri A. Kerner  $\beta$  roseolum Hay. VIII, 320

\*- spurium K. Wein IX, 314

- strigosum (Bönningh.) Schur var. Gaillardotii Fedde I, 46

stylatum Boiss. et Bal. var. psammophilum Fedde I, 48

 subadpressiusculo-setosum Fedde I. 44

- subpiriforme Fedde I, 30

– syriacum Boiss, et Blanche var. stylatoides Fedde I, 45

Tenerifae Fedde I, 44

- tenuissimum (Heldr.) Fedde I, 46 - Tinei Lanza III, 332; VIII, 48

Paphiopedilum glaucophyllum Sm. var. Moquetteanum Sm. V, 289

- villosum Pfitz. var. annamense Rolfe V, 78

Pappophorum alopecuroideum Vahl f. coerulescens Stuck. IV, 278

— caespitosum R. E. Fries IV, 89 mucronulatum Nees f. elatius Stuck. IV, 278

-- mucronulatum Nees var. subsimplex Hack. IV, 343

Pappophorum nigricans R. Br. var. \*polyphyllum Dom. IX, 552

\*Paracaryum turcomanicum Bornm. et Sinten X, 420

Paradolichandra Chodati Hassl. var. \*brachycalyx Hassl. IX, 59

\*Parameria Esquirolii Lévl. IX, 325

\*Paratrophis Ostermeyeri Rech. V, 130

\*- viridissima Rech. V, 130 \*- Zahlbruckneri Rech. V, 130

Parietaria ruwenzoriensis Cortesi VI. 190 \*Paris aprica Lévl. VI, 265

- Cavaleriei Lévl. et Vant III, 372

Debeauxii Lévl. III, 372
\*- Dunniana Lévl. IX, 78 gigas Lévl. III, 372
Hookeri Lévl. VII, 231 \* pinfaensis Lévl. VI, 265

(— penicilligerum (Speg.) Hack.) IV, 273

(- Perrotteti Kth.) IV, 30 (- phleiforme Presl) V, 306 Vanioti Lévl III, 372 Parkia silvatica Pulle IV, 375 \*Parnassia Filchneri Ulbr. II, 65 – mexicana Rose V, 254

\*- Petitmengiui Lévl. VIII, 285 Paronychia arabica DC. var y Cossoniana (J. Gay) Dur. et Barr. IX, 351

 – var. δ desertorum (Boiss.) Dur. et Barr. IX, 351

 — var. β tripolitana Dur. et Barr. IX, 350

(— argentea Coss.) IX, 350

 canariensis Juss, var. α expansa Pitard IX, 210

(— Cossoniana J. Gay) IX, 351 (- desertorum Boiss.) IX, 351

 imbricata Rchb. var. Durmitorea Rohl. I, 26

Parosela argyrostachys (Hook. & Arn.) Rose VI, 252

- Berlandieri (A. Gr.) Rose VI, 252

- Brandegei Rose VI, 252

- canescens (Mart. & Gal.) Rose VI, 250

- citriodora (Willd.) Rose VI, 249 - Cliffordiana (Willd.) Rose VI, 250

— cyanea (Greene) Rose VI, 251 -- eriophylla (S. Wats.) Rose VI, 252 Eysenhardtioides (Hemsl.) Rose VI, 250

- glaberrima (S. Wats.) Rose VI, 249

- gracilis (Kunth) Rose VI, 251 — Hemsleyana Rose VI, 250

— inconspicua (Schauer) Rose VI, 250 - insignis (Hemsl.) Rose VI, 249

- laevigata (G. Don) Rose VI, 251 - lasiostachya (Benth.) Rose VI, 252 — leucostoma (Schldl.) Rose VI, 252

— leucostachys (A. Gr.) Rose VI, 250 - luisiana (S. Wats.) Rose VI, 251

Parosela microphylla (H. B. K.) Rose VI, 252

- mucronata (DC.) Rose VI, 249

 naviculifolia (Hemsl.) Rose VI, 250 nigra (Mart. & Gal.) Rose VI, 251
oaxacana Rose VI, 250

- Painteri Rose VI, 251

— pauciflora Rose VI, 251

- pectinata (Kunth) Rose VI, 249 - plumosa (S. Wats.) Rose VI, 252 polyphylla (Mart. & Gal.) Rose VI, 249

- psoralioides (Moric.) Rose VI, 250 - Purpusi (Brandeg.) Rose VI, 252

- revoluta (S. Wats.) Rose VI, 251 - Seemani (S. Wats.) Rose VI, 252 - sericea (Lag.) Rose VI, 251

- trochilina (Brandeg) Rose VI, 250 - tuberculata (Lag.) Rose VI, 250

vetula (Brandeg.) Rose VI, 250
Watsoni Rose VI, 251

Parsonia rotata Maid. et Betch. V, 56 (Parvatia chinensis Franch.) V, 343 Paspalum Bakeri Hack. IV, 113

\* - Bertonii Hack. X, 165 \* - Buchtienii Hack. VI, 153 \*- crispatum Hack. VII, 370

(- Digitaria Poir.) IV, 306

distichum Linn, var, Digitaria Hack.

- war. Turleyi Bailey IX, 545 - dolichophyilum Hack. IV, 112

(- elongatum Gris.) IV, 272

 fasciculatum Willd. var. \*paraguayense Hack. VII, 370

- Herzogii Hack. VII, 50

 Humboldtianum Fluegge var. Stukkertii Hack. IV, 306

Jürgensii Hack. VII, 312malacophyllum Trin. var. \*linearifolium Hack. VI, 341

— var. longipilum Hack. IV, 271 - marginatum Trin. var. \*longecilium

Hack. VII, 370 ovale Nees var. \*apiculatum Hack.

plicatulum Michx. var. \*longipilum

Hack. VI, 342 — var. \*multinode Hack. VI, 342

\*- pruinosum Hack. VII, 311

- quadrifarium Lam. var. elongatum (Gris.) Hack. IV, 272

\*- Rojasii Hack. VII, 369

\*- Stuckertii Hack. IV, 272, 306

- Usterii Hack. V, 1

(-? velutinum Kth.) IV, 30 virgatum L. var. \*subplicatum Hack

VI, 342 Passerina hirsuta L. var. microphylla Reyn. VIII, 34

Passiflora Bolstadii Dus. VII, 261 cancellata Cav. var. \*cordata Hassl. VII, 378

Passiflora glaucophylla Pulle III, 290 - mattogrossensis R. E. Fries var. \*lobata Hassl. VII, 377

(- Morongii Sp. Moore) VII, 382 — oblongifolia Pulle III, 289

(- platyloba R. E. Fries) VII. 383

 rhodantha Hochr, var. β discolor Hassl. VII, 377

 — var. α genuina (Hochr.) Hassl. VII, 377

– var. γ pusilla Hassl. VII, 378

— sessiliflora H. B. K. var. β acutifolia Gürke 7. f. \*ecostata Hassl. VII, 378

Üleana Dus. VII, 260

 Warmingii Mast. subsp. chacoënsis Fries VI, 204

Patagonium arenicola R. E. Fr. IV, 22 - Clarenii R. E. Fr. IV, 24

- Nordenskjöldii R. E. Fr. IV, 23 - occultum R. E., Fr. IV, 21

 Schickendantzii (Gris.) R. E. Fr. IV, 22

Patersonia sericea R. Br. var. \*dissimilis Dom. X, 60

(Patrinia ceratophylla Hook.) VIII, 268 villosa Juss. var. \*japonica Lévl.

- - var. sinensis Lévl. X, 439 \*Paullinia anodonta Radlk. IX, 374 \*- plagioptera Radlk. IX, 374

Paulownia Duclouxii Dode X, 272 — imperialis Sieb. et Zucc. var. γ

lanata Dode V, 272 - - var.  $\beta$  pallida Dode X, 271

 meridionalis Dode X, 272 Paulseniella nov. gen. Briq. VI, 72

 pamirensis Briq. VI, 72 Pausinystalia Pierre nov. gen. V, 309

— Microceras Pierre V, 309

— Trillesii Beille V, 309

— Yohimba Pierre V, 309

Pavetta appendiculata De Wild. III, 166 Pavonia apiculata R. E. Fr. VIII, (117) 392

(— Balansae Gürke) VII, 382 — campestris R. E. Fr. VIII, (114) 391

 costaricensis Hochr. III, 169 (- diuretica S. Hil.) VIII, 114

— Gürkeana R. E. Fr. VIII, 497 - - var.  $\alpha$  major R. E. Fr. VIII, 498

— — var.  $\beta$  minor R. E. Fr. VIII, 498

(- hastata Cav. var. α pubescens Gürke f. a. longifolia Gürke) III, 397, 497

(- Hieronymi Gürke) VIII, 116

- hirsuta Guill. et Perr. var. genuina Hochr. III, 169

- var. minorifolia Hochr. III, 169 - Iaetevirens E. E. Fr. VIII, (30), 394

- Ianata R. E. Fr. VIII, 396

Pavonia Malmeana R. E. Fr. VIII, 499
— mattogrossensis R. E. Fr. VIII, 395

- melanommata Rob. et Seat. var. Pringleana R. E. Fr. VIII, 391

(- Morongii Morong, non Sp. Moore) VIII, 118

- opulifolia S. Moore) VIII, 31

(— var. major Sp. Mooré) VIII, 31 (— orbicularis Ulbr.) VIII, 115, 116 platyloba R. E. Fr. VIII, 393

prionophylla R. E. Fr. VIII, 397 - rosa-campestris A. Juss. var. tomentella R. E. Fr. VIII, 394

- var. tomentoso-velutina Hochr. III. 169

 sagittata A. Juss. var. α genuina R. E. Fr. VIII, 395

 – var. β conjungens R. E. Fr. VIII, 396

\* - sapucayensis Hassl. VIII, 42

 Schrankii Spr. var. angustifolia R. E. Fr. VIII, 395

(- sidifolia H. B. K.) VIII, 114

-- subhastata Tr. et Pl var. \*laetevirens (R E. Fr.) Hassl. VIII, 30

 — ssp. paludosa Hassl. var. c. mollis Hassl. f. y opulifolia (Sp. Moore) Hassl. VIII, 31

 Urbaniana Gürke var. γ macrantha R. E. Fr. VIII, 499

(Paxia Dewevrei De Wild. et Dur.) X,

 Soyauxii (Gilg) Pierre X, 243
 \*Pelea? acutivalvata Lévl. X, 153 (Pedicellaris verticillata Boiss.) VIII, 136 - - var. caespitosa (Webb) Pau VIII,

136 ×Pedicularis Bicknelli (P. incarnata × Allionii) Sommier V, 259

(- Bourgeaui Max.) III, 74

(- caespitosa Webb) VIII, 136 — caucasica M. B.  $\beta$  albiflora Boiss.

\*f. minutiflora Bornm. III, 75

(- Chorgonica Regel et Winkl.) III, 74

- comosa Boiss.) VIII, 136 - L. var. nevadensis Pau VIII, 136

 interrupta Steph.) III, 74 \*- Kusnetzovi Kom. IX, 391

\*- Lalesarensis Bornm. III, 72 (- platyrrhyncha Schrenk) III, 74

– pontica Boiss. var. \*glabrata Bornm. III, 74

- pulchra O. Pauls. IV, 46

- pycnantha Boiss. var. \*glabrata Bornm. III, 75

resupinata L. f. c. pubescens Kom. V, 274

— b. ramosa Kom. V, 274 - - a. umbrosa Kom. V, 274

 silvatica L. var. γ latifolia F. Cout. VIII, 220

\*Pedicularis Straussii Hauskn. III, 73 - verticillata L. f. lilacina E. Steiger

IV, 69 (— Wilhelmsiana Fisch.) III, 75 Pegolettia dentata Bol. VII, 128

Peireskia bahiensis Gürke VI, 300 Peireskiopsis autumnalis Eichlam VIII, 237

\*Pelea Fauriei Lévl. X, 153

\*- Feddei Lévl. X, 442 \*- foetida Lévl. X, 152

\*- grandipetala Lévl. X, 443 \*- Hillebrandii Lévl. X, 152

\*- Léveilléi Faurie X, 442

\*- nodosa Lévl. X, 443 \*- oahuensis Lévl. X, 442

\*- peduncularis Lévl. X, 443 \*- penduliflora Lévl. X, 442

\*- sessilis Lévl. X, 152 \*- singuliflora Lévl. X, 443 \*- subpeltata Lévl. X, 442 \*- waianaiensis Lévl. X, 442

Pelexia Glaziowii Cogn. var. paraguayensis Cogn. V, 312

- setacea Lindl var. \*glabra Cogn. VII. 123

Peliosanthes Mantegazziana Pamp. III,

- Teta Andr. var. Mantegazziana Pamp.) III, 207

Pellaea Lilloi Hick. VII, 171 Pellionia Kochii Th. Val. V, 378

(Penicillanthum latifolium Vieill.) V, 269 ( - racemosum Vieill.) V, 269

(Penicillaria chinensis Nees) V, 75 Pennisetum asperifolium (Desf.) Kth. f. genuina Leeke V, 69

f. tiberiadis Leeke V, 69
bambusiforme Hemsl.) V, 73

 beckerioides Leeke V, 71 - Benthami Steud. var. nuda Hack. V, 336

- var. sambesiense Hack. V, 335

– var. ternatum Hack. V, 336

(- breviflorum Steud.) V, 67 - caffrum (Bory) Leeke V, 75 (- cenchroides Rich.) V, 67 (- chinense (Nees) Steud.) V, 75

ciliare (L.) Link var. genuina Leeke

— var. leptostachys Leeke V, 68 - var. pallens (Fenzl) Leeke V, 68 - var. setigera (Vahl) Leeke V, 68

(- distachyum Rupr.) V, 73 (- distylum Gust.) V, 68

(- fasciculatum Trin.) V, 70 - Foermerianum Leeke V, 70 - prutescens Leeke V, 74

(- geniculatum Thunb.) V, 67 - giganteum Rich. var. genuinum

Leeke V, 76 -- - var. minor Leeke V, 76

140 (Pennisetum Griffithii Munro) V, 70 (- hordeoides (Lam.) Steud.) V, 67 humile Hochst, var. secernenda
 Leeke V, 76 (- imberbe Edgew.) V, 67 ( - incomptum Nees) V, 67 indicum (Murr.) O. Ktze. var. nuda Leeke V, 67 🗕 — — subvar. I. hordeoides Leeke V, 67 – -– — subvar. II. parviflora Leeke V, 67 (- lanatum Klotz) V, 66 - laxum Hochst. V, 73 ( - longifolium Fenzl) V, 68 num Leeke V, 68

(— macrourum Engl.) V, 76

— Merkeri Leeke V, 75

— Mezianum Leeke V, 75

(— numidicum Paris) V, 70 - orientale Rich. V, 70 - - var. fasciculatum Leeke V, 70 — — var. Griffithii Leeke V, 70 (- - subsp. Parisii Trab.) V, 70 – var. Parisii Leeke V, 70 (- parviflorum Trin) V, 67 (- petraeum Steud) V, 67 (- plumosum Hochst.) V, 70 (— Preslii Trin.) V, 73 — Pringlei Leeke V, 74 - proximum Leeke V, 69 - rigidum (Gris.) Hack. IV, 274 - rigidum (Gris.) Leeke V, 75 - rufescens Hochst.) V, 67 - secernendum Hochst. V, 76 (— sinaicum Desne.) V, 70 (- Teneriffae Steud.) V, 67 (— tenue Fig. et de Not) V, 70 (— Tiberiadis Boiss.) V, 69 — trisetum Leeke V, 72 – var. Galeottiana Leeke V, 73

 longistylum Hochst, var. clandesti-VIII, 443 purpurascens (Thunbg.) O. Ktze. f. chinensis Leeke V, 75 tristachyon (H. B. K.) Spreng. var. Krautt. VII, 329 bambusiformis (Hemsl.) Leeke V, 73 — — var. genuina Leeke V, 73 – var. Jamesonii Leeke V, 74
– var. Ruiziana Leeke V, 74 (- Vahlii Kth.) V, 68 - variabile Fig. et de Not.) V, 70 \*Pentace Esquirolii Lévl. X, 149 Pentanisia pentasiana Mattei IX, 348 Piper VIII, 267 (Pentapetes suberifolia L.) V, 349 Pentatropis? novoguineensis Th. Val. 267 V, 390 Pentochna nov. gen. v. Tiegh. VI, 15

— ramosa van Tiegh. VI, 15 Pentopetia alba Jum. et P. d. l. Bath IX, 295 androsaemifolia Dcsne. var. cordi-

folia Cost. et Gall. IV, 376; VIII, 437

Pentopetia androsaemifolia var. Cowani Cost. et Gall. VIII, 437

- ssp. lanceolata Cost. et Gall. VIII, 438

- - ssp. multiflora Boivin VIII, 438 — ssp. ovalifolia Cost. et Gall. VIII, 440

— — ssp. pilosa Cost. et Gall. VIII, 438 - - var. scabra Cost. et Gall. VIII, 437

- bidens Jum. et P. d. I. Bath. IX, 295 — boinensis Jum. et P. d. l. Bath. IX,

- Boivini Cost, et Gall. VIII, 444

 Cotoneaster Dcsne. ssp. Acustelma Cost. et Gall. VIII, 443

— — ssp. glabra Cost. et Gall. VIII, 442 – ssp. Pentopetiopsis Cost, et Gall.

– – ssp. Thouarsii Cost. et Gall. VIII, 441

elastica Jum. VII, 391

— graminifolia Cost, et Gall, VIII, 440 mollis Jum. et P. d. I. Bath. IX, 295 - pinnata Cost. et Gall. VIII, 443

- reticulata Jum. et P. d. l. Bath. IX,

(Pentopetiopsis ovalifolia Cost, et Gall.) IV, 377; VIII, 443

(Pentstemon azureus var. ambiguus Gr.) IX, 484

– var. Jaffrayanus A. Gr. VII, 330

( — var. parvulus) A. Gr. VII, 330 (— calycosus Small) VII, 329 - Cardwellii Howell) VIII, 267 (— crassifolius Lindl.) VII, 329

( - Davidsonii Greene) VIII, 267

(- Douglasii Hook.) VII, 329

- fruticosus var. Cardwellii (Howell) Piper VIII, 267

- (Pursh) Greene var. crassifolius (Lindl.] Krautt. VII, 329

- glaber Pursh var. Wardi (A. Gr.)

Gormani Greene VI, 28

(— heterophyllus Wats.) IX, 484 (- - var. latifolius Wats.) VII, 330 — latifolius (Wats.) Krautt. VII, 330

(— linearifolius Coult. et Fisch.) VII, 329 Lyalli A. Gr. var. linearifolius (Coult.

et Fisch.) Krautt. VII, 329 — Menziesii var. Davidsonii (Greene)

(— – var. Douglasii A. Gr.) VII, 329 (- ovatus var. pinetorum Piper) VIII,

- parvulus (A. Gr.) Krautt. VII, 330

- pinetorum Piper VIII, 267 - sepalulus A. Nels. IX, 484

 Smallii Heller var. calycosus (Small) Krautt. VII, 329

(- veronicaefolius Greene) VIII. 267

(Pentstemon Wardi A. Gr.) VII, 329 Peperomia bracteata Hill V, 351

campylotropa Hill V, 352cyclaminoides Hill V, 350 elongata Kth. IX, 235

- emarginella C. DC. f. \*glabrior C. DC. IX, 235

\*- Esquirolii Lévl. X, 149 - falsa Hill V, 351

\*- Fauriei Lévl. X, 151 - Gaudichaudii Hill V, 351

\*— Helleri Lèvl. X, 151 — minuta Hill V, 350 — parcicilia C. DC. VII, 214

(- peruviana Dahlst.) V, 351 - pseudofurcata C. DC. IX, 235 \*- refractifolia Lévl. X, 151

- rupiceda C. DC. V, 352

- rupiteda C. BC. V, 352
- scandens R. et P. IX, 285
- septentrionalis St. Brown IX, 188
- tjibodasana C. DC. VII, 214
(- umbilicata Kth.) V, 352
(- umbilicata R. et P.) V, 351, 352
(- var. macrophylla C. DC.) V, 352 verruculosa Dalılst. V, 350

\*Peplis Portula L. f. \*callitrichoides Rohl. 1, 12

Peramium decipiens (Hook.) Piper VI, 79 (- Menziesii Morong) VI, 79 Perezia pilifera (Don) Macl. IV, 143 \*Pergularia apiculata Warb. III, 346

\*- brevituba Warb. III, 347 \* - celebica Warb. III, 347

\*Periila Cavaleriei Lévl. VIII, 425 (Peristylus Hallieri J. J. Sm.) IX, 338 (— Orchidis Krzl.) VI, 197

(Pernettya microphyla Gaud.) IV, 138

\*Persea boldufolia Mez III, 66 \*- crassifolia Mez III, 67

\*- durifolia Mez III, 65 \*— Weberbaueri Mez III, 66

×Petasites Rechingeri (albus × hybridus) Hay. II, 143

saxatilis Kom. V, 277

Petastoma discocalyx Bur. et K. Schum. var. \*brachyandra Hassl. IX, 53 \*- truncatum (Sprague) Hassl. IX, 53

 var. \*grandiflorum Hassl IX, 53 — — var. parviflorum Hassl. IX, 53 Petraea arborea H. B. K. IX, 366

Petrocallis pyrenaica R. Br. var. pubescens Vacc. VIII, 327

\*Petrocosmea Cavaleriei Lévl. IX, 329 \*- Martini Lévl. IX, 329

(- sinensis Lévl.) IX, 329

(Petrophyes agriostaphis Webb) III, 26 - brachycaulon Webb et Berth. var.

β Canariae Pit. IX, 276 – var. γ Gomerae Pit. IX, 276

 – var. α Teneriffae Pit. IX, 275 (Petroselinum sativum Hoffm.) VIII, 257

- vulgare (Lam.) Fritsch VIII, 257

Petrosimonia Korshinskyana Litw. IX, 559 (Peumus rubra Mol.) VIII, 488

Phaca adsurgens (Pall.) Piper VII, 220

- agrestis (Dougl.) Piper VII, 220 - alpina (L.) Piper VII, 219

— arrecta (A. Gr.) Piper VII, 219 arrecta var. Leibergii (Jones) Piper VII, 219

- Beckwithii (Torr. et Gr.) Piper VII, 219

- conjuncta (S. Wats.) Piper VIII, 11 convallaria (Greene) Piper VIII, 11

- decumbens (Nutt.) Piper 11

(- depauperata Phil.) IV, 21

 glareosa (Dougl.) Piper VII, 218 - Hoodiana (How.) Piper VII, 220 inflexa (Dougl.) Piper VIII, 218 - lentiginosa (Dougl.) Piper VII, 218 Lyallii (A. Gr.) Piper VII, 219
misella (S. Wats.) Piper VII, 219

misera (Dougl.) Piper VIII, 11
Mortoni (Nutt.) Piper VII, 220

(— pulchella Clos) IV, 21

– Purshii (Dougl.) Piper VII, 218 - reventa (A. Gr.) Piper VII, 220 — — var. Canbyi (Jones) Piper VII, 220

(- saxifraga Phil.) IV, 21 serotina (Nutt) Piper VIII, 11
sinuata Piper VII, 219

- Spaldingii (A. Gr.) Piper VII, 219 - speirocarpa (A. Gr.) Piper VII, 219 – stenophylla (Torr. et Gr.) Piper

VII, 219 - succumbens (Dougl.) Piper VII, 219

Suksdorfii (How.) Piper VII, 218
tincta (Jones) Piper VII, 218 - Tweedyi (Canby) Piper VII, viridis (Nutt.) Piper VIII, 11

Phacelia calthifolia Brand IX, 388 - filiformis Brand IX, 387

 geraniifolia Brand IX, 386 - glandulifera Piper VIII, 15

Hallii Brand IX, 387
incana Brand IX, 386 irritans Brand IX, 385

- orogenes Brand IX, 385 (- pachyphylla Coville) IX, 388 vallicola Congdon IX, 386

Phaeopappus declinatus Boiss. \*niveus Bornm. V, 167

Phajus amboinensis Bl. X, 68 (- Blumei Kränzl.) IX, 98

\* celebicus Schltr. X, 68 - Graeffei Rehb. IX, 98

 Incarvillei (BL) O. Ktze. X, 67 \*- stenocentron Schltr. X, 68

(Phalacraea latifolia  $\beta$  glabra DC.) IV, 146

Phalaenopsis amabilis var. \*moluccana Schltr. X, 193

\*— cruciata Schltr. VIII, 457

\*— psilantha Schltr. X, 193

Phalaris coerulescens var. maderensis Menez. V, 117 - maderensis Menez. V, 117

(-- oryzoïdes L.) III, 137

- stenoptera Hack, V, 333

(Pharbitis acuminata Choisy) VIII, 230 Phaseolus angularis (Willd.) W. F. Wight VIII, 488

(Phegopteris Dryopteris Fée) VI, 185 \*Philadelphus Henryi Koehne X, 126

- incanus var. \*Sargentianus Koehne

— — f. \*hupehensis Koehne X, 126

— — f. \*kulingensis Koehne X, 127 ×— magnificus (Ph. inodorus×latifolius) Köhne VI, 335

- Schrenckii Rupr. var. \*Jackii Koehne

X, 127

- sericanthus Koehne var. \*Rehderianus Koehne X, 127

- venustus Koehne VI, 335 Philibertia reflexa Pitt. VIII, 475 (Philippodendron regium Poit.) III, 169 \*Phippsia Wilczeckii Hack. VII, 321 Phleum alpinum L f. subhirsutum Rohl. 1, 28

(- Bertolonii DC.) V, 142

- pratense L. c. Bertolonii Terracc. V, 142

— — var. typicum A. et Gr. lusus bracteatum A. Br. m. furcatum Zobel IV, 300

vulgare A. et Gr. f. pseudonodosum

W. Gugl. VII, 45

\*Phlomis Esquirolii Lévl. VIII, 425

\* - Souliei Lévl. IX, 222

 tuberosa L. β longifolia Sireitsch. VIII, 227

 tuberosa L. α typica Sireitsch. VIII, 227

Phlox dejecta Nels. et Kenned. V, 287 Phoebe Hainesiana Brandis V, 260

\*- heteropetala Mez III, 67 \*Pholidota celebica Schltr. X, 19

 imbricata Ldl. var. \*platyphylla Schltr. X, 19

\*- Minahassae Schltr. X, 20

Phoradendron surinamense Pulle III, 286 Photinia Becki C. K. Schn. III, 153

— Bergerae C. K. Schn. III, 153

- birmanensis C. K. Schn. III, 154

\*- Bodinieri Lévl. IV, 334 \* Cavaleriei Lévl. IV, 334

(— Fortuneana Maxim) III, 223 - lasiogyna (Franch.) C. K. Schn. III, 153

lucida (Decne.) C. K. Schn. III, 154
notabilis C. K. Schn. III, 154

 parvifolia (Pritzel) C.K. Schn. III, 153 - prionophylla (Franch.) C. K. Schn. III, 153

\*Photinia rubro-lutea Lévl. IX, 460 salicifolia (Decne.) C. K. Schn. III, 155

(- villosa DC. var. laevis (Thbg.) Dipp.) III, 154

 - var. typica C. K. Schn. III, 154
 - var. Zollingeri (Decne.) C. K. Schn. III, 154

(Phragmites communis var. nigricans Godr. et Gren.) III, 140

– var. subuniflora (DC.) Dalla Torre et Sarnth. III, 140

( - longivalvis Steud.) VIII, 488

- vulgaris var. longivalvis (Steud.) W. F. Wight VIII, 488

(Phreatia angraecoides Schltr.) IX, 217

\*- Baileyana Schltr. IX, 433 (- ensifolia Ames) IX, 217

\*- klabatensis Schltr. X, 189 - Koordersii Rolfe X, 188 limenophylax Bth. IX, 110

\*- Loriae Schltr. III, 318

(- macrophylla Fleischm. et Rech.) IX, 109

\*- masarangica Schltr. X, 188 (- minutiflora Krzl.) IX, 109 (- nana Hk. f.) IX, 217

\*- nebularum Schltr. IX, 216 (- oberonioides Schltr.) IX, 217

\* - obtusa Schltr. IX, 108

(— parvula Ames, non Benth.) IX, 438 \* potamophila Schltr. X, 187

( – pusilla R. A. Rolfe, non Lindl.) IX, 433

\* - Reineckei Schltr. IX, 109

( - saccolabioides Schlfr.) IX, 217 - samoensis (Krzl.) Schlfr. III, 320, IX, 109

\*- sarcothece Schltr. IX, 438 \*- Smithiana Schltr. III, 319

\*— upoluensis Schltr. III, 319; IX, 110 Phteirospermum Esquirolii Bonati IV, 96 (Phyllactis macrorhiza Pöpp.) IV, 139 \*Phyllanthodendron Cavaleriei Lévl. IX, 454

\*- Dunnianum Lévl. IX, 324

\*— siamense (Pax et K. Hoffm.) Hoss. X, 116

Phyllanthus acida (L.) Skeels VIII, 488 \*- Lauterbachianus Pax VIII, 325

- liukinensis Mats. I, 43 - Matsumurae Hay. 1, 42

- Niinamii Hay. I, 43

- petraeus Beille VIII, 319 - sandwicensis Muell. var. \*hypo-

glauca Lévl. X, 124 - saxicola Small III, 269

- tenuirhachis J. J Sm. IX, 309 Phyllocactus Purpusii W. Weing, IV, 222 Phyllodoce aleutica (Spreng.) Mak. VIII, 112

- nipponica Mak. VIII, 111

(Phyllodoce Pallasiana D. Don) VIII, 112 (- taxifolia Boiss.) VIII, 111

(- taxifolia Franch.) VIII, 111

(- taxifolia  $\beta$  aleutica Herd.) VIII, 112 Phyllonoma tenuidens Pitt, VIII, 466

- triflora Pitt. VIII, 466

Phyllopodium linearifolium Bol. VII, 155 Phyllostachys edulis (Carr.) J. Houz. de Leh. IV, 31

(- pubescens Mazel) IV, 31

mitis Mak.) IV, 31

Phymaspermum appressum Bol. IV, 198 Physalis Alkekengi L. var. \*anthoxantha Lévl. VI, 266

- Fauriei Lévl. et Vant. VI, 126

(— Hermanni Dun.) IX, 121

 minima L. var. \*Hermanni (Dun.) Hassl. IX, 121

-- - f. \*paraguariensis Hassl. IX,

 suberifera Dun, var. \*crassifolia Hassl. IX, 121

\*Physochlaina pseudophysaloides Pasch VII, 166

dahurica Miers em. Pasch. VII, 166

\*— dubia Pasch. VII, 166 \*- lanosa Pasch, VII, 167

\*- macrocalyx Pasch. VII, 167

\*Physosiphon andinum Schltr. X, 450 (Physospermum verticillatum (W. K) Vis.) VIII, 257

Physostegia formosior Lun. VIII, 246 (Physurus Lilyanus H. Fleischm. et Rech) IX, 87

- Iongicornu Cogn. V, 316 \*- stictophyllus Schltr X, 450

\*— Türkheimii Schltr. II, 132 Phyteuma comosum L. var. Beguinotii Bolz. V, 189

orbiculare L, var. Guarense Pau VII, 86

- spicatum L. ssp. 2. caeruleum R. Schultz c. foliosum Vacc. X, 265 Phytolacca rigida Small III, 265

- thyrsiflora (Fenzl) Schmidt var.

reducta Heimerl VI, 81 Picea asperata Mast. IV, 110

aurantiaca Mast. IV, 110
complanata M. T. Mast. IV, 366

 excelsa f. nidiformis Beissn. VI, 339

Mastersii Mayr VIII, 91

(- Maximowicziihort. non Reg.) VIII, 91 montigena M. T. Mast. IV, 366

(- obovata var. japonica hort. non Max.) VIII, 91

- purpurea Mast. IV, 109

retoflexa Mast. IV, 111
 Tschonoskii Mayr VIII, 91

 Watsoniana Mast. IV, 109 Picnomon Acarna Cass. f. longispina Vand. IX, 527

\*Picramnia pendula Herz. VII, 58 Picridium intermedium Sch. Bip. var.

macrophylla Pit. IX, 278

 – var. ε microphylla Pitard IX,278 - tingitanum Desf. var. gaditanum Mer. VIII, 287

Picris hieracioides L. var. aragonensis Pau IX, 191

- var. subalpina Arvet-Touv. III, 92

- Kelleriana Arvet-Touvet II, 115 Pieris buxitolia Lévl. et Vant. III, 262 \*- coreana Lévl. V, 281

- echioides L. var. crepidiformis

Thell. V, 368

- Esquirolii Lévl. III, 262

 – var. discolor Lévl. III, 263 – var. leucocalyx Lévl. III, 263

\*- Fauriei Lévl. V, 281 - Henryi Lévl. III, 262 - lucida Lévl. III, 263

 ovalifolia var. denticulata Lévl. et Vant. III, 263

- Ulbrichii Lévl. III, 262

\*- vaccinium Lèvl. IX, 448 Piersonia Harkn. VII, 194

Pilocarpus pennatifolius Lem. emend. Hassl. X, 345 — var. \*genuinus Hassl. X, 346 — – f. \*gracilis (Chod. et Hassl.) Hassl. X, 346

— — f. \*latifoliolatus Hassl. X, 346

— — f. \*typicus Hassl. X, 346 — — var. \*Šelloanus (Engl.) Hassl. X, 346

— — f. \*brasiliensis Hassl. X, 347 - - f. \*intermedius Hassl. X, 346

- - f. \*paraguariensis Hassl. X, 347

(— pinnatifolius Engl.) X. 345, 346

(- Selloanus Engl.) X, 345

(- - var. gracilis Chod. et Hassl. X, 346

Pilocereus Fouachianus Weber II, 75

 setosus Gürke VI, 131 Straussii E. Heese VI, 117

(Pimpinella anisoides var. Gussonei Ross) VI, 36

Rossi Loj. Poj. VI, 36
saxifraga L. var. bipinnata W. Rothert VI, 124

Pinaropappus spathulatus Brdg. III, 380 Pinellia cochinchinense (Bl.) W. F. Wight VIII, 488

Pinguicula corsica Bern et Gren. var.

coerulescens Briq III, 125

– — var. pallidula Briq. III, 125 \*Pinus Argyi Lemée et Lévl. VIII, 60

\*- - var. \*Iongevaginans Lévl. VIII, 60 - Banksiana f. Annae Schwer. VIII,

\*- Cavaleriei Lemèe et Lévl. VIII, 60

Pinus densata Mast. IV, 108 Piper lanceolatum R. et Pav. IX, 230 — lonchites Wall. X, 520 — macrostachyon C. DC. X, 522 excelsa f. adnata Beissn. VII. 361 (- Frieseana Wich.) VII, 88 (- genevensis Hort Endl.) VII, 89 \*- makruense C. DC. X, 521 - horizontalis Don) VII, 88 mapirense C. DC β \*magnifolium (- lapponica [P. septentrionalis] Mayr) C. DC. 1X. 230 \*- Meeboldii C. DC. X, 521 \*- nagaense C. DC. X, 520 VII, 88 \*- levis Lemée et Lévl. VIII, 60 Mastersiana Hay. VIII, 365 - nepalense Miq. X, 520 montana Dur. var. caucasica Medw.  $--\beta$  parvifolium C. DC. X, 529 VIII, 448 nigrum L. var. \*mysorense C. DC. - morisonicola Hay. VIII, 365 X, 522 \*- nana Faurie et Lemée VIII, 60 - pedicellatum C. DC. X, 520 - pinifolia (Phil.) Hieron. IV, 144 \*— phalangense C. DC. X, 518 - prominens Mast. IV, 109 \*-- pilirameum C. DC. IX, 229 (- rubra Mill.) VII. 88, 89 -- pinguispicum C. DC. et Koord. - silvestris L. var. mongholica Litw. VII, 213 IV, 11 \*— praeacutilimbum C. DC. IX, 231 \*– puberulinerva C. DC. IX, 231 (- scotica Willd.) VII, 88 sylvestris i. aquitana Schott VII, 89 \* - punctulantherum C. DC. IX, 233 - e. batava Šchott VII, 89 - Schmidtii Hook f. X, 520 - - c. borussica Schott VII, 88, 89 \*- semimetrale C. DC. IX, 232 - - engadinensis Heer) VII, 89 - sulcatum Sod. IV, 48 - - Haguenensis Loud.) VII, 89 \*- Talbotii C. DC. X, 523 \*- trichogynum C. DC. IX, 233 ( – horizontalis Antoine) VII, 88 (- - intermedia Ant.) VII, 88 trichostachyum C. DC. X, 523Usterii C. DC. V, 64 (- - vulgaris genevensis Bauh.) VII, – var. plurifistulosum C. DC. V, 64 - - a. lapponica G. Schotte VII, 88 Piptadenia communis Benth var. \*iner- – h. pannonica Schott VII, 89 mis Hassl. VIII, 552 (- - rigensis Desf.) VII, 88 (Piptochaetium chaetophorum (- - rubra Endl.) VII, 89 IV, 277 — — d. scotica (Willd) Schott VII, 88 leiocarpum (Speg.) Hack. f. sub-papillosum Hack. IV, 308 - - b. septentrionalis Schott VII, 88 - - f. superrhenana Schott. VII, 89 napostaënse (Speg.) Hack. IV, 277 – g. vindelica Schott VII, 89 ovatum Desv. var. chaetophorum
 (Gris.) Hack. IV, 277 (Piper angustifolium R. et Pav. var. cordulatum C. DC.) 1X, 230 (- panicoides Gris.) IV, 308 \*- aurorubrum DC, X, 519 Piptothrix aegiroides Robs. I, 89 \*Pipturus hawaiensis Lévl. X, 124 boehmeriaefolium Wall. X, 520 \*- Buchtieni C. DC. IX, 230 - candicans Sod. IV, 48 Piqueria artemisioides Benth. non H. B. K. IV, 145 - Candollei Sod. IV, 49 ( – artemisioides H. B. K.) IV, 145 - callitricha B. L. Rob. IV, 146 \*- charopanipanum C. DC. IX, 234 - cilibracteum C. DC. VIII, 213 — Cumingii B. L. Rob. IV, 144 cochleatum Sod. IV, 49 - Hartwegii B. L. Rob. IV, 145 - latifolia (DC.) Gardn. var. glabra \*- coriaceilimbum C. DC. IX, 234 \*- crenulatibracteum C. DC. X, 521 (DC.) B. L. Rob. IV, 146 - Mathewsii R. L. Rob. IV, 145 - elongatum Vahl var. \*cordulatum - peruviana (Gmel.) B. L. Rob. IV, C. DC. 1X, 230 145 – var. Ossanum C. DC. IX, 230 – pilosa H. B. K. var. Pringlei (Ro- geniculatum Sw. 1X, 230 \*- guanainum C. DC. IX, 232 - hispidum Sw. IX, 230 bins. et Seat.) B. L. Rob. IV, 144 (- Pringiei Rob. et Seat.) IV, 144 – var. magnifolium C. DC. IX, 230
– hylophilum C. DC. IX, 230 \*Piriqueta carnea Urb. IV, 131 \*- densiflora Urb. IV, 129 — Duarteana Urb. var. \*Ulei Urb. IV, hymenophyllum Miq. f. b. C. DC. X, 522 \*— scabrida Urb. IV, 130

Pirola alpina \*Andres X, 136 (— asarifolia Cl.) X, 140

(— — Mchx. var. japonica Miq.) X, 141

\*- Kapruanum C. DC. X, 519

khasianum C. DC. X, 520
laevilimbum C. DC. IX, 232
lainatakanum C. DC. X, 519

Pirola chlogantha Sw. f. composita Andr. (Pirus coronaria var. ioensis Wood) X, 142 III, 178 - f. monstr. dichotoma Andr. X. (— crataegifolia Savi) III. 178 143 (— cuspidata Bert.) III, 151 (— Decaisneana Nich.) VII, 174 (- Cusickii Greene) VIII, 270 (— Delavayi Franch.) III, 180 (— Doumeri Boiss.) III, 180 — Fauriei C. K. Schn. III, 121 (— dentata Sm.) VIII, 13 (-- var. integra A. Gr.) VIII, 13 elliptica Nutt var. morrisonensis
 Hayata VI, 27, 58 (— fusca Raf.) III, 178 (— gracilis S. et Z.) X, 514 × Graebneriana v. Seem. (P. minor × rotundifolia) f. subminor Andr. X, 143 (- granulosa Bert.) III, 151 ×— — f. subrotundifolia Andr. X, 143 (- irregularis Münchh.) III, 133 (- hirta Greene) VIII, 270 (- kansuensis Bat.) III, 178 (— japonica Sieb.) X, 141 (— media S. et Z.) X, 141 — minor L. f. bella Andr. X, 135 \*— Koehnei C. K. Schn. III, 119
— Koehnei Lévl. X, 378
— kolupana C. K. Schn. III, 120 (- Korshinskyi Litw. Mss. III, 118 f. pseudorotundifolia Andr. X, 134 — lanata Hort.) VII, 174 — — f. ramosa Andr. X, 135 - Malus var. mitis Wallr.) III, 178 — — f. serotina Andr. X, 135 (- Maulei Masters) III, 180 — var. Vollmanniana Andr. X, 136 (- melanocarpa var. subpubescens (- pallida Greene) VIII, 13 Lindl.) III, 151 \*- mokpoensis Lévl. VII, 200 picta var. dentata (Sm.) Pip. VIII, 13 nivalis Jacq. var. elaeagnifolia C. K.
 Schn. III, 119 — — var. integra (A. Gr.) Pip. VIII, 13 (— racemosa T. et G.) VIII, 270 (- rotundifolia Herd.) X, 141 — — var. Kotschyana C. K. Schn. — L. 2, americana Sw. C. dahurica III, 119 Andr. X, 141

— B. japonica (Sieb.) Andr. - var. typica C. K. Schn. III, 119 (- Pollveria L.) III, 133 — Pratti Hemsl. III, 178 (— rivularis Dougl.) III, 178 X, 141 – var. arenaria K. X, 138 - - var. incarnata DC. X, 138 sinensis Lindl. var. \*Maximowicziana Lévl. X, 377 - - 3. nephrophylla Andr. X, 142 — 1. rotundifolia Fern. B. chinen- spectabilis Ait. var. \*albescens Lévl. X, 377 sis Andr. X, 139 \*- subcrataegifolia Lévl. VII, 199; X,377 — — var. commune Andr. X, 139 — — var. laurifolia Andr. X, 140 \*- Taqueti Lévl. VII, 199 (- Thomsoni Hook. f.) Ill, 151 - - - f. quercifolia Andr. X, 140 (- transitoria Batal.) III, 178 -- - var. sphaeroidea Andr. X, 139 — C. indica Andr. X, 140 (- Tschonoskii Maxim.) III, 179 — A. rotundifolia Andr. f. comosa ( ursina Wall.) X, 516 \*— Vanioti Lévl. VII, 200 H. Andr. X, 138 - Wilhelmi C. K. Schn. III, 120 — — f. microphylla Genty mss. X, 138 Piscaria setigera (Hook.) Pip. VIII, 11 Pisonia ambigua Heimerl VI, 81 — — — var. pulchella Andr. X, 138 \*Pitcairnia eximia Mez III, 5 — — — f. monstr. pyramidalis Andr. X, 139 \*- fruticetorum Mez III, 4 \*- grandiflora Mez III, 5 - - D. tibetana Andr. X, 140 \*- macrochlamys Mez III, 6 - - f. herbacea Andr. X, 141 \*- mirabilis Mez III, 6 soldanellifolia Andr. X, 136 \*- sceptrigera Mez III, 7 (- sparsifolia Suksdf.) VIII, 13 Pithecoctenium cynanchoides P. DC. Pirus (= Pyrus) Aria Ehrh. var. mavar. \*pellucidum Hassl. IX, 55 jestica Prain VII, 174 - Aucuparia var. glabrata Wim. et (— echinatum K. Sch. var. γ intermedium Hassl.) IX, 56 Grab.) III, 133 - var. \*tomentosum Hassl. IX, 56
- f. \*grandiflora Hassl. IX, 56 — auricularis Knoop) III, 133 ( – baccata var. mandshurica Max.) IX, 136  $(-- var. \alpha typicum Sprag.) IX, 56$ \*- brunnea Lévl. X, 377 - Vitalba P. DC. var. \*rostratum bucharica Litw. Mss. III, 118 Hassl. IX, 56 — — f. 1. \*glabratum Hassl. IX, 56 (— cathayensis Hemsl.) III, 180 (- Conwentzii Graebn.) III, 136

— — f. 2. \*intermedium Hassl. IX, 56

146 Pithecolobium flavovirens N. L. Britton | V, 179 \*— pithecolobioides (Harms) Hassl. var. Harmsii Hassl. VIII, 557 — var. \*reductum (Malme) Hassl. VIII, 557 (- reductum Malme) VIII, 557 - revolutum Rose V, 192 \*Pittierella Schltr. n. gen. III, 80 \*- calcarata Schltr. III, 81 \*Pittosporum Fauriei Lévl. X, 121 - formosanum Hayata VI, 193 \*- Hillebrandii Lévl. X, 121 Pituranthos Rohlfsianus (Aschers.) Dur. et Barr. IX, 352 — tortuosus Benth. et Hook. var. β virgatus (Coss. et Kral.) Dur. et Barr. IX, 352 Pityrodia coerulea (F. v. M. and Tate) Ewart and White IX, 176 Piuttia nov. gen. Mattei V, 76 (Plagianthus betulinus A. Cunn.) III, 169 - regius (Poit.) Hochreut, III, 169 (Plantago akkensis Coss.) V, 211 – akkensis Murb, V, 211 \*- Cavaleriei Lévl. II, 114 - coelorhiza Macl. et Morris IV, 139 \*- coreana Lévi. VIII, 284 Coronopus L. var. ceratophylla
 Hoffgg. et Link f. angustifolia-glabrescens Bég. VI, 126 - Cyrenaica Dur. et Barr. IX, 471 \*- Fauriei Lévl. X, 151 \*— Gaudichaudiana Lévl. X, 151 \*- gigas Lévl. II, 114 - Ianceolata L. b. angustifolia Terracc. V, 140 — — f.  $\beta$  bifurca Mer. VII, 368 — var. capitata Decs. f. α pleiocephala Mer. VII, 368

— f. latifolia A. Trott. X, 220 – var. sphaerostachya Mart. et Koch f. vernalis Bég. VII, 390 - major L. var. luxuriosa J. Lun. IX. 404 — media L. f. pygmaea Witte II, 123 Purpusi Brdg. III, 378
serpentina Vill. f. polystachya E. Steig. IV, 69 \*- Taquetii Lévl. VIII, 283 - Thalackerii Pau VIII, 137 \*Platanthera Amesiana Schltr. IX, 212 \*- Delavayi Schltr. IX, 281

\*— Finetiana Schltr. IX, 23

- Okuboi Mak. VI, 288

\*— sororia Schltr. II, 166

\*— Souliéi Kränzl. V, 199

\*— Matsumurana Schltr, II, 167

\*— halconensis (Ames) Schltr. IX, 212

— montana (Schm.) Rchb. var. lanci-folia Rohl. l, 38

Platanus cretica Dode X, 219 — densicoma Dode X, 219 - orientalior Dode IX, 574 Platyclinis formosana Schltr. VI, 199 \*Platydesma oahuensis Lévl. X, 154 Platylepis heteromorpha Rchb. f. IX, 86 \*- Morrisonii Schltr. IX, 161 \*Platystele Schltr. nov. gen. VIII, 565 \*— bulbinella Schltr. VIII, 565 Plectaneia elastica Jum. et Perr. d. l. Bath. VIII, 247; IX, 239 — f. firingalavensis Jum. VIII, 251 (— firingalavensis Jum.) VIII, 251 - inutilis Jum. et Perr. d. l. Bath. VIII, 249; IX, 238 - rhomboïdalis Jum, et Perr. d. 1. Bath. 1X, 238 \*Plectranthus Cavaleriei Lévl. IX, 247 - crassus N. E. Br. Ill, 188 \*- Esquirolii Lévl. IX, 247 \*- Hosseusii Muschl. IV, 268 Krookii Gürke III, 255 \*- moslifolius Lévl. IX, 247 \*- Volkensianus Muschl. IV, 268 Plectronia stipulata De Wildem. III, 166 Pleione yunnanensis Rolfe IV, 169 Pleocnemia Leuzeana Prsl. var. \*echinocarpa Rosenst, X, 337 - war. \*lobato-crenata Rosenst. X. 338 - membranacea Bedd. var. \*novoguineensis Rosenst. X, 338 Plerandropsis nov. gen. Viguier VI, 46 — Bonii Vig. VI, 47 Pleurogyne Forresti Balf. fil. VIII, 156 Pleurophora saccocarpa Koehne var. \*Fiebrigi Koehne VIII, 199 - var. \*glabrescens Koehne VIII, 199 \*Pleurothallis abbreviata Schltr. X, 352 - acutidentata Cogn. VI, 59 \*— acutipetala Schltr. X, 353 — Archidonae Lindl. I, 179 — Barbosana De Wild. IV, 369 \*— Beyrodtiana Kränzl. VI, 65 \*- boliviana Schltr. X, 453 - calcarata Cogn. VI, 58 \*- Cogniauxiana Schltr. III, 246 (- Cogniauxiana Kränzl, non Schltr.) VI, 65 deltoglossa Cogn. VI, 59 \*— divaricans Schltr. X, 385, 387 \*— dolichopus Schltr. X, 394 - elegantula Cogn. VI, 56 \*— formosa Schltr. X, 291 \*- frutex Schltr. X, 454 \*— leucantha Schltr. X, 353 \*— listerophora Schltr. III, 107 \*— lyroglossa Schltr. VIII, 566 - Macaheensis Cogn. VI, 57 - microtatantha Schltr. III, 276 \*— muricata Schltr. X, 293

\*Pleurothallis nigroannulata Cogn. VI, 306 \*— nigro-hirsuta Kränzl. l, 91 \*— otopetalum Schltr. X, 292 \*— oxyglossa Schltr. X, 354 \*— Pansamalae Schltr. X, 354 \*- papuligera Schltr. X, 453 - var. \*macra Schltr. X, 454 \*- pedicellaris Schltr. X, 395 \*— penduliflora Kränzl. Í, 177 — Pittierii Schltr. 247 \*— platystylis Schltr. X, 395 — Pringlei Schltr. III, 20 \*- scopula IX, 28 \*— serrisepala Kränzl. VI, 18 \*- sororia Schltr. X, 294 subrotundifolia Cogn. VI, 60 subumbellata Cogn. VI, 58
Türckheimii Schltr. X, 292 \*— verruculosa Kränzl. I, 177 \*- Wercklei Schltr. IX, 213

(— parviflora J. J. Sm.) IX, 493 (— parviflora Ridl.) IX, 493 \*Plukenetia Buchtienii Pax. VII, 110 Plumbago amplexicaulis Oliv. var. madagascariensis Pamp. VIII, 351

— scandens L. IX, 357

\*Plocoglottis lobulata Schltr. X, 70

\*- micrantha Fedde IX, 493

(— zeylanica L.) VIII, 351

Plumiera Inaguensis N. L. Britton V, 182

\*Poa acrochaeta Hack. X, 172 — alpina L. var. pseudojubulata Rohl.

\*— androgyna Hack. VI, 159

 annua L. c. caespitosa Terracc. V, 142 – var. flavescens DC. et Sarnth. III, 140

 astoni D. Petrie III, 335 \*- ayseniensis Hack. X, 173

 Bolanderi var. Chandleri (Davy) Pip. VI, 74

- caesia Sm. subsp. \*Briquetii Hack. II. 71

- caespitosa Forst, var, flexuosa F. M. Reader VII, 387

- Canbyi (Scribn.) Pip. VI, 74 (— cynosoroides Retz) VIII, 300 — Cyrenaica Dur. et Barr. IX, 474

- evagans Simm. VIII, 78

(- exigua Fouc. et Mand., non Hook. f.) III, 121

- Foucaudii Hack. III, 121

glauca Vahl var. tenuior Simm. VIII, 78

Grisebachii R. E. Fries IV, 91
Hackelii F. M. Reader VII, 388

heterogama Hack. V, 30holciformis Gris.) IV, 91

Howellii var. Chandleri Davy) VI, 74

(— humilis Ehrh.) III, 83 (— humilis Fr.) III, 83

×Poa intricata (P. nemoralis × palustris)

K. Wein IX, 378

— irrigata C. A. M. Lindm. III, 82

— — f. aucta Lindm. III, 83 — — f. brevior Lindm. III, 83 — — f. Ehrharti Lindm. III, 83

— — f. praetexta Lindm. III, 83 — f. rigens (Hn.) Lindm. III, 83 — Kurtzii R. E. Fr. IV, 92

laetevirens R. E. Fr. IV, 91
myriantha Hack. IV, 345
oraria D. Petrie IX, 408

\*— pilcomayensis Hack. VI, 346 (- pratensis f. costata Aschers. et Graebn.) III, 83

— — var. praesignis Dom. I, 130

(- rigens Hn.) III, 83 \*— scabriflora Hack. III, 244 \*— trachyantha Hack. X, 173

- violacea Bell. var. viridi - aurea Dalla Torre et Sarnth. III, 141 \*Podocarpus utilior Pilger I, 189

Podochilus anceps (Bl.) Schltr. X, 37 \*— australiense (Bailey) Schltr. III, 316 \*— bicaudatum Schltr. III, 19

- buxifolius Schltr. var. \*striatus Schltr. X, 38

\*— calliferus (J. J. Sm.) Schltr. X, 37 \*— celebicus Schltr. X, 36

\*— Cumingii Schltr. III, 19

\*— curviunguis Schltr. X, 34 \*— cyclopetalus Schltr. X, 36 \*— Minahassae Schltr. X, 34

- reflexus (Bl.) Schltr. var. \*cycloglossus Schltr. X, 37

\*— schistanthera Schltr. X, 35 \*- trilobus Schltr. X, 35

(- Zollingeri Schltr., non Miq.) III, 19 Podolepis Kendalli F. v. M. var. nanus A. J. Ew. VIII, 408

- Spenceri A. J. Ew. VIII, 408 \*— trachysepala Kränzl. I, 178

Pogonia Cogn. et Chod. et Hassl. V, 312

\*- lutea Schltr. IX, 24 (— purpurea Hayata) X, 6 (— taitoensis Hay.) X, 6

\*Pogostemon ianthinus (Kanitz) Lévl.

IX, 219 \*Poiretia longipes Harms IX, 439, 440 Polakowskia Pitt. nov. gen. VIII, 538

- Tacaco Pitt. VIII, 538 Polianthes elongata Rose V, 253 \*Pollia Dielsii Lévl. VIII, 285 Polyadoa (?) Simii Stapf V, 354 Polycarpaea candida Webb et Berth.

var. \( \beta \) diffusa Pit. IX, 209

— — var.  $\delta$  pygmaea Pit. IX, 209 — var. γ robusta Pit. IX, 209

— var. α Webbiana Pit. IX, 209

(— multiflora Pit.) IX, 209

Polycarpaea Teneriffae Lam. var.  $\delta$ crassifolia Pit. IX, 209

— — var.  $\beta$  intermedia O. Ktze. subvar. genuina Pitard IX, 209

 – var. γ laxiflora Pit. IX, 209 (Polyclados abietinus Phil.) III, 295 Polycnemum perenne Litw. IX, 561 (Polygala amara L. subvar. brachyptera

Chod.) VI, 340

 arenicola Small III, 268 - Carteri Small III, 267

(— collina subvar. ciliolata Borb.) IX, 382

 comosa Schk. f. flaviflora Rohl. I, 34 (- var. Moriana Borb.) IX, 383

 $--\beta$  pedemontanum (Chod.) v. Hay. IX, 382

corallicola Sınalı III, 267 \*— Dunniana Lévl. IX, 326 flagellaris Small III, 268

- flavescens DC. var. maremmana Fiori VII, 390

(— grandiflora var. leptophylla Chod.) III, 267

- hybrida DC. f. albiflora B. Koso-Poljansky X, 319

(- Moriana Britt.) IX, 383 multiflora Mattei IX, 346

- oxypterum Reichb. var. majus Lamb. VIII, 323

 persicariaefolia DC. γ granulata (Hochst.) Chod. f. macrophylla Lanza IX, 412

- subamara K. Fritsch VI, 340

 vulgare L. γ ciliolatum (Borb.) Hay. IX, 382

— — subsp. comosum Schk. var.  $\beta$ novum E. Steig. IV, 68

 $(---\delta)$  pedemontana Chod.) IX,

Polygonatum Cavaleriei Lévl. III, 370

\*- crypthantum Lévl. et Vant. V, 282 \*- ericoideum Lévl. VII, 384 \*- Esquirolii Lévl. VIII, 59

\*- Fauriei Lévl. et Vant. V, 282

 Huanum Lévl. III, 369 \*— Mairei Lévl. VII, 384

\*- marmoratum Lévl. VII, 384

- multiflorum var. foliosum Geisenh. IX, 540

— odoratum (Müller) Druce X, 290

- officinale All. X, 290

 polyanthemum (M. B.) Link f. cochleatum Woron. IX, 144

\*- Taqueti Lévl. et Vant. V, 282 - verticillatum All. b. microphyllum

Bolz. IX, 406 Polygonum acuminatum H. B. K. var.

stenophyllum Heim. VI, 86

\*- amboanum Fedde IX, 493

Polygonum bistorta L. var. ramosum Zob. VIII, 349

\*- Bondtii Lévl. VIII, 258 Bornmülleri Litw. IX, 561

\*— Cavaleriei Lévl. VIII, 172 — confertiflorum Nutt. VI, 168

— Convolvulus L. var. heterophyllum Mer. VIII, 288

\*— Damrongiana Hoss. X, 62 \*- Duclouxii Lévl. et Vant. VI, 112

\*- Esquirolii Lévl. VIII, 171 - glanduliferum Nakai IX, 238

- induratum Aschers, et Barb, IX, 472 (- japonicum Franch, et Sav.) IX, 192

 japonicum Meissn. var. conspicuum Nak. IX, 192

– war. densiflorum Nak. IX, 192

\*— Komarovii Lévl. VIII, 171 — Mairei Lévl. VII, 338 \*— Marretii Léyl. VIII, 171

 modestum Heim. VI, 84 (— molliaeforme Boiss.) IX, 562 paradoxum Lévl. VII, 339

- polycnemoides Jaub. et Spach var. sanguineum Litw. IX, 561

Posumbu Ham, var. \*pseudo-bar-batum Lévl. VIII, 258

- sagittatum L. var. Hallaisanense Lévl. VIII, 171

– var. sericeum Nak. IX, 238

(— Schinzii C.H. Wright, non J. Schuster) IX, 493

\*- statice Lévl. VII, 338

\*— Taquetii Lévl. VIII, 258

— Thunbergii Sieb. et Zucc. var. \*coreana Lévl. Vill, 171

— viviparum L. b. nanum Bolz. IX, 187

(— Watsoni Small) VI, 168 \*- yunnanense Lévl. VI, 112

\*- zigzag Lévl. et Vant. VI, 112 Polyplethia hexamera v. Tiegh. VII, 270

\*Polypodium Balliviani Rosenst. IX, 344 \*— Bamlerianum Rosenst. VIII, 163

\*— bolivianum Rostenst. V, 236 \*— Bonapartii Rosenst. VII, 309 \*— Bradeorum Rosenst. X, 279

\*- Buchtienii Christ et Rosenst. V, 237

(- connexum Kaulf.) IX, 140 \*- coraiense Christ V, 285

\*- Cromwellii Rosenst. \*— Damunense Rosenst. V, 42

(— Dryopteris L.) VI, 185

(— — α glabrum Neilr.) VI, 186

\*— geluense Rosenst. V, 374 (— Heleopteris Borckh.) VI, 184

\* Herzogii Rosenst. VI, 176

\*— hispido—setosum Rosenst. X, 162 \*- holosericeum Rosenst. V, 375

- lineare Thunbg. var. \*coraiense Christ V, 10, 285

(— lonchitis Bory) VIII, 137

Polypodium loriceum L. var. \*obscura Rosenst. VII, 308

- - var. \*squamuligera Rosenst. VII, 308

 montevidense f. genuina (Hieron.) Hick. IX, 141

— f. imbricata (Hieron.) Hick. IX, 141

— — f. squamula (Hieron.) Hick. IX, 141

BI. var. \*trichocarpa nutans Rosenst. X, 339

 obliquatum Bl. var.\*novoguineensis Rosenst. V, 374

\*- ornatissimum Rosenst. V, 41

- Phymatodes L. var. \*iiniserialis Rosenst. X, 340

\*— plectolepidioides Rosenst. X, 278

\*— pleurogrammoides Rosenst. V, 42

— Preslianum Spr. var. \*immersa

Rosenst. VI, 314 pseudonutans Christ et Rosenst. V, 15

(- pulchellum Salisb.) VI, 185

- rupestre Bl. var. \*leucolepis Rosenst. V, 43

– war. taeniopsis Christ V, 371 \*- setulosum Rosenst. X, 277

\*- sibomense Rosenst. X, 340 \*- Sodiroi Christ et Rosenst. V, 14

 Sprucei Hook. var. \*costaricense Christ VIII, 17

- subandinum Sod. var. \*biserialis Rosenst. VII, 308

\*- subfasciatum Rosenst. V, 41

\*- subflabelliforme Rosenst. VII, 306 - var. \*minor Rosenst. VII, 307

- subgeminatum Christ var. \*ovata Rosenst. X, 340 tenuisectum Bl. var. \*paucisetosa

Rosenst. V, 42

\*- trichiatum Rosenst. VII, 148 \*- truncatulum Rosenst. IX, 343

\*- Tunguraguae Rosenst. VII, 307 \*— vitariiforme Rosenst. V, 235

\*- Werneri Rosenst. V, 43 \*- yungense Rosenst. V, 236

(Polypogon australis Brongn.) IV, 310 (— crinitus Trin.) IV, 310

- interruptus H. B. K. var. crinitus (Trin.) Hack. IV, 310

(— litoralis (With.) Sm.) IV, 310
 — monspeliensis (L.) Desf. f. argentinus Hack. IV, 278

(Polyscias amplifolia (Bak.) Harms) VI,

 Zippeliana (Miq.) Th. Val. V, 388 \*Polystachya altilamellata Schltr. X, 385

 Lujae De Wild. III, 163 – uniflora De Wild. III, 164

Polystichum aculeatum Sw. var. coraiense Christ V, 11

Polystichum aculeatum var. \*eurylobum Rosenst. VIII, 164

(- andinum Phil.) VII, 170

\*- Bamlerianum Rosenst. X, 330 - - var. ferrugineo-opaleacea Rosenst. X, 331

\*— Bonāpartii Rosenst. VII, 297

×— illyricum (Borb.) (P. lobatum) × Lonchitis (Murb.) Hayek) Hay. VI, 186 \*- Keysserianum Rosenst. X, 331

\*— lastreoides Rosenst. IX, 425

- mohrioides (Bory) Presl 1. f. genuina Hick. VII, 170

— — 2. f. latifolia Hick. VII, 170

— multifidum (Mett.) Moore var. Autrani Hick. VII, 170

(- platyphyllum (Willd.) Presl f. genuina Rosenst.) IX, 141

 – var. Klotzschii Rosenst. IX, 141 – var. Kurtziana Hick. VII, 169 \*- tenggerense Rosenst. VIII, 164

Polythecanthum nov. gen. v. Tiegh. VI,

- cambodianum (Pierremsc.) v. Tiegh. VI, 14

- cochinchinense v. Tiegh. VI, 14

- Lefévrei v. Tiegh. VI, 14 - Thoreli v. Tiegh. VI, 14

Polythecium latifolium (Pierre msc.) v. Tiegh. VI, 13

Pierrei van Tiegh. VI, 14pruinosum van Tiegh. VI, 13

Pomaderris phylicifolia Lodd. var. ericoïdes Maid. et Betch. V, 55

Pongelion grande (Prain) van Tiegh. VI, 192

- Vilmorianum van Tiegh. VI, 191 – Wightii van Tiegh. VI, 191 \*Ponthieva Harrisii Cogn. VI, 304

\*— triloba Schltr. IX, 25 \*- Türkheimii Schltr. III, 47

\*— elegans (Kränzl.) Schltr. X, 447 \*— parvula Schltr. X, 394

Popowia Malchairi De Wild. X, 526 Populus alba Dode III, 200

(-- var. pyramidalis Bge.) IV, 9

 Ariana Dode III, 157 - Bachofenii Wierzb. f. pyramidalis

Litw. IV, 9 (- balsamifera Michx. f.) III, 355 - Besseyana Dode III, 205 - Bethmontiana Dode III, 261

- bisattenuata Dode III, 260 Bogueana Dode III, 200 (- Bolleana Lauche) IV, 9

– Bonatii Lévl. VIII, 445 Bonnetiana Dode III, 157
Carreiriana Dode III, 259

- Clarkiana Holl. IV, 100 Coloradensis Dode III, 354 Comesiana Dode III, 158

- Davidiana Dode III, 204

Populus Duclouxiana Dode III, 204

Elaverensis Dode III, 260

elongata (Dippel) Dode III, 355
Epirotica Dode III, 160

× Eugenei (P.euxylon × pyramidalis) Dode III, 233

- Europaea Dode III, 261 - euxylon Dode III, 206 flexibilis Dode III, 258

(- flexibilis Rozier) III, 259 floccosa Dode III, 199
Freynii Dode III, 203
Gallica Dode III, 260

 Gamblei Dode III, 356 glabrata Dode III, 201

glaucicomans Dode III, 158

globosa Dode III, 201
hastata Dode III, 356 Henryana Dode III, 205 - Hervierana Dode III, 201 - Hickeliana Dode III, 158

 Hobartiana Dode III, 201 hypomelaena Dode III, 261 - illicitana Dode X, 272

- incrassata Dode III, 205

Jacquemontiana Dode III, 356

?x— Irishiana (P. serotina L.?) Dode III, 232

 Kanjilaliana Dode III, 355 ?x— Krauseana Dode III, 233

?x— laticoma (P. Virginiana × Carolinensis) Dode III, 232 — lepida Dode III, 202

- Litwinowiana Dode III, 158

 macranthela Lévl. et Vant. VIII, 446 (— Marylandica Bosc. III, 206

 Mauritanica Dode III, 157 megaleuce Dode III, 200
Michauxi Dode III, 355 Morisetiana Dode III, 160
Mulleriana Dode III, 259

 Munsoniana Dode III, 204 (— nivea Willd.) III, 159 — nivea Dode III, 159

 octorabdos Dode III, 354 — Paletskyana Dode III, 159 palmata Dode III, 160

parvidentata Dode III, 203
pellostachya Dode III, 204 - Peronaeana Dode III, 160

 pseudograndidentata Dode III, 203 pseudo-tremuloides Holl. IV, 101

?x— ramulosa Dode III, 233

×— robusta (P. angulata ×? Plantierensis) Dode III, 233

- Sargentii Dode III, 205

Schroederiana Dode III, 353

 Scythica Dode III, 260 — sinuata Dode III, 202 sylvicola Dode III, 202 Thevestina Dode III, 261 - Thracia Dode III, 261

Populus Trabutiana Dode III, 159 tremula (L.) Dode III, 203

- Treyviana Dode III, 159

nigra) Dode III, 232

- triloba Dode III, 159

- Tschoudiana Dode III, 259

 $\times$ — utilis (P. euxylon  $\times$  serotina) Dode III, 233

 Vaillantiana Dode III, 259 valida Dode III, 200

×— vegeta (P. Virginiana × serotina) Dode III, 232

 villosa (Lang) Dode III, 202 - Vistulensis Dode III, 260

Wolfiana Dode III, 354

- Woobsti (Schröder) Dode III, 354

- wutaica Mayr VIII, 92 - Yunnanensis Dode III, 356

\*Porana Esquirolii Lévl. IX, 444

Porphyrostachys pilifera (H. B. & Kth.) Rchb. f. X, 481

Portulaca bicolor F. v. M. var. rosea Maid. IV, 281

- perennis R. E. Fr. IV, 34 rotundifolia R. E. Fr. IV, 34 \*— Vilmoriana Lévl. VIII, 259

(Potamogeton alpinus Balb. var. obscurus II. virescens Casp.) VIII, 147

(— — var. d. virescens Asch. et Graeb.) VIII, 147

X— argutulus (P. gramineus X nodo-sus) Hagstr. VIII, 147

×— — series gramineifolia Hagstr. VIII, 147

×- — series gramineifolia Hagstr. f. puyensis Hagstr. VIII, 147

× - - series nodosifolia Hagstr. VIII,

asiaticus Bennett III, 88

californicus (Morong) Pip. VI, 73
carinatus K. R. Kupff. VI, 121

 crispus f. brevifolius Th. Schube VII, 144

— cuprifolius Lowe IV, 44 — dentatus Hagstr. VIII, 146

 filiformisPers.var.elongatusBaagöe III, 137

– var. linipes Hagst. ll, 111
– var. Tibetanus Hagstr. ll, 110

(- fluitans Holl., non Roth) IV, 44 - gramineus L. var. machicanus Menezes IV, 44

— linguatus Hagstr. I, 113

— lucens L. var. longipes Rohl. 1, 23 - - subsp. vaginans Bojer III, 87

– var. ventanicola C. M. Hick.VIII, 256

(- machicanus Lowe) IV, 44

×— Macvicarii (P. praelongus × polygonifolius) A. Bennett VII, 233

(- natans Holl. et Buch) IV, 44

Potamogeton numasakianus Bennett | 111, 89

 orientalis Hagstr. VIII, 146 — parmatus Hagstr. VIII, 145

(- pauciflorus var. californicus Morong) VI, 73

pectinatus L. var. coronatus Hagstr.

11, 110

 perfoliatus L. var. mandschuriensis Bennett III, 88

— var. \*sachalinensis Lévl. VIII, 285, X, 441

(- polygonifolius Coss.) IV, 44

×— prussicus (P. alpinus × perfoliatus) Hagstr. VIII, 147

×- - series ! abbreviata Hagstr. VIII, 147

×— — f. darkehmensis Hagstr. VIII, 147

×— — series II alpinifolia Hagstr. VIII, 147

 $\times -$  - f. pelplinensis Hagstr. VIII, 147

pusillus L. var. longepedunculatus C. M. Hick. VIII, 256

\*— sachalinensis Lévl. X, 441 - stylatus Hagstr. VIII, 145

ziziiformis Hagstr. VIII, 146

\*Potentilla aegopodiifolia Lévl. VII, 198 – apennina Ten. subsp. kionaea Maire et Petitm. VI, 2

 aurea L. var. Piperorum Rohl. 1, 26 \*x - Bayeri Domin (P. Opizii Dom. x

verna (L.) Bayer) V, 65 (- Benitzkyi Friv.) VII, 179

- concolor (Franch.) Rolfe VII, 173

(- corsica Sol.) VII, 180 \* - Fauriei Lévl. VII, 198

( - fissa var. major T. et G.) VII, 215 fruticosa L. var. \*Vilmoriniana Kom. VII, 146

(- glutinosa Nutt.) VII, 215

Griffithii var. concolor Franch.) VII,

\*— intermedia L. var. ternata Thell. V, 365

(- kionaea Hal.) VI, 2

(- Laresciae R. Keller II, 149 \* - longepetiolata Lévl. VII, 199 - Lozani Rose et Paint. V, 155

(— malacophylla Borb.) VII, 180 (- var. mollis Asch. et Gräbn.) VII, 180

(— Mandoni Fouc.) Ill, 124 - moesiaca B. Davidoff I, 125

(— mollis Panč.) VII, 180

 procumbens Sibth, var. Mandoni (Fouc.) Briq. III, 124

(— pygmaea Jord.) VII, 180 (— Roemeri Friv.) VII, 179 \*— rosulifera Lévl. VII, 198

 rubricaulis Lehm. var. arctica Simm. VIII, 75

(Potentilla rupestris L. var. banatica Th. W.) VII, 179

- var. 3. Benitzkyi (Friv.) Tuzs. VII, 179

- — — subvar. 1. grandiflora (Th. W.) Tuzs. VII, 179

- - - f. 3. asperula (Th. W.) Tuzs. VII, 179

— — — f. 1. banatica (Th. W.) Tuzs. VII. 179

-- - - f. 2. rumelica Tuzs. VII, 179 — — — subvar. 2. mollis (Panč.) Tuzs. VII, 180

(— — var. grandiflora Heuff.) VII, 179 – var. 6. minor (Boiss.) Tuzs. VII, 180

— — f. 1. Boissieri Tuzs. VII, 180 – f. 2. pygmaea (Duby) Tuzs. VII, 180

 — var. 5. orientalis (Keller et Siegfr.) Tuzs. VII, 180

(- - f. orientalis Keller et Siegfr.) VII,

(- - var. pygmaea Duby) VII, 180 – var. 4. strigosa Th. W. VII, 180 — — var. 2. villosa (Lec. et Lam.)

Tuzs. VII, 179

— — f. 2. pyrenaica Tuzs. VII, 179 — — f. 1. suecica Tuzs. VII, 179

- stellulata Davidoff 1, 125

- Tormentilla Neck. var. \*insignis

Dom. V, 66 (- valida Greene) VII, 215

 verna L. f. subternata Simm. VIII. 182

Poterium cinctum Loj. Poj. V, 28 (- dictyocarpum Lojac.) V, 28

(- macrocarpum Loj.) V, 28 (- pumilum Tod.) V, 28

- verrucosum Ehrenbg, var. Teneriffae Pit. 1X, 275

\*Pothos Brownii Dom. X, 58

Pourthiaea arguta var. latifolia Hook. III, 154

(— lucida Decne.) III, 154 - parvifolia Pritz.) III, 155 (- salicifolia Decne.) III, 155

(- villosa Decne.) III, 154 Pouteria splendens (DC.) Macl. IV, 134 (Pozoa hydrocotylifolia Fielding

Gardn.) IV, 137 \*Premna Bodinieri Lévl. X, 440 \*— Cavaleriei Lévl. X, 339

\*— Martini Lévl. X, 440

Primula acaulis (L.) Hill δ caulescens Koch b. parviflora Bolz. VIII, 255

(— amoena auct. div.) IV, 159, 160  $(--\beta)$  flava Rupr.) IV, 159

(— — var. genuina Pax) IV, 159, 160 — — var. grandiflora Kusn. IV, 161

— — var. hypoleuca (Rupr. et Trautv.) Kusn. IV, 161

152 Primula acaulis var. intermedia Kusn. IV, 160 - var. Kasbek Kusn. IV, 160 (- - var. Meyeri Boiss.) IV, 161 - - var. sublobata Kusn. IV, 160 begoniiformis Petitm. IX, 239 \*- Bonatii Knuth VIII, 398 — cognata J. F. Duthie IV, 370 - darialica (Rupr.) Kusnez. var. farinifolia (Rupr.) Kusn. IV, 162 — — f. chewsurica Kusn. IV, 162 — — var. typica Kusn. IV, 161 - deflexa J. F. Duthie IV, 368 delicata Petitm. V, 252
denticulata Smith) II, 115 Dielsii Petitm. IV, 127 - Duclouxii Petitm. V, 252 (— elatior var. amoena auct. div. IV, 159, 160  $(--\times \text{amoena Pax})$  IV, 160 - - var. amoena Herder f. flaviflora Trautv. IV, 159 (— — var. dubia Rgl.) IV, 160 — — var. Lingelsheimii Pax VIII, 93 - Esquirolii Petitm. IX, 240 farinifolia Rupr. IV, 162 (— farinifolia Boiss. p. p.) IV, 162
— Hemsleyi Petitm. IX, 240 Inavatii Duthie var. \*aureo-farinosa Pax II, 116 (- involucrata Wall.) II, 115 — Juliae Kusn. II, 134; IV, 161 — Lecomtei Petitm. IV, 96 \*- Meeboldii Pax II, 116 (— Meyeri var. hypoleuca Rupr.) IV, – var. typica Regel) IV, 161 (— minutissima Jacq. var. genuina Pax) II, 116 (- Mnischeikii Bayern) IV, 160 (— nivalis Pall. var. macrophylla [Don] Pax) II, 116 - orbicularis W. B. Hemsl. IV, 369 - ossetica Kusn. IV, 162 - penduliflora (Franch. niss.) Petitm. IX, 543 — polyphylla (Franch.) Petitin. IX, 544 - pseudoelatior Kusn, IV, 159 — pulverulenta Duthie IV, 174 - rosea Royle) II, 115 - Ruprechtii Kusn.) IV, 159 - Schlagintweitiana Pax) II, 115 (- sibirica Jacq.var. brevicalyx Trautv.) II, 115 - speluncicola Petitm. V, 252 — tangutica Duthie IV, 170 Veitchiana Petitm. IV, 64
 Priva tuberosa Wats. IX, 366 \*Prockia grandiflora Herz. VII, 62 Procris frutescens Bl. var. novo-gui-neensis Th. Val. V, 379 (Prosartes Menziesii D. Don) VI, 78

Proserpinaca platycarpa Small III, 271

\*Prosopis rubriflora Hassl. VIII, 552 Prostanthera granitica Maid. et Betch. V, 85 Protea chionantha Bol. VII, 156 Protorhus Perrieri L. Courch. VI, 127 \*Prunus anadenia Koehne IX, 34 \*— bokhariensis C. K. Schneid I, 51 \*— bracteopadus Koehne IX, 33 — canescens D. Bois III, 226, Abb. 227, Abb. 228 cerasoides Don var. tibetica (Batal.) C. K. Schn. I, 54 \*— clarofolia C. K. Schn. I, 67 \*— consociiflora C. K. Schn. I, 54 \*- diamantinus Lévl. VII, 198 \*— diversifolia Koehne IX, 37 — domestica L. B lucana Terracc. V, \* Dunniana Lévl. X, 377 \*— Fauriei Lévl. VII, 198 \*— Giraldiana C. K. Schn. I, 65 \*— glaucifolia (Wall.) Koehne IX, 35 \*- Hosseusii Diels IV, 289 \*— ichangana C. K. Schn. I, 50 — japonica Thunb. var. \*Engleri Köhne VIII, 23 \*- - var. \*packangensis C. K. Schn. I, 53 – var. \*Thunbergii Köhne VIII, 23 \*— litigiosa C. K. Schn. I, 65 Mahaleb L. var. Hartmannii Koehne X, 164 \*- Nakaii Lévl. VII, 199 — Padus L.var. pubescens Regel IX, 36 \*- paracerasus Koehne VII, 133 (— parviflora Loj. var. Tinei Loj.)V, 28 - pennsylvanica L. fil. var. saximontana Rehd. VIII, 345 (- Pseudocerasus Sarg.) VIII, 344 - Rosebudii A. B. Reagan III, 240 \*— rufoides C. K. Schn. var. \*glabrifolia C. K. Schn. I, 56 - spinosa L. subsp. inermis S. G. Blomqv. IX, 144 \*— Sweginzowii Koehne VIII, 62 \*— szechuanica Bat. var. \*Dielsiana C. K. Schn. I, 68 \*— Taqueti Lévl. et Vant. VII, 197 (- Taquetii Lévl.) X, 431 \*— tatsienensis Batal. var. \*pilosiuscula C. K. Schn. I, 66 — Tinei Loj. Poj. V, 28 \*— tomentosa Thbg. var. \*Batalini C. K. Schn. I, 52 turbinata Loj. Poj. V, 28 - yedoënsis var. \*nudiflora Koeline X, 507 \*— yunnanensis Franch. var. \*Henryi C. K. Schn. I, 66 - Sargentii A. Rehd. VIII, 344

\*- seoulensis Lévl. VII, 198

Prunus serotina Ehrh. f. 2. albo-variegatav. Schwer. VI, 335 - f. 4. phelloïdes v. Schwer. VI, pyramidalis Zabel) VI, 335 - serrulata Lindl. f. \*Veitchiana Koehne IX, 122 Pseudabutilon R. E. Fr. IX, 475 subg. Abutilastrum (E. G. Bak.) R. E. Fr. 1X, 478 - callimorphum (Hochr.) R. E. Fr. IX, 479 - var. Friesii (Hassl.) R. E. Fr. IX, 479 — var. \*intermedium Hassl. VII, 74 - longepilosum R. E. Fr. IX, 480 - Lozani (Rose) R. E. Fr. IX, 477 - paniculatum (Rose) R. E. Fr. IX, 478 Pringlei (Rose) R. E. Fr. IX, 476
Rosei R. E. Fr. IX, 477
scabrum (Presl) R. E. Fr. IX, 478 - spicatum (H. B. K.) R. E. Fr. IX, 476 – Stuckertii R. E. Fr. IX, 481 Pseuderanthemum seticalyx Clarke) Stapf VIII, 335 Pseudibatia australis Malme II, 108 - (?) Stuckertii Malme II, 109 \*Pseudima pallidum Radlk. IX, 379

Pseudobalsamia nov. gen. Ed. Fischer VII, 194

- Setchelli Ed. Fischer VII, 194 \*Pseudobotrys Moes. nov. gen. X, 310 \*- Dorae Moes. X, 310

Pseudocarpidium nov. gen. Millsp. VII, 285

- avicennioides (Rich.) Millsp.VII, 285 - ilicifolium (Rich.) Millsp. VII, 285 - Wrightii Millsp. VII, 285

\*Pseudocydonia C. K. Schn. gen. nov. III, 180

\*- sinensis (Poir.) C. K. Schn. III, 181 (Pseudoeugenia perakensis Scortech.) IV, 235

(- singaporensis King) IV, 234

(Pseudogenea californica E. Fischer) VII, 193

\*Pseudopavonia nov. gen. Hassl. VII, 74 \*— tenax Hassl. VII, 74, 382

Pseudoxalis nov. gen. Rose VI, 262

— madrensis (S. Wats.) Rose VI, 262 Pseudotsuga Douglasii f. laeta Schwerin VIII, 342

Psilotum triquetrum Sw. var. \*fallacinum Dom. IX, 551

Psoralea biovulata Bolus IV, 195 - bituminosa L. var. anomala C.

Bertr. VIII, 445 lanceolata var. scabra (Nutt.) Pip.

VII, 218

(— Mutisii Kunth) II, 4 - palustris B. F. Bush IV, 214 (Psoralea Purshii Vail.) VII, 218 (- scabra Nutt.) VII, 218

- subulata B. F. Bush IV, 213 \*Psychotria angustissima Rech. VI, 327

\*- atroviridescens Rech. VI, 326 — bacteriophila Val. IX, 312

 Bahamensis Millsp. V, 184 \*- elegantula Rech. VII, 168 \*- Esquirolii Lévl. X, 435

— ligustrifolia (Northr.) Millsp. VII, 283 \*- loniceroides Rech. VI, 328 - montana Bl. var. leiopyrena Val.

IX, 313

\*— Prainii Lévl. IX, 324 \* Savaiiensis Rech. VI, 327 \*- tristis H. Winkl. VII, 249

Psyllium arborescens Poir. var. a genuina Pit. IX, 381

- – var.  $\beta$  Palmensis Pit. IX, 382 \*Pterichis boliviana Schltr. IX, 436

\*— silvestris Schltr. X, 446 Pteris aquilina L. var. Gintlii Rohl. I, 24

\*— Buchtienii Rosenst. VI, 309 — cheilanthoides Hayata VI, 199 deltoidea Copel. X, 343

\*- Finisterrae Rosenst. V, 37 \*- glabella Rosenst. IX, 423, X, 343

\*— gracillima Rosenst. IX, 424 — grandifolia L. var. \*Campanae grandifolia

Rosenst. VII, 291 \*- litoralis Rech. V, 130

semipinnata L. var. \*Fauriei Christ

splendens Klf. var. \*pumila Rosenst. VIII, 277

\*- Sprucei Rosenst. VII, 292 \*- subundulata Rosenst. IX, 73

(— Warburgii Christ) V, 376 Pterocactus decipiens Gürke VI, 89

Pterocaulon paniculatum Arech. IX, 415

\*— pilcomayense Malme VIII, 73 \*Pterolepis boliviensis Cogn. VIII, 1 (Pteronia carnosa Muschl.) IX, 384 \*- Feddeana Muschl. IX, 384

Pterospermum Lamarckianum Hochr. V, 349

- macrocarpum Hochr. V, 348 (- suberifolium Lam.) V, 349

Pterostylis reflexa R. Br. var. intermedia A. J. Ewart VIII, 408

(Ptiloneilema plumosum Steud.) V, 70 (Ptilotus Helmsii F. v. M. and Tate) 1X, 135

(Ptyssiglottis Hallierii Val.) 1X, 305

— maxima Val. IX, 304 - var. maculata Val. IX, 304

\*Pulmonaria intermedia (P. mollissima A. Kern × P. obscura Dum.) Palla 1X, 333

× norica (P. Kerneri Wettst. × officinalis L.) Teyber VIII, 93; IX, 190

Pulsatilla patens f. glabrescens H. Preuss VII, 106 Pultenaea cinerascens Maid. et Betche - Gunnii Benth, var. flava A. I. Ewart VIII. 492 - Luehmanni Maid. VII, 212 - stricta Sims. var. incurvata A. J. Ewart VIII, 410

— Vrolandi Maid. VII, 210

— Williamsoni Maid. VII, 211 \*Puya fastuosa Mez III, 12 \*- Fiebrigii Mez III, 9 \*— glaucovirens Mez III, 9 \*- grandidens Mez III, 10 \*- Hofstenii Mez III, 8 \*- laccata Mez III, 11 \*- longistyla Mez Ill, 12 \*— macrura Mez III, 13 \*— micrantha Mez III, 18 \*— mitis Mez III, 10 \*— paupera Mez. III, 14 \*— strobilantha Mez III, 13 Pycnostachys Dawei N. E. Br. VI, 318 Pycreus Eragrostis (Vahl) Palla X, 401 (- sanguinolentus Nees) X, 401 Pyracantha angustifolia (Franch.) C. K. Schn. Ill, 222 Pyrenacantha Menyharthii Schinz VI, 166 (Pyrethrum ambiguum Ledeb.) IX, 510 (— aragonense var. spathulifolium Pau) VII, 350 - arundanum Boiss. [?]) VII, 350 (– Bocconi W.) VII, 350 (— cuartenense Deb. et Rev.) VII, 350 — cuneatum Pau) VII, 351  $(--\vartheta \text{ cuneatum Pau}) \text{ VII, } 351$ (- flaveolum H. et Lk.) VII, 350 (— hispanicum b. laciniatum γ sulphureum Willk.) VII, 350  $(---\beta)$  versicolor Willk.) VII, 350 (— — d pinnatifidum α pulverulentum Willk.) VII, 349 (-- a pulverulentum  $\beta$  radicans Willk.) VII, 350 (— inodorum  $\beta$  nanum Hook. et Arn.) IX, 510 (— — var. pumilum Rae) IX, 510 (- leucanthemifolium Porta et Rigo) VII, 350 Lilae Bordzilowski IX, 132 (- Pallasianum Max.) V, 276 (— pallidum (Mill.) Pau) VII, 349 — γ aragonense (Asso) Pau f. III. alpinum (B. et R.) Pau VII, 350 — — f. II, leucoglossum Pau VII, 350 — — f. I xanthoglossum Pau VII, 350 — ζ arundanum (Boiss.) Pau VII, 350

Pyrethrum pallidum  $\eta$  Assoi Pau VII, — — f. I. leucoglossum Pau VII, 349  $--\delta$  radicans (Cav.) Pau VII, 350 — — f. I. genuinum Pau VII. 350 — — f. Il. xanthoglossum Pau VII, 350 — ε spathulifolium (Gay) Pau VII, 350  $--\beta$  virescens Pau VII, 350 — — f. I. leucoglossum Pau VII, 350 - - f. ll. xanthoglossum Pau VII, 350 — — f. Il. xanthoglossum Pau VII, 349 (— pulverulentum Lag.) VII, 349 (- - var. virescens Pau) VII, 350 (- radicans Cav.) VII, 350 (— spathulifolium Gay) VII, 350 (— sulphureum Willk.) VII, 350  $(--B. \text{ et R. } \beta \text{ alpinum B. R.}) \text{ VII.}$ (Pyrrocoma carthamoides Hook.)VIII,270 Qualea Wittrockii Malme II, 187 Quamasia Suksdorfii (Greenm.) Piper VI, 77 \*Quekettia australis Kränzl. Il, 57 - micromera Cogn. var. β major Cogn. I, 112 Theresiae Cogn. var. β angustifolia Cogn. I, 112 (Quercus appennina Tineo) VIII, 252 - brachyclada O. v. Seem. III, 174 \*— cathayana O. v. Seem. III, 53 - coccifera var. corcyrensis Spreng. VIII, 343 — — var. microphylla Spreng. VIII, 343 — var. umbrellifera Spreng. VIII, 343 glennii Hollick IV, 101
Hallierii O. v. Seem. III, 175 — llex var. fagifolia Spreng. VIII, 343 lanuginosa × sessiliflora (Qu. Streimii Heuff.) Simk. b. Tiszae (Simk. et Fek.) Hayek VI, 243
\*— Merrillii O. v. Seem. V, 21
— Nieuwenhuisii O. v. Seem. III, 174 pseudo-alba Holl. IV, 102 — Rolfsii Small III, 264 rufa O. v. Seem. III, 173 succulenta Small III, 265 (- Tiszae Simk. et Fek.) VI, 243 Treubiana P. v. Seem. III, 173 vulcanica Boiss. et Heldr. γ nebrodensis Borzi VIII, 252 — β pinnatifolia Borzi VIII, 252

— α typica Borzi VIII, 252

- Wilhelminae O. v. Seem. III, 175

(- wataishanica Mayr) VIII, 92

\*— Wilsonii O. v. Seem. Ill, 53

Quiina silvatica Pulle X, 408 (Quinaria lansium Lour.) VIII, 489

## R.

Raddia concinna (Hook, f.) A. Chase IX, 39

— distichophylla (Schwad.) Ch. IX, 38

- nana (Doell.) Ch. IX, 39

- polypodioides (Trin.) Ch. IX, 39 — strictiflora (Fourn.) Ch. IX, 39

Radicula Nasturtium-aquaticum Rendle et Britten VIII, 436

(- officinalis Groves) VIII, 436

Raillardella Nevadensis Nels. et Kenned. V, 288

\*Raillardia Fauriei Lévl. X, 122

Ramischia secunda Garcke f. monstr. multiramosa Andres X, 134

 secunda Garcke var. grandiflora Andres X, 134

Randia insignis Th. Val. V, 394; 1X, 314 (Ranunculus acutidentatus Rupr.) VII, 30

(— acutilobus Ledeb.) VII, 30 aeolicus Loj. Poj. III, 303 Alboffii Macl. I, 113

(— alismoides Bory) VIII, 132

 alpester L, α typicus b. nanus Bolz. 1X, 187

— ampelophyllus Somm. et Lev. var. minor (Boiss.) Busch VII, 30

- anemonefolius DC, ssp. Kotschyi Boiss. var. brevipilus Busch VII, 28 - angustifolius DC. var. alismoides (Bory) Pau VIII, 132

(— — var. uniflorus Boiss.) VIII, 132

apioides Laj. Poj. III, 304

(- aquatilis L. var. longifolius Rossm.

(— — var. trichophyllus A. Gr.) VI, 169 – arvensis L. f. radicans K. Johansson 1X, 493

(— astrantiaefolius Boiss, et Bal.) VII, 29

(— Boissieri Simk.) VII, 29 \*— Bonatii Lévl. VII, 383

- Bongardi var. Greenei (Howell) Piper VI, 170

(- Buhsei Boiss.) VII, 29

- bulbosus L. var. grellensis Brig.

 bulbosus f. \*villosus H. Preuss VII, 106

cardiopetalus Greene VI, 122

(— caucasicus Boiss, et Buhse) VII, 29  $(--\beta$  astrantiaefolius Rupr.) VII, 29

- — subsp. Boissieri (Simk.) Busch VII, 29

– – var. Buhsei (Boiss.) Busch VII, 28, 29

 — concinnatus Schott α croaticus (Schott) Maly VI. 290

— — f. Jahorinae Maly VI, 291

Ranunculus concinnatus  $\beta$  intermedia Maly VI, 291

 $---\gamma$  typicus Maly VI, 291

 — δ Sartorianus (Boiss. et Heldr.) Maly VI, 291

— — — f. angustissima (G. Beck) Maly VI, 291

— ε velatus Halács. VI, 291

— — f. bosniacus Maly VI, 291

\*- coreanus Lévl. VII, 101

 cortusaefolius subvar. villosus Pit. 1X, 206

- Crosbyi Cock. VIII, 221

- cymbalaria Pursh var. exilis (Phil.) R. E. Fr. 1V, 24

- delphinifolius var. terrestris (A. Gray) Piper VI, 169

(- divaricatus Schrank β terrestris Buch.) VIII, 226

— drepanensis Lojac. III, 176

 eremogenes Greene var. longissimus J. Lun. 1X, 899

— — var. pubescens Lun. VIII, 244 (- exilis Phil.) IV, 24

\*— Fauriei Lévl. VII, 101

- Ficaria L. var. gynodioicus Bég. VII, 389

 ficariifolius Lévl. et Vant. var. \*ovalifolia Lévl. VII, 102

 flabellatus Desf. var. betulinus Loj. Poj. III, 303

— — var. procerus Loj. Poj. III, 303

(— Flammula L.) VII, 37

 $(--\alpha \text{ erectus Neilr.}) \text{ VII, } 37$ 

(- - ssp. A. Flammula (L.) Hay.) VII, 37

 $(--\beta)$  reptans Neilr.) VII, 37 (— — f. reptans? Strobl) VII, 37

(-- var. tenuifolius Wallr.) VII, 37 - - ssp. B. tenuifolius (Wallr.) Hay. VII, 37

— Gasparrinii Loj. Poj. III, 302

- geraniifolius Pourr. var. aurimontanus Briq. III, 123

(- Greenei Howell) VI, 170 (— heucherifolius Loj.) III, 303 — hirtipes Greene VI, 122

(— hispidus Michx.) VII, 170

— hololeucus Lloyd var. podocarpus Loj. III, 176

intertextus Greene VI, 123

(— leontinensis Lojac.) III, 176 (- leptaleus Presl) III, 303

— luteolus Loj. Ill, 176 (— Lyalli Hook. f.) VI, 170

(- Macounii Britt.) VI, 170

— macranthus Tod. var. heterophyllus Loj. III, 176

— — var. subterrestris Loj. III, 176

(Ranunculus maximus Greene) VI, 17 - millefoliatus Vahl var. uniflorus Loi. III, 303 (- multifidus var. terrestris A. Gr.) VI. 169 - muricatus L. var. pygmaeus Pitard 1X, 206 (— neapolitanus Loj. III, 303 (— occidentalis var. Lyalli A. Gr.) (- - var. parviflorus Torr.) VI, 170 - octopetalus Greene VI, 123 — ophioglossifolius L. var. major Loj. 111, 304 - oreganus var. Macounii (Britt.) Piper VI, 170 (— oreophilus δ angustilobus Rupr. VII. 29 (— ε dissectus Rupr.) VII, 29 (- - ε dissectus Radde) VII, 29 (— — f. glabrescens Freyn) VII, 29 (- orthorhynchus var. platyphyllus A. Gr.) VI, 170 (- panthothrix Brot.) VI, 169 (— philonotis var. apioides Loj.) III, 304 platyphyllus (A. Gray) Piper VI, 170 \*- Potanini Kom. 1X, 392 - pseudoflaccidus Petunik. VIII, 226 - var. emersus Pet. VIII, 226 - Purshii Richards, VIII, 245 — var. 2. dissectus Lun. VIII, 245 - var. 3 geranioides Lun. VIII, 245 - - var. 5. polymorphus Lun. VIII, 245 - war. 4. radicans Lun. VIII. 245 — - var. 1 schizanthus Lun. VIII, 245 -- repens L. subsp. fistulosus Rosend. VIII, 352 – var. \*Quelpaertensis Lévl VII, 101 (- reptans Maly) VII, 37 - rudis Greene VI, 123 – Senni Loj. Poj. III, 304 \*— silerifolius Lévl. VII, 257 - subtilis Trautv. II, 135 - Taquetii Lévl. IX, 449 (- tenellus var. Lyalli Robins.) VI, 170 (— trichophyllus Lojac.) III, 302 (— trichophyllus Chaix) VI, 169 - — var. longifolius (Rossm.) Koidz. 1X, 136 velatus Halácsy var. bosniacus Maly VI, 292 - verecundus Robins. VI, 169 — Villarsii DC. ssp. acutilobus (Ledeb.) Busch VII, 30 (- - 3. angustilobus Smirn.) VII, 29 (— 4. dissectus Smirn.) VII, 29  $(--\gamma)$  dissectus Akinf.) VII, 29 - - var. dissectus (Rupr.) Busch VII, 29 (− − var. δ major Boiss.) VII, 30

Ranunculus Villarsii f. pumilus Busch VII, 29 (— vitifolius β minor Boiss.) VII, 30 Raoulia Gibbsii Cheesem, IX, 409 \*Rapanea aurea Lévl. X, 376 \*- sessiliflora Mez III, 103 \*— Weberbaueri Mez III, 103 (Raphanistrum Lampsana  $\beta$  ochrocyanea F. Gérard) VIII, 370 (— — α sulphurea F. Gérard) VIII, 370 \*Raphanus macropoda Lévl. X, 349 (— Raphanistrum L. f. concolor Beck) VIII, 370  $--\beta$  ochrocyaneus (F. Gérard) Hay. VIII. 370 — var. γ sulphureus (F. Gérard v. Hav. VIII, 370 \*- Taquetii Lévl. X, 349 Raphiodospora? novoguineensis Th. Val. V, 392 Raphiolepis indica Lindl. var. Tashiroi Hay. VI, 195 japonica S. et Z. III, 152 ovata Briot III, 152 (- umbellatà L. K. Schn.) III, 152 f. ovata C. K. Schn. III, 152 (Rapistrum hispanicum Boiss, et Reut.) V, 364 (- Linnaeanum Boiss. et Reut.) V, 364  $(-- \alpha \text{ glabrum Cariot}) \text{ V}, 364$  $(--\beta)$  hirsutum Cariot) V, 364 (— — "forme" R. microcarpum Jord. (pro spec.) Rouy et Fouc.) V, 364 (— microcarpum Jord.) V, 364 - rugosum (L.) Berg. ssp. I eurugosum Thell. V, 363 - - var.  $\alpha$  typicum Thell. V, 363 – – – subvar. glabrum (Host) Rouy et Fouc. V, 364 – — — subvar. pallidiflorum Thell. V, 363 — — — subvar. scabrum (Host) Rouy et Fouc. V, 363 — ssp. III hispanicum (L.) Thell. V, 364 — — subvar. glabrum (Cariot) Thell. V, 364

— — subvar. hirsutum (Cariot) Thell. V, 364 - — var.  $\beta$  microcarpum (Jord.) Thell. V, 364  $(--\beta$  Linnaeanum Coss.) V, 864 (- - subvar. microcarpum Coss.) V, 364 (— — ssp. R. Linn. Rouy et Fouc.) V, 364 -  $\alpha$  rugosum Coss.) V, 363

Rauwolfia sambesiaca Schinz VI, 166

(— stenophylla D. Sm.) VIII, 475

Index specierum Rheedia arenicola Jum. et Perr. d. 1. Razoumofskya campylopoda (Engelm.) Piper VI, 168 Bath. 1X, 569 Douglasii var. abietina (Engelm.) calcicola lum. et Perr. d. l. Bath. Piper VI, 168 IX, 569 - - var. laricis Piper VI, 168 Rheum inopinatum Prain VII, 174 - - var. tsugensis (Rosend.) Piper Rhinanthus brachyodontus Pau IX, 192 VI. 168 - Pampanini A. Chab. III, 63 (- tsugensis Rosend.) VI, 168 (Rhipidostigma Zollingeri Hassk.) VII, 16 \*Reaumuria Kermanensis Bornm. V, 376 \*Rhipogonum Danesii Domin X, 60 \*Reevesia Cavaleriei Lévl. et Vant. IV, Rhipsalis Harrisii Gürke VIII, 224 – Novaësii (Loefgr.) Gürke VIII, 236 \*Rehmannia Chanetii Lévl. IX, 323 albiflorum Hook. f. Rhododendron Relbunium alpicola K. Schum. III, 359 plenum Rehd. VII, 361 Renanthera annamensis Rolfe V, 77 \*- chrysocalyx Lévl. II, 113 (- Hookeriana Rchb. f.) X, 197 — coombense Hemsl. VIII, 337 Renealmia maculata Stapf K, 355 - Maddeni Hook f. var. obtusifolia Reseda cristallina Webb et Berth. var. Hutch. VII, 177 β Graciosae Pit. IX, 208 \*— Poukhanense Lévl. V, 100 Restrepia Dusenii Samp. VII, 238 \*- rubro-punctatum Lévl. et Vant. IX, \*— Lehmanniana Schltr. III, 277 448 Rhabdadenia corallicola Small III, 272 \*- siamense Diels IV, 289 Rhabdophyllum biserratum v. Tiegh. VI, 8 Rhodorhiza florida Webb et Berth var. contractum v. T. VII, 8
coronatum v. T. V, 8
gracile v. T. VI, 9
Klainei v. T. VI, 8
reflexum v. T. VI, 8 8 angustifolia Pit. IX, 379 Rhus albida Greene IV, 361

— aprica Greene IV, 361 - arbuscula Greene IV, 315 - arguta Greene IV, 360 Rhacoma crossopetalum L. III, 295 - Ashei (Small) Greene IV, 312 \*— Managuatillo Loes. VIII, 294 asplenifolia Greene IV, 362
atrovirens Greene IV, 313
auriculata Greene IV, 311 \*— Urbaniana Loes. I, 162; VIII, 295 Rhamnus Alaternus L. var. angustata Simk. V, 105 \*- Bodinieri Lévl. X, 437 – var. eulata Simk. V, 105
– var. foliis-variegatis Simk. V, 105 borealis Greene IV, 367 \*- calophylla Greene V, 45 asplenifolia (Dipp.) Simk. V, 105 (- Caroliniana Ashe) IV, 312 \*— Bodinieri Lévl. X, 473 \*- Cavaleriei Lévl. X, 474 — Cathartica L. var. ucrainiensis - cismontana Greene IV, 358 Blonski VI, 30 \*- echinocarpa Lévl. X, 475 \* - Cavaleriei Lévl. IX, 326; X, 148, 272 - elegantula Greene IV, 362 \*- Esquirolii Lévl. X, 473 (- glabra var. occidentalis Torr.) IV, 361 \*- hamatidens Lévl. X, 473 (- - var. Sandbergii Vas. et Holz.) — illyrica Griseb. var. orbiculata IV, 357 (Bornm.) Simk. V, 105 \* gummifera Lévl. X, 474 \*- Léveilléana Fedde X, 272 gymnoclada Greene V, 45ithacensis Greene IV, 312 \*— Martini Lévl. X, 473 Nicolae Simk. var. Buduae Simk. - longula Greene IV, 316 V, 105 ludoviciana Greene IV, 314 (— orbicularis Bornm.) V, 105 \*— pseudo-frangula Lévl. X, 473 — media Greene IV, 358 — nitens Greene IV, 359 (- Sagorskii Bornm.) V, 105 occidentalis Greene IV, 361 \*- Schneideri Lévl. et Vant. VI, 265 oreophila Greene IV, 311
petiolata Greene IV, 315
pulchella Greene IV, 314 \*— Taquetii Lèvl. X, 431 (- timoriensis Wipp.) IX, 407 - pulchella Greene IV, 314 \*- pulvinata Greene V, 45 (Rhamphidia discoidea Reichb. f.) VI, 41 (- scripta Reichb. f.) VI, 43 — pyramidata Greene IV, 312 — tenuis Fleischm. et K. Rech.) IX, 88 - sambucina Greene IV, 359 \*Rhaphidophora Dunniana Lévl. IX, 325 Sandbergii Greene IV, 357 sorbifolia Greene IV, 362
tesselata Greene IV, 360 Rhaptopetalum brachyantherum v. Tiegh.

(- Eetveldianum DeWild. et Dur.) V, 120

- Tholloni (Baill.) v. Tiegh. V, 122

(- Soyauxii Oliv.) V, 120

- valida Greene IV, 315 Rhynchanthera orinocensis T. A. Spr. II. 138

Rhynchanthus Johnianus Schltr. VI, 117 Ribes Maximowiczii Kom., non Bat. Rhynchosia chrysantha Schltr. III, 195; VI. 218 VI, 362 - ovalifolium Jancz. III, 893 (- cuernavacana Rose) V, 107 - peruvianum Jancz. III. 381 — petraeum Jacq. var. \*laciniatum Gave V, 196 (- discolor Mart. et Gal.) V, 107 - Harmsiana Schltr. III, 193; VI, 361 ( - longeracemosa Mart. et Gal.) V, 108 × - Philippii (integrifolium ♀ × punc-\*- longipetiolata Hoss. IV, 291 tatum o') Jancz. VII, 335 (- macrocarpa Benth.) V, 108  $\times$  - recens (holosericeum  $\circ$   $\times$  vulgare 3) Jancz. VII, 334 (- nigropunctata S. Wats.) V, 108 - pauciflora Bol. VII, 126 × - robustum (R. niveum × oxyacan-- Pentheri Schltr. III, 194; VI, 361 thoides Jancz. VI, 217 (- precatoria DC.) V, 108 (- Pringlei Rose) V, 108  $\times$  - rusticum (R. grossularia  $\beta$  uva crispa × oxyacanthoides) Jancz. VI. (Rhynchospora alba (L.) Vahl) III, 87 216 - f. \*elatior H. Preuss VII, 105 Santae Luciae Jancz. IV, 210
 X Saundersii (R. hudsonianum ♀ X (- capillacea Torr.) III, 86 (- cymosa Ell.) III, 87 nigrum 3) Jancz. VI, 220 - setchuense Jancz. IV, 209 (- distans (Michx.) Vahl) III, 87 - dommucensis A. H. Moore III, 86 - Soulieanum Jancz. IV, 209 (- glomerata (L.) Vahl) III, 86 — Spegazzinii Jancz. III, 384 (- fascicularis (Michx.) Vahl) III, 87 ×- succirubrum (R. niveum ♀ × divaricatum o) Zab. VI, 217 (Rhytiglossa radicosa Miq.) IX, 307 sucheziense Jancz. IV, 211
tenue Jancz. VI, 218 (Ribes alpinum  $\gamma$  japonicum Max.) VI, × - urceolatum var. purpureum (multi- $(--\beta)$  mandchuricum Max. VI, 218 florum × petraeum) Jancz. VII, 334 Altamirani Janez, IV, 211 - ussuriense Jancz. IV, 211 andicola Jancz. III, 382 × – utile (R. cynosbati × grossularia) ×- arcuatum (R. divaricatum? Jancz. VI, 216 gracile) Jancz. VI, 217

— bogotanum Jancz. III, 381

— bolivianum Jancz. III, 382 - Vilmorini Jancz. VI, 218 Warszewiczii Jancz. III, 281
Weberbaueri Jancz. III, 384 brachybotrys Jancz. III, 381 Riedelia Geanthus Th. Val. V, 377; (— bracteosum  $\alpha$  fuscescens [ancz.) VII. 183 VII, 334 (Riedleia dichotoma Turcz) VIII, 373 - catamarcanum Jancz. III, 383 Rindera albida Wettst.) Kusn. 1X, 542 - Churchii Nels. et Kenned. V, 286 — baldshuanica Kusn. IX, 540 coeleste Jancz. VI, 219 (— cristata Lipsk.) IX, 541  $(--\beta)$  velutinum Jancz.) VII, 333 (- cyclodonta Lipsk.) IX, 540 - cruentum Greene IV, 169 (— eriantha Bge.) IX, 542 (— eriantha Trautv.) IX, 542 distans Jancz. VI, 218 ecuadorense Jancz. III, 382 lanata (Lam.) Gürke var. canescens elegans Jancz. III, 383 (A. DC.) Kusn. IX, 542 fontenayense Jancz. IV, 211 \*— — var. eriantha (Ledeb.) Kusn. IX, - Franchetii Jancz. VII, 333 542 ×— fuscescens (bracteosum × nigrum) - - var. eulanata Kusn. IX, 541 Jancz. VII, 334 — — var. pumila Kusn. IX, 541 ×— futurum (R. vulgare macrocarpum — — var. punctata (A. DC.) Kusn. IX, ♀ × Warszewiczii ♂) Jancz. VI, 219 541 Giraldii Jancz. VI, 218 – var. pubescens (C. Koch) Kusn. 1X, 542 (- glutinosum? x grossularia var. uva crispa Jancz.) IV, 211 -- war. ramosissima Kusn. IX, 542 - - var. robusta Kusn. IX, 542 Hallii Jancz. IV, 210 (- pubescens C. Koch) IX, 542 ×-- innominatum (R. divaricalum × grossularia) Jancz. VI, 219
– kialanum Jancz. VII, 383 (- punctata Heldr.) IX, 541

- regia (Gmel.) Kusn. IX, 540 - tetraspis Pall. var. angustifolia

— turkestanica Kusn. IX, 541

- tetraspis Pall. var. subtenticulata

Kusn. 1X, 540

Kusn. IX, 540

- macrostachyum Jancz. VI, 219 - madrense Cov. et Rose VIII, 243

- latifolium Jancz. IV, 209 — Lehmanni Jancz. III, 384

Lindeni Jancz. III, 383

Rinorea mongalaensis De Wild, X, 430 - Thonneri De Wild, X, 523

Rivea corymbosa Hallier f. var. \*paniculata Hassl. IX, 151

Rodgersia sambucifolia W. B. Hemsl.

\*Rodriguezia pygmaea Kränzl. VII, 39 Roemeria hybrida DC. var. trivalvis (Mnch.) Fedde 1, 29

- macrostigma Fedde I, 29

Rojasia Malme II, 107

- gracilis (Morong) Malme II, 107 \*Rojasiophyton Hassl. gen. nov. IX, 54 \*- tuberculatum Hassl. IX, 54

Romulea anceps (Mer.) Bég. VIII, 216 - Battandieri Bég. X, 219

( - Bulbocodium var. debilis Samp.) VIII, 214

Cartagenae Bég. VIII, 215

(- Columnae P. Cout.) VIII. 216 – Seb. et Maur. var. angustifolia Bég. III, 207

— gaditana (Kze.) Bég. VIII, 215 (— Linaresii? Kze.) VIII, 215

- Linaresii Parl. var. Gaditana Kze.) VIII, 215

(- purpurascens Porta et Rigo) VIII. 215 - Saccardoana Bég. VIII, 216

 uliginosa Kze. var. ambigua Bég. VIII, 214

— — var. debilis Bég. VIII, 214

— var. flexiscapa Bég. VIII, 215
— var. maritima Bég. VIII, 215
— var. rectifoliá Bég. VIII, 215

Roripa hispida (Desv.) Britt. var. glabrata Lun. VIII, 245

pectinata Nels. V, 217

Rosa abietina Greml. var. insubrica R. Kell. II, 149

— — var. Dematranea Lagg. et Pug. f. bavarica Schwertschl. VIII, 99

\*- adenoclada Lévl. X, 431

- agrestis Savi var. pseudomentita R. Kell. VIII, 329

 var. pubescens Chr. f. lanuginea Schwertsch, VIII, 101

 – var. Vaccarii R. Kell. VIII, 329 - alpina L. var. Gallaecica C. Pau 111, 322

ambigua Lém. V. 47

ancistrum Lém. V, 48
arvensis Huds. × gallica L. var. ensfeldensis Schw. VIII, 106

— — X— var. horrida Schw. VIII, 106 — — ×— var. nummulifolia R. Kell. f. hispidior Schw. VIII, 106

– – var. Vulsinia V. Cal. VII, 385 \*- britzensis Koehne VIII, 21

- canina L. var. bihariensis Borb. f. Theodori Schw. VIII, 102

- - var. Blondaeana Crep. f. St. Walburgae Schw. VIII, 103

Rosa canina var. Erdneri Schw. VIII, 102 – – var. eriostyla Borb. f. adunca Schw. VIII, 102

— — f. conspicua Schw. VIII, 102 – – × gallica L. var. laeta Schw. VIII, 106

- - var. giorgii Kell. et Chenev. II, 150 — — var. hispiduloides Schw. VIII, 101

— — f. intermicans Schw. VII, 331 - - var. jurensis Schw. VII, 331;

VIII, 102

— — var. latifolia Schw. VIII, 102

 – var. montivaga Borb. f. composita Schw. VII, 331; VIII, 102

— — var. ololeia H. Br. f. lagenoides Schw. VIII, 101

— – var. \*Petryi K. Wein IX, 497 — — var. reginae Schw. VIII, 103

-- - f. eriostyloides Schw. VIII, 103

— — var. saxicola Schw. VIII, 102 var. Schottiana Ser. f. armata Schw. VIII, 102

— — f. hypsisepala Schw. VIII, 102 — — var. sphaerica Gren. f. subhirta

Schw. VII, 331

— var. spuria Borb. f. Hadriana Schw. VIII, 101

- - f. monticola Schw. VII, 332; VIII, 101

— transitoria var. Vollmanniana Schnetz VII, 351

\*- Cavaleriei Lévl. VIII, 61 Celsii Léman V, 47

- Chavini Rap. var. transitoria R. Kell. VIII. 330

 coriifolia Fries f. albescens H. Braun IV, 372

– var. clavata R. Kell. II, 149

- var. frutetorum H. Br. f. bispinosa Schw. VIII, 106

— — var. Hoffmannii R. Kell. VIII, 329 — subsp. subcollina Schw. VIII, 105 — var. Vaccarii R. Kell VIII, 329

 cymbifolia Léman V, 47 - dumetorum Thuill. var. comata

Schw. VIII, 103 — — f. mollissima Schw. VIII, 103

— — var. comatoides Schw. VIII, 104 - - f. accedens Schw. VIII. 104

— — f. fertilis Schw. VIII, 104 — — f. irregularis Schw. VIII, 104

— — var. \*Lebingii K. Wein IX, 316 — - var. palatina Schw. VIII, 104

- var. platyphylla Chr. f. sphaeroidea Schw. VIII, 103

— — f. umbrosa Schw. VIII, 103 - - var. uncinelloides H. Br. f. sub-

uncinelloides Schw. VIII, 104 -- imes gallica L. var. Boreykiana R. Kell. f. grandiflora Schw. VIII, 107

Rosa elliptica Tausch var. Billietii Chr. f. lanuginosa Schw. VIII, 100

 var. calcarea Chr. subforma subhispida Schw. VIII, 100

— var. genuina Schw. VIII, 100
— f. dolomitica Schw. VIII, 101 — — f. longipedata Schw. VIII, 100

— — var. spinifera Schw. VIII, 100

- eriocarpa Léman V, 47 \*- Fauriei Lévl. VII, 199 - foliosa Léman V, 47

- funerea Sabr. VII, 237 - gallica × canina R. Kell. var. Schulzeana Schnetz VII, 353

(-- × Jundzilli var. tolosana) VIII, 370, 371

- glauca Vill. var. alcimonensis Schw. VIII, 104

— — f. separata Schw. VIII, 105 var. concomitans Schw. VIII, 104

- var. denticulata R. Kell. f. Dorrii Schw. VIII, 105

— — var. Jaccardii R. Kell. VIII, 329 - var. myriodonta Chr. f. helio-phila Schw. VIII, 105

 — var. pseudofalcata R. Kell. f. mecocarpa Schw. VIII, 105

- var. Sandbergeri Chr. f. diacantha Schw. VIII, 105

 — subsp. subcanina Schw. VIII, 104 — — var. vallis-fagorum Schw. VIII, 105

- histrix Lém. V, 47, 48 - Hugonis Hemsl. III, 186

 Jundzilli Bess. var. \*Jacobsii K. Wein 1X, 345

- var. Pugetii Crep. f. serrata Schw. VIII, 99

\*- Korsakoviensis Lévl. X, 378

\*- lucidissima Lévl. IX, 444 lutetiana Lém. V, 47

(— Macdougali Holz.) VII, 215 \*— Marretii Lévl. VIII, 281

- micrantha var. leucantha R. Kell. 11, 150

— — var. Lucomagni R. Kell. II, 150 — — var. \*permixta Borb. f. heteracantha Schw. VIII, 100

\*- Mokanensis Lévl. VII, 340

– montana Chaix var. intromissa R. Kell. VIII, 330

× – Münnerstadtiana (R. elliptica × R. agrestis Schnetz) Fedde VII, 44

\*- Nakaiana Lévl. X, 432 neglecta Lém. V, 48
nemoralis Lém. V, 47, 48

(- nutkana hispida Fern.) VII, 215

nutkana var. Macdougali (Holz.)
 Piper VII, 215

parvifolia Lém. V, 48

- pimpinellifolia L. var. lagenoides R. Kell. f. erubescens Schw. VIII, 106 Rosa pimpinellifolia var. oenocarpa (Gdgr.) H. Braun et Haring VIII, 96

— — var. piligera Schw. VIII, 106

— poterium Lém. V, 47 — pubescens Lém. V, 47, 48 \*— quelpaertensis Lévl. X, 378

- rubiginosa L. var. amphadena R. Kell. II, 150

- - var. \*Beckeri K. Wein IX, 126 – subsp. columnifera Schw. VIII, 100

var. macrostyla Schw. VIII, 100

 f. comosoides Schw. VIII, 100

— f. paupercula Schw. VIII, 100

- war. comosa Dum. f. apricorum Rip. subf. subienensis Schnetz VII, 331

 var. macrostyla Schw. f. altimontis Schnetz f. VII, 331

- - var. microphylla R. Kell. f. densa Timb.-Lag. subf. subjenensis Schnetz VII, 331

- - f. rotundifolia Rau subf. subienensis Schnetz VII, 331

– war. paucispinosa Rob. Kell. V, 157

 — var. umbellata Christ f. umbrosa Schnetz VII, 330

- rustica Léman V, 47

× Schnetzii (R. glauca × pimpinellifolia Schnetz) Fedde VII, 47

- sempervirens L. var. reptans Pons et Conill VIII, 32

- sorbiflora Focke IV, 123

×— speciosa Dés. var. pseudogallica Sudre VIII, 371

×- - var. pseudo-tolosana Sudre VIII, 370

- subcanina var. Schwertschlageri Schnetz VII, 351

 subcollina var. anceps Schnetz VII, 352

 var. grabfeldensis Schnetz VII, 352
 var. grandibracteata Schnetz VII, 352

- subvillosa Lém. V, 47

\*— Sweginzowii Koehne VIII, 22 \*— Taqueti Lévt. VII, 199 — tomentella Lém. V, 47, 48

 — var. bohemica H. Br. f. eminens Schw. VIII, 101

- - subsp. uniserrata Schw. VIII, 101 tomentosa Sm. var. cuspidatoides

Crép. f. calvescens Schnetz VII, 330 - var. \*Quellei K. Wein X, 56

— — var. subglobosa Car. f. anceps Schw. VIII, 99

- - f. fallax Schw. VIII, 99

— — var. Seringeana Dum. f. poecilacantha Schw. VIII, 99

Rosa urbica Lém. V, 47 (Rosmarinus laxiflorus Mariz) VIII, 462 - officinalis L. β nutans P. Cout. VIII,

— — α vulgaris P. Cout. VIII, 462 (Rostellaria sarmentosa Zoll.) IX, 307 (Rostellularia sarmentosa Nees) IX, 307 Rotala densiflora Koehne var. formo-

sana Hay. VI, 195 (Rottboellia Salzmanni Trin.) VI, 341 - truncata Maiden et Betche IV, 283 \*Roucheria laxiflora H. Winkl. VII, 109 Roulinia Rensoni Pitt. VIII, 477 (Rourea adianthoides Gilg) X, 243

(- Afzelii Planch.) X, 248

(-- albido-flavescens Gilg) X, 244

(— anomala King) X, 247 (— Baumannii Gilg) X, 244 (— bipindensis Gilg) X, 245

 brachyandra F. v. Muell.) X, 247 (- Buchholzii Gilg) X, 245

- cassioides Hieron.) X, 243 — chiliantha Gilg) X, 248 - commutata Planch.) X, 247

Dinklagei Gilg) X, 246
erecta Merr.) X, 247
fasciculata Gilg) X, 243

- Foenum graecum De Wild.) X, 244

 gudjuana Gilg) X, 248 - heterophylla Planch.) X, 247 hypovellerea Gilg) X, 245

Mannii Gilg) X, 246
microphylla Planch.) X, 247

Millettii Planch) X, 247 - monticola Gilg) X, 244

— multiflora Planch.) X, 247 (— nivea Gilg) X, 245

(- obliqua Radlk.) X, 247 (- obliquifoliolata Gilg) X, 243 orientalis H. Bn. var. madagascari-

ensis L. Courch. VI, 221 ( – ovalifoliolata Gilg) X, 244 ( – parviflora Gilg) X, 245

(- Poggeana Gilg) X, 245 pseudobaccata Gilg) X, 245
 ptaeroxyloides Gilg) X, 243

- Radlkoferana K. Schum.) X, 247 - Sookurthoontee Voight) X, 247

(— Soyauxii Gilg) X, 243 (— splendida Gilg) X, 248 (— strigulosa Gilg) X, 245 (— Thonneri De Wild.) X, 424

(— unifoliolata Gilg) X, 246 (- usaramensis Gilg) X, 246

— venulosa Hieron.) X, 245 - viridis Gilg) X, 246

volubilis Merr.) X, 247
 Zenkeri Gilg) X, 246

Roureopsis fasciculata (Gilg) G. Schellenb. X, 243

- obliquifoliolata (Gilg) G. Schellenb. X, 243

\*Rubia Esquirolii Lévl. X, 439

 fruticosa Ait. var. γ pendula Pitard 1X, 276

- Rezniczenkoana Litw. IX, 556 - ruwenzorensis Cort. VI, 189 Rubus acerispinus H. Sudre VII, 346

- acris L. f. fallax Rohl. I, 33

– albicomus Greml.  $\beta$  Lumnitzeri (Sabr.) Hay. IX, 500

(-- subsp. Lumnitzeri Sabr.) IX, 500 \*- altisepalus Kinsch. VII, 81

- amblypetalus Sud. VII, 346 \*- ampelophyllus Lévl. V, 279 \*- andropogón Lévl. VIII, 58

- Antonii × holochlorus Hay. IX, 503 ( - apiculatus B. glaucovirens II. Beckii

Focke) IX, 500

 apricus Wimm. β Carnegianus Sabr. IX, 503

(- apum Fritsch) IX, 499 - aragonensis Pau VII, 84

\*- Argyi Lévl. IV, 333 \*- armatissimus Figert VI, 332

(x— avaricus [Caflischii x epipsilos]

Sabr.) IX, 501 - Barkeri Cock. IX, 410 (- bavaricus Sabr.) IX, 499

(- bavaricus × bifrons Sabr. IX, 499 - Fk. var. \*zschopavinus Kinsch. VII,

(- Beckii Hal.) IX, 500

(- Bellardii var. vastus Sabr.) IX, 503 × - bellissimus (R. bifrons × inaequalis) Sabr. IX, 502

 bifrons × macrophyllus II, 143 - - var. subglandulosus Sabr.) IX, 498

\*- Blinii Lévl. VII, 258 \*

Bonatii Lévl. VII, 338

- brachystemon Heim. b. barbatus

\*X— breviceps (R. Koehleri W. N. X trichoperus Kinsch.) serpens Wh. Kinsch. VII, 343

\*- Briareus Focke IX, 235 \*- Buchtieni Focke IX, 236

×- caesiiformis (R. caesius × corymbosus) H. Sud. VII, 347

 $\times$  – (caesius  $\times$  < villicaulis) var.

\*treviranioides Kinsch. VII, 79 Caflischii × holochlorus Hay. IX, 501

- Focke  $\beta$  iracundus Sabr. IX, 502

\*— callistylus Kinsch. VII, 79

\*- calycacanthus Lévl. VIII, 58 var. \*Buergerifolius Lévl. VIII,58

(- candicans Whe.) IX, 498

- - subsp. B. adenophorus (Freyn) Hay. IX, 498

C. candicans (Whe.) subsp. Hay. IX, 498

Rubus candescens subsp. A. thyrsanthus (Focke) Hay. IX, 498

×- carbonarius (Antonii × epipsilos) Sabr. IX, 503

- chaerophyllomorphus Kinsch. VII,

chlorothyrsus Jk. var. \*staminulatus

Kinsch. VII, 78

×- ciliolentus (R. caesius L. × Balfourianus Blox?) Kinsch. VIII, 371 — cimbricus Fk. var. \*chloodes Kinsch. VII, 78

(- coarctatus P. I. Müll.) IX, 498

- Coillardi Petitm. III, 60

coreanus var. \*Nakaianus Lévi. VIII, 358

- crataegifolius Bge. var. subcrataegifolius Lévl. et Vant. II, 174

(— ctenodon Fritsch) IX, 500

\*- Damieni Lévl. X, 121 \*- diamantina Lévl. V, 279 \*- dissociatus Figert VI, 333

×- dolichacanthus Sabr. IX, 501

\*- Duclouxii Lévl. VI, 111 ×- Durimontanus Sabr. II, 143

\*- Esquirolii Lévl. IV, 333

- Fauriei Lévl. et Vant. II, 174 \*- Feddei Lévl. et Vant. Vill, 549

(- festivus subsp. avaricus Sabr.) IX, 501

(- Figerti Sabr.) IX, 503 (- foliolatus Hal.) IX, 504 (- foliolatus Hay.) IX, 503

(- foliosus Hal.) IX, 504

(- - subsp. cassoriensis Sabr.) IX, 500

- W. N. subsp. B. chloranthus (Sabr.) Hay. IX, 501

(- foliosus subsp. ctenodon Sabr.) IX,

(- fragrans Freyn) IX, 498

\*- franconidicus Kinsch. VII, 342

- Freynii Hay. IX, 503 Fritschii Sabr. IV, 371

(- fruticosus γ discolor Murm.) IX,

- fuscoater Wh. et N. ssp. absconditus Lef. et M. var. \*silensanus Kinsch. III, 211

 $- - \beta$  subbavarious (Sabr.) Hay. IX, 499

— — × bifrons Hay. IX, 499

- gallaecicus Pau VII, 84 glaucellus var. armatus H. Sud. VII, 347

(- glaucinus Müll.) VII, 347

(- gracilicaulis var. persericans Sabr.) IX, 499

- Gremlii Focke subsp. B. styriacus (Hal.) Hay. IX, 501

- - var. umbrosus Freyn) IX, 501 (— — var. vexans Freyn) IX, 501

Rubus Grossularia Lévl. et Vant. II, 175 ×- Gugleri (R. eu-Caflischii Focke D. thelybatos Focke × Köhleri W. et

N. 2. Bavaricus Focke) Erdn. VII, 46 (— harpactor Sabr.) IX, 501

(- hennebergensis var. subbavaricus Sabr.) IX, 499

\*- Hillebrandii Lévl. X, 120

- hirtus W. K. microg. pectinatus Grav, et Sud. var. \*mizonodon Kinsch.

 — ssp. \*pluridigitatus Kinsch. VII, 81 ×— incertus Hal. (R. candicans × sul-

catus Hay.) IX, 498

 $(\times - - [R. sulcatus \times thyrsoideus]$ Sabr.) IX, 498 - (R. montanus × sulcatus Hal.)

XI. 498

 infestus Wh. var. \*setosus Kinsch. VII, 79

(- insericatus subsp. barbatus Sabr.) IX, 501

- Itoensis Lévl. et Vant. II, 175 - Kinashii Lévl. et Vant. II, 175

(- Koehleri Hal) IX, 504 - Koehneanus Focke VIII, 335

\*- Koehnei Lévl. X, 121 - Krasanii Sabr. IX, 500

- - var. largus Hay. IX, 500 \*- Labbei Lévl. et Vant. VIII, 549

\*- laticors Kinsch. VII, 82 (- laxiflorus Hal.) IX, 500

\*X— lugiacus (R. foliatus L. et M. X caesius L.) Kinsch. VII, 344 (— Lumnitzeri Fritsch) IX, 500

X— macrocardiacus Sabr. (R. Gremlii subsp. stiriacus × macrophyllus Hay. IX, 501

\*- macrogongylus Focke IX, 236 - macrophyllus W. N. var. apum (Fritsch) Hay. IX, 499 (-- x styriacus Sabr.) IX, 501

– macrostachys P. J. M.  $\beta$  chlorifolius

Sabr. et Sud. IX, 500 \*- maiorifolius Kinsch. VII, 344

 Makinoensis Lévi. et Vant. II, 174 — marmoratus Lévl. et Vant. II, 175

(— Marshalli f. continentalis Sabr.) IX, 502

Matsumuranus Lévi. et Vant. II, 176

- Merinoi Pau III, 327

 minimiflorus Lévl. IV, 332 \*- mollifrons Focke IX, 236

(- Monguilloni Lévl. et Vant ) VII, 258

(- montanus Freyn) IX, 498

(- - γ coarctatus Hal.) IX, 498

 $(--\alpha)$  thyrsanthus Hal.) IX, 498

Mouyousensis Lévl. IV, 333myriadenus Lévl. et Vant. var. \*grandifoliolatus Lévl. et Vant. IV, 334

× Rubus Neoburgensis (R. bifrons Vest. eu-Caflischii Focke D. thelybatos Focke Zinsm. VII, 45

(- pallidus W. N.) IX, 500

- ssp. B. Beckii (Hal.) Hay. IX, 500 – ssp. C. ctenodon (Sabr. Hay.) IX, 500

 – subsp. foliolatus Lef. & M. var. \*patulispinus Kinsch. VII, 79

- - ssp. A. pallidus (W. N.) Hay. IX. 500

\*- Papyrus Lévl. IV, 332

paykonangensis Lévl. IV, 333

- persericans Sabr. IX, 499 - phyllothyrsus Hay. IX, 504 - -  $\beta$  pernegensis Hay. IX, 504

(- pilocarpus ssp. eupilocarpus Sabr.) IX, 504

– – ssp. A. Gremlianus Hay. IX, 504 (- - ssp. C. pilocarpoides Sabr.) IX, 504

(— — ssp. B. Pseudo-Marshallii Sabr.) IX, 502

(- pilocarpus [psilocarpus] Greml.) IX, 504

 – ssp. B. Sabranskyanus Hay. IX, 504

 $(--\times stiriacus Sabr.)$  IX, 501 \*— pinetanus Kinsch VII, 342

- pinfaensis Lévl. et Vant. VI, 374 \*- platydactylus Kinsch. VII, 80 \*× porphyromallos Focke IX, 235

\*- psainmogenes Kinsch. VII, 343

 pseudo-conformis (R. conformis x ulmifolius) H. Sud. VII, 347 X— Pseudo-Gremlii (R. Gremlii x to-

mentosus) Hay. IX, 498 - Pseudo-Marshallii (Sabr.) Hay. IX,

502

\*- pseudo-saxatilis Lévl. V, 280 \*- - var. Kouytchensis Lévl. V,

\*- pulchelliflorus Kinsch. VII, 341

\* – Pyi Lévl. VI, 111

\*- quelpaertensis Lévl. V, 280

- Quensanensis Lévl. et Vant. II, 175

( - racemigerus Sabr.) IX, 502 \*- refractus Lévl. IV, 332

\*- rhapidorrhachis Kinsch. VII, 80

\*× - rhodacanthodes (R. Schleicheri Wh. × villicaulis Koehl.) Kinsch. VII, 79

(- rhodacanthus Kinsch.) VII, 79 rivularis M. & Wg. var. \*subglabri-

folius Kinsch. VII, 81 – micr. \*sudeticola Kinsch. III, 211

\*- sachalinensis Lévl. VI, 332 \*- saltivivus Kinsch. VII, 341

— scaber W. N.  $\beta$  porphyrogenes Sabr. IX, 500

\* - schizostylis Lévl. V, 280 (- Schummelii Sabr.) IX, 501

\*- Schwenckfeldi Kinsch. III, 210

(Rubus serpens var. lividus Sabr.) IX, 503

– var. \*stenurus Kinsch. VII, 341

(— — var. vastus Sabr. IX. 503) \*- silingicus Kinsch. III, 209

- söchaviensis Sabr. (R. Gremlii ssp. stiriacus × pilocarpus [Sabr.] Hay. IX, 501

\*- stephanandria Lévl. VIII, 358

(- Stroblii Sabr.) IX, 500 ( - styriacus Freyn) IX, 503 (- styriacus Hal. IX, 501

- suavifolius Gremli β subvelutinus Hay. IX, 499

- suberectus Anders. var. \*Gintli

Tocl. I, 12

- - subpauperatus Cock. VIII, 221 \*x— subrotundicaulis (R. absconditus L. & M. var. silensanus Kinsch. × spec. e Glandulosis [R. Guentherii W. N.?] Kinsch. VII, 81

×- substylosus (R. bifrons × thyrsiflorus var. stylosus) Sabr. IX, 498

×- Sudreanus (fuscoater var. subbavaricus × bifrons) Sabr. IX, 499

talaikiaensis Lévl. IV, 334
Taqueti Lévl. VII, 340

- tereticaulis P. J. Müll. f. scythicus Sud. VI, 173

- - ssp. vepallidus Sud. var. \*subrhombeus Kinsch. VII, 81

(— thyrsanthus Focke IX, 498

- - var. adenophorus Freyn) IX, 498 - thyrsiflorus var. chloranthus Sabr.) IX, 501

(- - ssp. R. candicans Focke) IX, 498 (- - ssp. thyrsanthus Focke) IX, 498

\* - trichoperus Kinsch. VII, 343 - triflorus Rich. var. diversifolius Lévl. II, 174

\*— umbellifer Lévl. VI, 111

- Vahlii K. Frieder, III, 31

- valdebracteatus H. Sud. VII, 347

\*— Vanioti Lévl. V, 280

\*— variicolor Kinsch. VII, 343

vastus (Sabr.) Hay. IX, 503

 $\times$ — velutinatus (R. bifrons  $\times$  caesius) H. Sud. VII, 347

\*— venedicus Kinsch. III, 210

 villicaulis Koehl. var. \*humiliserratus Kinsch. VII, 78

×Rubus Weissenburgensis (R. tereti= caulis × condensatus) H. Sud. VII,

xanthacantha Lévl. IV, 333

- Yabei Lévl. et Vant. II, 175

 $\times$ — Zinsmeisteri (R. caesius L.  $\times$  R. eu-Caflischii B. epipsilos Focke) Erdn. VII, 47

(Rudbeckia bellioides Sm.) V, 327

(- decumbens Sm.) V, 327

164 \*Ruellia Herzogii Lind. VII, 67 - oxysepala C. B. Clarke VI, 167 (- patula Jacqu. var. pubescens Balf. fil) VII, 163 - scabrifolia Th. Val. V, 393 - Socotrana Vierh. VII, 163 succulenta Small III, 293 (Rumex Acetosa Planellas) VIII, 288 (- Acetosa L.) VII, 33 - - subsp. Acetosa (L.) Hay. VII. 33 — — ssp. thyrsiflorus (Fingerh.) Hay. VII. 33  $\times$  - austriacus (R. alpinus L.  $\times$  silvester Wallr.) Teyb. VIII, 95 - crispus L. c. glaucus Terracc. V, - cyprius Murb. IV, 254 - ephedroides Bornm, IX, 142 VIII, 288

intermedius DC. var. pilosus Mer.

- Planellae Pau et Merino VIII, 288

 planivalvis Murb. IV, 251 roseus Campd. IV, 254roseus Meisn.) IV, 253

 simplicifolius Murb. γ libycus Murb. IV, 253

 $--\beta$  maderensis Murb. IV. 252 (- thyrsiflorus Fingerh.) VII, 33

 turcestanicus O. Pauls. X, 415 vesceritensis Murb. IV, 253

(- vesicarius var. planivalvis Murb.) IV, 251

(Rungia apiculata Bedd. IX, 307

- Blumeana Val. IX, 305 – var. hirsuta Val. IX, 306

(— origanoides Nees) IX. 305 salaccensis Val. IX, 306 - sarmentosa Val. IX, 307

\*Ruppia Taquetii Lévl. IX, 323

Ruscus aculeatus L. var. Burgitensis Briq. III, 30

\*Rynchosia Rojasii Hassl. VII. 77 - \*§ Rynchosepalum nov. sect. Hassl. VII. 76

Ryssopteris intermedia Hochr. V, 349

\*Sabal jamaicensis Becc. VI, 94 Sabbatia simulata N. L. Britt. V, 181 \*Sabia Cavaleriei Lévl. IX, 456

\*- Dielsii Lévl. IX, 456 \*- Dunnii Lévl. IX, 457 \*- Esquirolii Lévl. IX, 457 \*- Feddei Lévl. IX, 456

— gracilis Hemsl. V, 39 (— Swinhoei Hemsl.) V, 339 Sabicea camporum T. A. Spr. II, 141

(Sabulina austriaca Rchb.) VII, 33

(- banatica Heuff.) VII, 33 (- Gerardi Rchb.) VII, 33 - laricifolia Rchb.) VII, 34 (- setacea Rchb.) VII, 33

Sacciolepis curvata (L.) Chase V, 306

- indica (L.) Chase V, 306 - myurus (Lam.) Chase V, 306

 strumosa (Presl) Chase V, 306
 vilvoides (Trin.) Chase V, 306 \*Saccolabium aberrans Schltr. X, 202

\*- aurantiacum Schltr. X, 200

\*- bilamellatum (J. J. Sm.) Schltr. X, 201 \*- celebicum Schltr. X, 198 - Coplandi Bail. VIII, 81

\*- koeteiense Schltr. III, 280

\*- Koordersii (Rolfe) Schltr. X, 201 \*- Minahassae Schltr. X, 200

\*- Samarindae Schltr. III, 280 \*- Steffensii Schltr. X, 199

- - var. \*tomohonensis Schltr. X, 200

\*- sterrophyllum Schltr. X, 201 \*— subulatum Schltr. X, 198 \*- Vaupelii Schltr. IX, 110

(Saccoloma sorbifolium (Sm.) Christ) V. 370

Sagina apetala L. f. rosulata Thell. III. 128

-- - var. leiosperma Thell. III, 128 — capillacea Loj. Poj. V, 25 - ciliata (Greene) Piper VI, 169

— Fr. var. echinosperma Thell. III, 128

— diversifolia Loj. Poj. V, 25 — gregaria Loj. Poj. V, 25 — procumbens L. b. lucana Terracc. V, 136 \*— Taquetii Lévl. X, 350

Sagittaria arifolia (Nutt.) Smith var. 5. cuneata (Sheld.) Lun. VIII, 244

— — var. 3. dimorpha Lun. VIII, 243 - - var. 1. monomorpha Lun. VIII, 243

-- - var. 4. polymorpha Lun. VIII. 243

(- cuneata Sheld.) VIII, 244

- montevidensis Cham. et Schlecht. f. maculata C. M. Hicken VIII, 256 — — f. immaculāta C. M. Hick. VIII, 256

Salicornia fruticosa L. var. subacaulis Mer. VIII, 289

— — f. prostrata Mer. VIII, 289 — pulvinata R. E. Fr. IV, 37

- rubra A. Nels. var. prona J. Lun. IX, 404

( $\times$ Salix ambigua (repens  $\times$  aurita) Kraš.) VI, 243

\*- andropogon Lévl. et Vant. III, 21

\*- angiolepis Lévl. et Vant. III, 22 \*- anisandra Lévl. et Vant. III, 22

\*— anomala Egb. Wolf V, 22

— arbuscula L. var. angustifolia E. Steig. III, 235

– – (var. Waldsteiniana) × incana Thell. X, 220

\*Salix Argyi Lévl. X, 437

- argyracea Wolf VI, 215

- aurita L. f. \*pseudomonoeca Heppii Toepif. III, 348

— f. \*metamorpha Toepf. III, 206

\*— Blinii Lévl. X, 435 — Camusi Lévl. VI, 378

 caprea L. × daphnoïdes Vill. var. Neoburgensis Erdn. II, 101

f. digyna Brenn. IX, 496
Q f. reflexiflora (Lasch) Toepff. III, 206

\* Chevalieri O. v. Seem. V, 133

 commutata var. mixta Piper VI, 168 (— — var. sericea Bebb.) VI, 168

 daplinoides Vill. f. erythrostyla K. R. Kupff, II, 136

- dolichostyla Seem. var. \*Hirosa-

kensis Lévl. et Vant. III, 22

\*— Endlichii O. v. Seem. V, 19 \*— erioclada Lévl. et Vant. III, 22

(- excelsior Host) VI, 243

 $(- - \alpha \text{ discolor A. Kern.}) \text{ VI, 243}$ 

 $(--\beta)$  viridis A. Kern.) VI, 243

 Fauriei Seem. III, 351 \*- Feddei Lévl. X, 436

(- fragilis-alba b. glabra Wimm.) Vl,

(-- - a. viridis Wimm.) VI, 243 – var. vitellina Lér. f. pendula Zob. VIII, 349

(- glauca Coville) X, 510

- var. Seemanii (Rydb.) C. H. Ostenf. X, 510

(- glaucescens Host) VI, 243

\* - gymnolepis Lévl. et Vant. III, 22

\* – Hallaisanensis Lévl. X, 435 – var. \*nervosa Lévl. X, 435

\*- kolymensis O. v. Seem. V, 18 × - Krasanii (S. angustifolia × aurita)

Hay. VI, 243 \*- Makinoana O. v. Seem. I, 173

myrtilloides × repens f. \*submyrtilloides Abrom. VII, 105

( – nigricans d. glaucescens A. Kern.) VI, 243

 – Sm, β microphylla (Gaud.) Hay. VI, 243

 – γ ovata (Gaud.) Hay. VI, 243 (— — var. parvifolia Wimm.) VI, 243

(— ovata Host) VI, 243

\*- pachyclada Lévl. et Vant. III, 22 pentandra L. & var. polyandra (Weigel) f. \*julifurca Toepff. III, 348

(- phylicifolia microphylla Gaud.) VI, 243

(— — var. ovata Gaud.) VI, 243 \*— Pilgeriana ♀ v. Seem. VII, 134

\*— pogonandra Lévl. X, 436 polyandra Lévl. VI, 377

(x— Preussiana Abrom.) VII, 105

\*Salix pseudo-Gilgiana Lévl. X, 436 \*- pseudo-jessoensis Lévl. X, 436

\*- pseudo-lasiogyne Lévl. X, 436 - purpurea L. of f. \*julifurca Toepff. III, 348

 repens L.f.\*pseudomonoeca Toepff. III, 348

- retusa L. var. rotundato-obovata R. Kell. II, 148

×— rubens (S. alba × fragilis) Schrk.

a discolor (Kern) Hay. VI, 243 (- - f. excelsior Hay.) VI, 243

 $--\beta$  viridis (Fr.) Hay. VI, 243

(— Seemanii Rydb.) X, 510 — semiviminalis Wolf VI, 215 \*- Siuzevii O. v. Seem. V, 17 \*— Souliei O. v. Seem. III, 23 (- Thellungii v. Seem.) X, 220

\*× turgaiskensis (S. repens rosmarinifolia Koch × caspica Pall.) E. Wolf. X, 477

 viminalis L. var. latifolia Wolf VI, 214

— — var. longistyla Wolf VI, 213 - - var. strobilacea Wolf VI, 214

(- viridis Fr.) VI, 243

(Salomonia cylindrica Schum. et Lauterb. non Kurz) X, 486

(- bifida Forsk.) X, 467 (Salsola fruticosa Pall) III, 93

pestifer A. Nels. IX, 482
turkestanica Litw. IX, 558

Salvia Alamosana Rose VIII, 310 ballotiflora Benth. VIII, 310 \*- betonicoides Lévl. VIII, 421

(- Bithynica Briq. et Post) X, 468 \*- Blinii Lévl. IX, 219

bulgarica David. I, 127

— canariensis L. var.  $\beta$  villosa Pit.

IX, 380 \*— Cavaleriei Lévl. VIII, 422 \*— Charbonnelii Lévl. IX, 220

 coccinea Juss. VIII, 310 - cyanea Benth. VIII, 310

\*- Delavayi Lévl. IX, 220 \*- Esquirolii Lévl. VIII, 421

\*- Fargesii Lévl. IX, 220 - Forskahlei L. X, 465, 467, 468

 $(--\alpha)$  bifida Forsk.) X, 467

 $(--\beta)$  Bithynica Gris.) X, 467 (- - var. Brussiana Clem.) X, 467

(— — var. Byzantina Clem.) X, 467

fulgens Cav. VIII, 310
Greatai T. S. Brdg. IV, 13

- Greggii A. Gr. VIII, 310

(- Hierosolymitana var. Pontica Freyn et Bornm.) X, 397, 468 hyptoides Mart. et Gal. VIII, 300

- lanceolata Willd. VIII, 309 (— longepetiolata C. K.) X, 467

\*- Marretii Lévl. IX, 219

Salvla mexicana L. var. minor Benth.

muscarioides Fern. VIII, 309nana H. B. K. VIII, 310

occidentalis Sw. VIII, 309

— pontica Freyn et Bornm.) X, 397,

- prunelloides H. B. K. f. minor Loes. VIII, 309

- scapiformis Hance var. pinnata Hay, VI, 197

\*- Souliei Lévl. IX, 219 \*- Thibetica Lévl. IX, 219

— tiliifolia Vahl VIII, 309 \*- tuberifera Lévl. VIII, 421

- Wiedemanni Boiss. var. \*polychaeta Bornm. V, 168

 xalapensis Benth. VIII, 310 \*Samolus pyrolifolius Greene VII, 197

\*- vagans Greene VII, 196 - Valerandi L. var. acaulis Mer. VII,

362 Sanguisorba officinalis L. f. 2. Albarra-

cinensis Pau VII, 85 — — f. 3. Hispanica (Mill.) Pau VII, 85

— — f. 1. macrophylla Pau VII, 85 \*Sanicula Dielsiana Wolff VIII, 524 (Santalodes heterophyllum O. Ktze.) X,

(- monadelphum O. Ktze.) X, 247 (- multiflorum O, Ktze) X, 247 Santaloïdes (L.) G Schellenbg. X, 246 (- Afzelii (Planch.) G. Sch. X,

- anomalum (King) G. Sch. X, 247 - brachyandrum (F. v. M.) G. Sch.

X, 247

— erectum (Blanco) G Sch. X, 247 - Hermannianum O. Ktze. var. monadelphum (Roxb.) G. Sch. X, 247 - microphyllum (Hook. et Arn.) G.

Sch. X, 247

Radlkoferanum (K. Schum. et Lauterb.) G. Sch. X, 247

 volubile (Blanco) G. Sch. X, 247 Santolina rosmarinifolia L. var. cinerea Pau et Mer. VIII, 64

Sapindus marylandicus Hollick IV. 103

– Thurstonii Rock X, 368

Sapium anadenum Pitt. VIII, 467 — oligoneurum Schum, et Pitt, VIII,

- pachystachys Schum, et Pitt. VIII, 469

- pleiostachys Schum, et Pitt. VIII, 467

- sulciferum Pitt. VIII, 470

 thelocarpum Schum, et Pitt, VIII, 468 ×Saponaria composita (glutinosa × officinalis) Pau III, 330

\*- Kermanensis Bornm. VI, 302 officinalis L. b. grandiflora Terracc. V, 136

Saponaria officinalis c. prolifera Terracc. V, 136

(- parvula Bge.) VI, 303
- viscosa C. A. M. VI, 303
(Sarcanthus bilamellatus J. J. Sm.) X, 201
- duplicilobus Sm. V, 302
\*- Gjellerupii Sm. X, 488
- montanus Sm. V, 302

\*- potamophilus Schltr. III, 279 Sarcocaulon Currali Heckel IX, 540 \*Sarcochilus koghiensis Schltr. IX, 293

- Longmanii Bail. IX, 548

\*- macrosepalum Schltr. X, 203

\*- minimum Schltr. III, 110

- pallidus (Bl.) Rchb. f. var. \*celebicus Schltr. X, 203

\*- phalaenopsis Schltr. X, 203 - pulviniferus Schltr. X, 204 - quinquelobatus Schltr. X, 205

\*- Robertsii Schltr. III, 320

\*Sarcolobus Beccarii Warb. III, 308 \*- quinquangularis Schltr. III, 309

\*- submucronatus Warb, III, 309 \*- Warburgii Schltr. III, 310

Sarcomphalus Taylori N. L. Britt. V, 180 Sarcopodium Iaurifolium Krzl. IX, 286 \*- stella silvae Loher et Kränzl. VII, 40

Sarcopyramis Bodinieri Lévl. IV, 95

Sarcostemma Decorsei Cost. et Gall. IV, 377

- implicatum Jum. et Perr, d. I. Bath. IX, 298, 539, X, 271

\*Sarcostoma celebicum Schltr. X, 66 \*Sarothrochilus Schtr. n. gen. III, 50 \*- Dawsonianum Schltr. III, 50

(Satureia Boissieri Briq, non Hausskn.) VI, 115

Calamintha [L.] Scheele subsp. ascendens var, ascendens Brig.) VIII, 460

— subsp. b. montana (Hoffgg. et Lnck) P. Cout. VIII, 460

(— Clinopodium Caruel) III, 284

(- Edmondi Briq.) VI, 115

— eugenioides (Gris.) Loes. III, 359 (— graeca L. subsp. longiflora Briq.) VI, 115

Kitaibelii Wierzb, f. aristata Vand.

(— longiflora Boiss, et Hausskn.) VI, 115

(— longiflora Presl) VI, 115 \*— macrosiphonia Bornm. VI, 114

(- Pitardii Bornm.) VI, 1 - pusilla Macl. IV, 138

- remota (Balf. fil.) Vierh. VII, 162

(- Sintenisii Bornm.) X, 472 - taurica Vel. 1, 135

vulgaris (L.) Fritsch var. \*origanodes Thell. III, 284

Satyrium morrumbalaense De Wild. III, 163

Saurauja aequatoriensis T. A. Spr. II, 124

Sauranja floribunda Benth. II, 124

pulchra T. A. Spr. II, 123
Schlimii T. A. Spr. II, 124
Sprucei T. A. Spr. II, 124

Sauroglossum tenue Lindl.) VII, 123 \*Saururus Cavaleriei Lévl. X, 149 Saussurea affinis Spreng. var. \*conferta

Lévl. et Vant. VIII, 451 (— alpina Rehb. f.) VIII, 364

— — DC. c. elata Vacc. VIII, 364

— a. Reichenbachii Vacc. VIII, 364 \*— Cavaleriei Lévl. et Vant. VIII, 401 — japonica DC. 9 dentata Kom. V, 278

 – η subtomentosa Kom. V, 279 \*- Kouytcheensis Lévl VIII, 452

\*— Leontopodium Lévl et Vant. VIII, 59

– sinuata Kom. V, 278

\*- Taquetii Lévl. et Vant. VIII, 169 - - var. \*paniculata Lévl. et Vant. VIII, 169

\*- triceps Lévl. et Vant. VIII, 169 \*— turgaiensis B. Fedtsch. VIII, 497

Saxifraga abchasica v. Otting. IX, 287 (- adscendens L. f. Linnaei Engl.)

— — var. scaposa Loj. Poj. VI, 35 — aizoon Jacq. B brachyphylla Shuttlew. VIII, 332

— — b. hirtifolia (Freyn) Hay. IX, 384 barbuloides Loj. Poj. VI, 35

× Bernardensis (S. superbiflora × Murithiana Vacc.) Vacc. VIII, 332

 biflora All. γ alba Vacc. VIII, 331 – β Chanousiana Vacc. VIII, 331

 form. uniflora E. Steig. III, 236 (- caespitosa ssp. decipiens Rony et Cam.) V, 365

(- - ssp. rosacea Moench) V, 364

— carinata v. Otting, IX, 144

 catalaunica R. Br. var. aitanica Pau III, 329

\*— Chaffanjoni Lévl. IX, 452 (— Cotyledon Cav.) III, 329

– crassifolia var. \*pacifica Kom. IX, 393

(— decipiens Ehrh.) V. 365

(— exarata Hook., non Vill.) VIII, 76

(- exilis Poll.) VÍ, 35

 groenlandica L. subsp. exaratoïdes Simm. VIII, 76

- var. uniflora (R. Br.) Simm. VIII, 75

×— Hayekiana (L. subbiflora × Murithiana Vacc.) Vacc. VIII, 332

 Hirculus L. var. propinqua (R. Br.) Simm. VIII, 75

Huteri Engl., non Ausserd. VIII, 332

(- lingulata Webb) III, 329 (— Linnaei Boiss.) VI, 35

(— mixta Lap.) VIII, 76 — odontophylla Piper VI, 172 Saxifraga oppositifolia L. c. alternifolia Vacc. VIII, 330

(- - f. alternifolia Engl.) VIII, 330 f. conferta Vacc. VIII, 331
e. grandiflora Vacc. VIII, 331

(-- var. grandiflora Engl.) VIII, 331 — -- d. mollis Vacc. VIII, 331

- porophylla Bert, subsp. Federici-Augusti (Bias.) Maire et Petitm. VI, 3

( - propingua R. Br.) VIII, 75 - Rocheliana Sternb. var. Bubákii

Rohl. 1, 26

— — var. \*rubescens Rohl. III, 147 - rotundifolia L. subsp. taygetea ([Boiss. et Heldr.] Engl.) Maire et Petitin, VI, 3

(— Rudolfiana Vacc., non Hornsch.)

VIII, 331

(— spuria Engl., non Kern.) VIII, 332 (- Sturmiana f. hirtifolia Freyn) IX, 384

(- taygetea Boiss. et Heldr.) VI, 3 ( — uniflora R. Br.) VIII, 75

Scabiosa calcicola Fr. Blonski I, 143 - Columbaria L. var. 2. nudicaulis

Mer. VIII, 288 – 1. integrifolia Mer. VIII, 288 \*- hololeuca Bornm. V, 166

 Krasani Hay. VI, 173 lacerifolia Hayata VI, 27 longicineta Pau VII, 85

\*XScaevola Blinii (S. Chamissoniana Gaud. X procera Hillebr.) Lévl. X, 150 - Chamissoniana Gaud. var. \*coeru-

lescens Lévl. X, 150 \* Fauriei Lévl. X, 150

\*Scandivepres Loes. nov gen. VIII, 292

\*— mexicanus Loes. VIII, 292 (Scandix australis Arc.) VII, 390

 $(--\beta$  ambiguus Rouy et Cam.) V, 206

bulgarica David. I, 126
curvirostris Murb. V, 206
Damascena Bornm. X, 468

(- hispanica Rostan) VII, 390 Boiss. var. cottiana Gola VII, 389 (- Pecten Veneris var. brevirostris

Tanf.) VII, 390 \*Scaphosepalum Pittierii Schltr. III, 78

\*Scaphyglottis brachiata Schtr. IX, 432

- Cogniauxiana De Wild. IV, 121 \* guatemalensis Schltr. II, 133

\* - pauciflora Schltr. III, 47 \*- subulata Schltr. VIII, 454

\*Scelochilus brevis Schltr. X, 385, 391

\*- Langlassei Schltr. VIII, 572 \* Türckheimii Schltr. X, 252 (Sceura marina Forsk.) VII, 162

Schaefferia cuneifolia Gray VIII, 295

\*— serrata Loes. I, 162 Schefflera Bailloni Vig. VI, 47 - Bojeri (Seem.) Vig. VI, 46

\*— Sarasinorum Harms III, 23

168 Index specierum \*Schiedeophytum Wolff, nov. gen. IX, 419 \*- fallax Wolff IX, 420 VI, 75 Schinus dependens Ortega var. tomentosa Fries VI, 204 Schismus arabicus Nees var. violaceus II, 101 Muschl. VIII, 301 \*Schizachne Hack. nov. gen. VII, 332 \*- Fauriei Hack. VII, 323 Schizandra Henryi C. B. Cl. IV, 172 \*-- hypoglauca Lévl. IX, 459 Schizopepon bryoniaefolius Max. var.  $\beta$  paniculata Kom. V, 274 Schizomeryta nov. gen. Vig. VI, 48 — schizolaena (Baill.) Vig. VI, 48 Schizophragma Fauriei Hay. VI, 195 Schkuhria pusilla Wedd. var. aristata R. E. Fr. III, 298 (Schmaltzia Ashei Small) IV, 312 (Schmidelia Cobbe Wight) VIII, 185 (- glabra [non Roxb.] Hook, f. et Thoms.) VIII, 186 minutiflora Mattei IX, 346 (- serrata [non DC.] Wight) VIII, 185 Schoenus nitens Poir. var. major Ewart IX, 176 Sciaphila aneitensis Hemsl. VI, 17 IV, 119 - Clemensae Hemsl. V, 265 Scilla cilicica Siehe VIII, 380 - Radkae David. I, 127 Scirpus alpinus (L.) D. T. et Sarnth. III, 142 (- alpinus Schleich.) III, 142 - atrichus (Palla) D. T. et Sarnth. (- australis L.) VII, 208 Brittonianus Piper VI, 75 (- campestris Britt.) VI, 75 ( - compactus Kr.) VII, 209 VII, 386 (- cyperoides L.) VIII, 93 - filiformis Reich.) VII, 208 - glaucus Sni.) VII, 208 hakonensis Franch. et Sav.) VI, 287 hemiuncialis C. B. Cl. III, 162 Holoschoenus L. var. australis (L.) VII, 86 Husn. VII, 208 — — ssp. globiferus L. var. macrostachyus Husn. VII, 209 - var. romanus (L.) Husn. VII, 208
- lacustris L. var. Tabernaemontani (Gm.) Husn. VII, 208
(- macrostachys Willd.) VII, 209

Husn. VII, 209

(- Onoei Franch, et Sav.) VI, 287

(- Parlatoris Biv.) VII, 209

(- petasatus Max.) VI, 287 - pseudofluitans Mak. VI, 289

VII, 209

VII, 387

(Scirpus robustus var. campestris Fern.) (- romanus L.) VII, 208 - setaceus L. f. stolonifera Semler ( - Tabernaemontani Gm.) VII, 208 (- trichophorum A. et Gr.) III, 142 (- Wichurai Franch. et Sav.) VI, 287 - yokuhamensis O. Ktze.) VI, 287 Scleranthus alpestris Hay. VII, 34 Sclerochloa festuciformis Rendle et Britten VIII, 437 (- procumbens Beauv.) VIII, 437 rupestris Rendle et Britten VIII, 437 Sclerolobium paniculatum Vog. var. \*polyphyllum Hassl. VIII, 131 (Sclerostylis trifoliata Bl.) VII, 10 Scolosanthus Bahamensis Britt, V, 185 (Scoparia annua Pringl.) IV, 117
— divaricata R. E. Fr. IV, 116
(— eriacea Gris.) IV, 116, 119
— excelsa R. E. Fr. IV, 118
(— flava Ch. et Schldl.) IV, 119 ( - - var. pinnatifida (Cham. et Schldl.) Schmidt) IV, 119 - mexicana R. E. Fr. IV, 117 — montevidensis (Spreng.) R. E. Fr. – var. glandulifera (Fritsch) R. E. Fr. IV, 119 — neglecta R. E. Fr. IV, 119 - - var. intermedia R. E. Fr. IV, 119 nudicaulis Chod, subsp. praedensa R. E. Fr. IV, 116 (— pinnatifida Benth.) IV, 119 (Scopolia sinensis Hemsl.) VII, 167 — tangutica Max.) VII, 167 Scorzonera hieracifolia Hay. VI, 149 - laciniata var. integerrima V. Cal. — purpurea Boiss, subsp. rhodantha (Hausskn.) Maire et Petitm. VI, 4 (— rhodantha Hausskn.) VI, 4 (Scrophularia alata A. Gr.) V, 273 — alpestris Gay var. fimbriata Pau — auriculata L. var. 3. microcarpa Mer. VII, 363 (- Bourgaeana Lge.) VIII, 218 – canina ssp. Hoppii  $\delta$  crithmifolia Pau VII, 86 — — α genuina Pau VII, 86 - maritimus L. var. compactus (Kr.)  $---\beta$  provincialis (Rouy) Pau VII, 86 - var. macrostachys (Willd.) Husn. — — γ pyrenaica Pau VII, 86 - confusa Menez. V, 213 - - ssp. genuina Menez. V, 213 - - var.  $\beta$  latifolia Menez. V, 214 - - var.  $\alpha$  typica Menez. V, 214 - riparius L. var. nanus F. M. Reader – subsp. vestita Menez. V, 214 (- crithmifolia Boiss.) VII, 86

Scrophularia ebulfoilia Hoffgg. et Lk. var. y Schmitzii (Rouy) P. Cout. VIII, 219

- var.  $\beta$  Schousboei (Lge.) P.

Cout. VIII, 218

- elata Grec. X, 216 \*- fruticosa Bornm. VII, 203

Grayana Kom. V, 273 (- Herminii Henriq.) VIII, 218

— Herminii Hoffgg. et Lk. var.  $\beta$ Bourgaeana (Lge.) P. Cout. VIII, 218 - heterophylla Willd. subsp. laciniata (W. et K.) Maire et Petitmeng. var. poetarum Maire et Petitmeng. VI, 5

(— hirta Benth.) IV, 44; V, 214 (— hirta Lowe) V, 214

— var. ambigua Menez. IV, 44  $(--\beta)$  ambigua Menez.) V, 214

- - ssp. Il ambigua Menez. V. 214 — — var. α ambigua Menez. V. 215

- - var.  $\beta$  propingua Menez. V,

- - subsp. 1. hirta Menez. V, 214 — Hoppii K. var. crithmifolia (Boiss.) f. pyrenaica Pau VII, 86

(- longifolia Benth.) V, 215

— — var. γ angustifolia Menez. V, 216

— — var.  $\alpha$  genuina Menez. V, 215 \_ \_ \_ subvar. 4. Johnsoniana Menez. V, 215

— — subvar. 2. latifolia Menez. V, 215

 subvar. 3. nemoralis Menez. V, 215

— — subvar. 1. typica Menez. V, 215

— — var.  $\delta$  insolita Menez. V, 216

— var. β intermedia Menez. V, 216

 – var. ε intricata Menez. V, 216 - Maderensis Menez.) IV, 43

(- Menezii Gdgr.) V, 214 Moniziana Menez. IV, 43

(- oblonga Lowe) V, 216 - oblongifolia Mer. VII, 364

- palescens Lowe IV, 43 - Paui Mer. VII, 364

(- provincialis Rouy) VII, 86 \*- rimarum Bornm. VII, 202

– α \*farinea Bornm, VII, 202

 – β glabrescens Bornm. VII, 202 - γ (?) \*pubescens Bornni. VII,

203 (- Schmitzii Rouy) VIII, 219

- Schousboei Lge.) VIII, 218 - Scopolii Hpe. f. adenantha Vand. IX, 533

- - var. Kindtii Maly VII, 186

Scrophularia Scorodonia L var. 3. parvifolia Mer. VII, 363

– var. 2. verticillata Mer. VII, 363

(- Smithii Menez.) V, 213

×— spuria (Scr. hirta × Scorodonia) Menez. V, 125

stiriaca Rech. III, 334

Scutellaria adenostegia Briq. VI, 66 - alpina L. var. labalambrensis Pau VIII, 136

angustrolia Kom. V, 272

\*- Cavaleiei Lévl. et Vant. VIII, 402

\*- Delavayi Lévi IX, 221 \*- dentata Lévi. IX, 246

Drummondii Benth. VIII, 308
\*- Esquirolii Lévl. et Vant. VIII, 402

\*- Fauriei Lévl. et Vant. VIII, 401 \*- Ferriei Lévl. IX, 246

\*- Franchetiana Lévl. IX, 221 ( – galericulata γ angustifolia) Regel

V, 272 - f. hirta (Schmidt) Koidz, IX, 136

- - f. uberrima C. G. Westerld. IV. 17

\*- glechomaefolia Lévi. et Vant. VIII, 401

\*- Îrypericifolia Lévl. IX, 221 - indica L. var. \*stolonifera Vant. V, 100

\*- Komarovii Lévl. et Vant. VIII, 402

- longiflora Small III, 292 moniliorrhiza Kom. V, 272

\*- multibrachiata Lévl. et Vant. VIII, 402

- orientalis L. var. mollis Briq. VI, 65

- Paulsenii Briq. VI, 65 - rumicifolia Kunth VIII, 308

(- scordifolia var. hirta Fr. Schmidt) IX, 136

- - var. \*obtusifolia Lèvl. VIII, 280 – α subglabrata Kom. V, 272

\*- Taquetii Lévl. et Vant. VIII, 402

\*- yunnanensis Lévl. IX, 221

Scutinanthe Boerlagii Hochr. VII, 13 Scytopetalum brevipes (Pierre mss.) v. Tiegh. V, 120

( - Duchesnei Engl.) V, 119

- Klaineanum (Pierre mss.) v. Tiegh. V, 119

- latifolium v. Tiegh. V, 119

- Pierreanum (De Wildem.) v. Tiegh. V. 120

\*Sebastiania graciliramea Pax et Hoffm. VIII, 162

(Secale cereale aestivum Werkow.) III, 141

( – – hibernum Keil) III, 141

Secamone alba Jum. et P. d. l. Bath. IX, 300, 538, 539

brachystigma Jum et P. d. l. Bath.

IX, 299, 538, 539

- cristata Jum. et. P. d. I. Bath. IX, 301, 538, 529

Secamoue deflexa Jum. et P. d. l. Bath. IX, 299, 538, 539 - Geavi Cost. et Gall. IV, 378 - pachyphylla Jum. et P. d. l. Bath. IX. 299, 300 - pachystigma Jum. et P. d. l. Bath. IX, 538, 539 petiolata Jum. et P. d. I. Bath. IX, 300, 538, 539 Secamonopsis madagascariensis Jum. VIII, 251 Securidaca amazonica Chod. II, 125 Sedum album L. subsp. athoum (DC.) Maire et Petitm. VI, 3 ( - - var. brevifolium Boiss.) VI, 3 - alpestre Vill. var. Horákii Rohl. I, 36 (- annuum Boiss.) VIII, 134 – L. var. nevadense Pau VIII, 134 (- athoum DC.) VI, 3 - Bergeri R. Hamet IX, 41 - Bodinieri Lévl. et Vant. VI, 372 - caerulans Lévl. et Vant. VI, 372 - caespitosum DC.) X, 290 \* - Cavaleriei Lévl. V, 100 - Cepaea L. var. glabrum Vand. IX, 526 \*- Chaneti Lévl. V, 99 - Costantini R. Hamet IX, 42 (- Ewersii Ledeb.) X, 290 - definitum Lévl. VI, 373 - Ducis Aprutii Cort. VI, 191 \*- Esquirolii Lévl. V, 99 \*- Feddei R. Hamet VIII, 25 \*- Gagei R. Hamet VIII, 25 \*- Giajai R. Hamet VIII, 313 japonica Sieb. var. senanensis (Mak.) Mak. VI, 290 (- Iaxiflorum DC.) III, 26 \*- Leblancae R. Hamet VIII, 311 \*- Margaritae Hamet VIII, 142 \*- Mariae Hamet VIII, 143 \*- Martini Lévl. V, 99 - Moroti R. Hamet IX, 43 - Pekinense Lévl. et Vant. VI, 373 - phyllanthum Lèvl. et Vant. VI, 373 \*- rubrum (L.) Thell. X, 290 \*- Schoenlandi R. Hamet VIII, 265 \*- Susannae R. Hamet VIII, 24 \* - Woronowi R. Hamet VIII, 315 \*- Yvesi R. Hamet VIII, 27 Seemannaralia nov. gen. Vigu. VI, 46 - Gerrardii (Seem.) Vigu. VI, 46 Seguiera affinis Heim. VI, 79 \*- Alberti H. Walt. VIII, 79 elliptica Fries VI, 206 \*Selaginella Bacanii Hieron. X, 43 \*— banajavensis Hieron. X, 45 \*- Brausei Hieron, X, 41 \*- Christii Lévl. IX, 451 \*- Copelandii Hieron, X, 106 \*- Elmeri Hieron. X, 46

\*Selaginella fallax Hieron, X, 104 \*— Fénixii Hieron. X, 98 \*— Gregoryi Hieron. X, 102 \*- halconensis Hieron. X, 108 \*— infantensis Hieron, X, 111 Kochii Hieron, VIII, 151 \*- Kouytcheensis Levl. IX, 451 \*- leytensis Hieron. X, 42 \*- Meyenii Hieron, X, 50 \*- Neei Hieron, X, 48 \*- paraguana Hieron. X, 109 \*- Quadrasii Hieron. X, 114 \*- Ramosii Hieron. X, 52 \*- Sancti Antonii Hieron, X, 100 \*- sibuyanensis Hieron. X, 97 \*- Toppingii Hieron, X, 112 Selago swaziensis Rolfe VII, 156 \*Selliguea coraiensis Christ V, 11 Semecarpus rostrata Val. V, 383; IX, 307 \*Semonvillea sol H. Walt. VIII, 57 (Sempervivum agriostachys O. Ktze.) (- Braunii Funk) IX, 383 (- fimbriatum Pach.) IX, 384 (- Funkii Maly) IX, 383 (- Hillebrandtii Schott) IX, 384 hirtum Juslen & Hillebrandtii (Schott) Hay. IX, 384 (— montanum Maly) IX, 383 ×- noricum (S. arachnoideum × stiriacum v. Wettst.) Hay. IX, 384 × Pernhofferi (S. stiriacum × Wulfenii v. Wettst.) Hay. IX, 383 - stiriacum v. Wettst. IX, 383 — β Braunii (Funk) v. Wettst. IX, 383 (Senecillis Schmidtii Maxim.) V, 277 Senecio Alboffianus Macl. IV, 140 (- andinus Nutt.) VIII, 274 appendiculatus Sch. Bip. var. ε viridis Pitard IX, 277 argyrotrichus Dus. VII, 222 \*- Blinii Lévl. VIII, 138 Bomani R. E. Fr. III, 252 \*- Esquirolii Lévl. X, 352 (- cordatus Nutt.) VIII. 274 - coreopsoides Chiov. VI, 181 \*- crassipes Lévl. et Vant. VI, 331 - crepidineus Greene V, 399 ( - dahuricus var. kamtschaticus Max.) IX, 136 Danyausii Homb. et pinnatifidus Macl. IV, 140 Jacq. var. dileptiifolius Greene VI, 30 - Ducis Aprutii Chiov. VI, 182 - ductoris Piper VIII, 274 - Dusenii O. Hoffm. IV, 140 - exaltatus var. ochraceus Piper VIII, 274 - fastigiatus var. Macounii (Greene) Greenm. VIII, 273 \*- Fauriei Lévl. VIII, 139

\*Senecio ficariifolius Lévl. et Vant. VIII. 359

(- filifolius var. Fremontii T. et Gr.) VIII, 274

- fraternus Piper VIII, 273 (- Fremontii T. et Gr.) VIII, 274

(- fulgens Rydb., non Nichols.) IX, 486 gallicus Chaix β maritimus Samp.

IV. 383

- Harfordii Greenm. VIII, 272

Hatcherianus O. Hoffm. IV, 140

- Hermosae Pit. IX, 277

- icoglossoïdes Arech. IX, 415

 icoglossus DC. var. montanus Dus. VII, 221

- imberbis R. et Sch. f. flaviseta Hack. IV, 274

— var. purpurascens (H. B. K.) Hack. IV, 307 - incanus L. var. \*flosculosus Gave V, 195

(? - integrifolius Hook.) X, 512

– (L.) Crairv. var. Lindstroemii

C. H. Ostenf. X, 512

— Itatiaiae Dus. VII, 221

( - lanceolatus T. et Gr.) VIII, 274

- leiantha Hack. IV, 274

— f. subhirsuta Hack. IV, 308

— Ieucanthemifolius Poir. var. \( \beta \) Cyrenaicus Dur, et Barr, IX, 467

 Ligularia var. (?) polycephalus Hemsl. IV, 173

lividus L. f. α minor Mer. VIII, 65

 f. β ramosus Mer. VIII, 65 \*- longeligulatus Lévl. et Vant. VIII, 139

(- lugens var. ochroleucus A. Gr.) VIII, 274

(- Macounii Greene) VIII, 273

- magellanensis (Phil.) Macl. IV, 141 - magellanicus Phil. (non Hook. et Arn.) IV, 141

- malacophyllus Dus. VII, 221 maritimus (L) Koidz. IX, 137

Mattirolii Chiov. VI, 182

nebrodensis × viscosus Sylv. VII, 190

— — × vulgaris Sylv. VII, 190 — nemoralis Dus. VII, 222

\*-- nudibasis Lévl. et Vant. VI, 331

- oreophilus Dus. VII, 222 \*- Pampae Lingelsh. VIII, 6

 var. penicillatus Lingelsh. VIII, 6 - pauciflorus subsp. fallax Greenm. VIII, 273

\*- petasitioides Lévl. VIII, 360

Pirottae Chiov. VI, 181

— — var. infundibuliferus Chiov. VI, 182

ponticus Grec. X, 215

- prionophyllus Greene V, 399 (— pseudo-arnica Less.) IX, 137

(Senecio purpurascens H. B. K.) IV, 308 Purshianus Nutt. var. viridescens

J. Lun. IX, 399

- Roccatii Chiov. VI, 183

\*- rosulifer Lévl. et Vant. VIII, 359

- Rydbergii A. Nels. IX, 486 (-- Schmidtii Franch.) V, 277

(- serra var. integriusculus A. Fr.) VIII,

— — var. lanceolatus (Torr. et Gr.) Piper VIII, 274

setosa P. de Beauv. var. interrupta
 Stuck, IV, 274

– f. leianthina Hack. IV, 308

- f. microstachya Hack. IV, 308 - splendens Lévl. et Vant. VIII, 139

subnemoralis Dus. VII, 222
subvestitus How.) VIII, 274

 tacuaremboense Arech. IX, 415 \*— Taquetii Lévl. et Vant. VIII, 139

- thermarum Bol. VII, 130

— triangularis var. subvestitus (How.) Greenm. VIII, 274

Vaseyi Greenni. VIII, 273
Veitchianus Hemsl. IV, 173

\*- velutinus Lévl. et Vant. VI, 331, VIII, 401

- viridis Phil. var. radiatus R. E. Fr. III, 298

- vulgaris L. f. dealbatus Thell. X, 221

Wilsonianus Hemsl. IV, 173
Serapias africana (Rendle) Eat. VI, 44
Austinae (A. Gr.) Eat. VI, 44

— chloidophylla (Reichb. f.) Eat. VI, 44

— consimilis (Don) Eat. VI, 44 (- cordigera L.) VI, 44

- cucullata (Boiss, et Heldr, Eat. VI, 44

- gigantea (Dougl.) Eat. VI, 44 - kurdica (Bornm.) Eat. VI, 44

(— Lingua L.) VI, 44

 $- - \alpha$  typica f. humilis Terracc. VIII, 493

longibracteata (Bl.) Eat. VI, 44

(- longipetala Poll.) VI, 44 - neglecta De Not.) VI, 44

(- parviflora Parl.) VI, 44 - sessilifolia (Peterm.) Eat. VI, 44

- somaliensis (Rolfe) Eat. VI, 44 Serapiastrum cordigerum (L.) Eat. VI, 44

- Lingua (L.) Eat. VI, 44

 longipetalum (Ten.) Eat. VI, 44 - neglectum (De Not.) Eat. VI, 44

- parviflorum (Parl.) Eat. VI, 44

Serjania caracasana Willd. f. \*flavo-viridis Radlk. VII, 355

 confertiflora Radlk.var.dasycephala Radlk. f. 1. \*glabriuscula Radlk. VIII, 72

– f. 2. \*subincana Radlk. VIII, 72

\*- eriocarpa Radlk. VIII, 71 \*- humifusa Radlk. VII, 355

Seranja incana Radlk. f. 1. \*genuina Radik. VIII, 72

 f, 2. \*glabriuscula Radlk. VIII, 72 \*Serratula Chanetii Lévl. X, 351

- flavescens L. var. carthaginensis Pau III, 327

\*- lasiocephala Bornm. V, 167

- radiata M. B. var. Cetinjensis Rohl. I, 36

Sesamum alatum Thonn. var. sambesiacum Schinz VI, 167

Sesbania tetragona Pamp. VIII, 351 (Seseli leucocoleum Stapf et Wettst.)

IX, 142 — Tommasinii Reichb. f. var. typica Cal. IX, 494

- - var. latiuscula Cal. IX, 494

- varium Tev. var, \*longicarpum Rolıl. III, 146

Sesleria insularis S. Somm. II, 176

 spaerocephala Ard var. c. reducta Bolz. IX, 187

Setaria commutata (Scribn.) Hack. IV, 307

\*- discolor Hack. VII, 371

 gracilis H. B. K. f. \*pilosissima Hack, VII, 372

- Hassleri Hack, var. aequalis Hack. IV, 307

– Liebmanni Fourn. f. \*trichorhachis

Hack. VIII, 46

- paucifolia Lindm. var. \*planifolia Hack. VI, 342

- scandens Schrad. var. \*sphacelata Hack. VII, 372

(- vulpina Beauv.) V, 67 (Sethia acuminata Arn.) VII, 16

Seychellaria W. R. Hemsl. nov. gen. VI, 16

- Thomassetii W. B. Hemsl. VI, 16 Shepherdia canadensis Nut. f. xanthocarpa Rehd. VII, 360

Sherardia arvensis V. f. argentina Hick. VIII, 352

– var. littoralis Conill VIII, 32 Sicyos aculeatus R. E. Fr. IV, 203 \*- Fauriei Lévl. X, 150

(Sida acerifolia Lag.) III, 90

 acuminata DC. var. α \*genuina (DC.) Hassi. VIII, 37

- - f. \*intermedia Hassl. VIII, 37

– var. β\*grandiflora Hassl. VIII,37

 – var. γ \*Rojasii (Hassl.) VIII, 37 ( - amplexicaulis Vell.) IX, 476

( – amplissima L.) IX, 491

(- argentina Chod. et Hassl. hand. K. Sch.) VIII, 119

( - argentina K. Sch. vara. paraguyensis E. Ulbr.) VIII, 119

 sect. Bastardiopsis K. Schn, VIII, 40 (- callimorpha Hochr.) IX, 479

\*- camporum Hassl. VIII, 119 \*- confusa Hassl. VIII. 119, 289 (Sida contracta Link) IX, 505 - densiflora H. et A.) VIII. 42 (- dictyocarpa Morong., non Gris.)

IX, 479

(- discissa Bertol.) III, 90 (- divergens Gris.) IX, 486

esperanzae R. E. Fr. IV, 106 (- glechomaefolia Dietr.) IX, 512

\* gracillima Hassl. VIII, 35

 hastata St. Hil var. β glabriuscula R. E. Fr. VIII, 390

 – var. α tomentosa R. E. Fr. VIII, 390

(- Hermanniae Dietr.) IX, 491

( - hernandioides l'Hérit.) IX, 491 (- heterosperma Hochst.) IX, 491

(- laxiflora Steud.) IX, 491 (- Lechenaultiana DC.) IX, 505

(- leucanthema Dietr.) IX, 506 - linifolia Cav. var. latifolia Hochr. III, 169

(- Luciana DC.) IX, 505

(- Martiana St. Hil. var. viscosissima Hassl. f. latifolia Hassl.) VIII, 119 \*- melanocaulon Hassl. VIII, 34

 montana K. Sch. subsp. \*camporum Hassl. VIII, 38

— — var. c. \*breviaristata Hassl. VIII, 39

- - - - f.  $\beta$  \*angustifolia Hassl. VIII, 39

 f. α \*duplicipila Hassl. - - -VIII, 39

var. b. \*intermedia Hassl. VIII, 39

 – – var. a. \*longearistata Hassl. VIII, 39

- - - - f.  $\alpha$  \*multicrena (Hochr.) Hassl. VIII. 39

– – – – subf. ovatifolia Hassl. VIII, 39

- - - f.  $\beta$  ovatifolia Hassl. VIII, 39

- - - var. d. submutica Hassl. VIII, 40

- - - f.  $\beta$  pseudorhombifolia Hassl. VIII, 40

- - - - f.  $\alpha$  Regnellii (R. E. Fr.) Hassl. VIII, 40

\*- oahuensis Lévl. X, 120

(- palmata Fl. mex. apud Dc.) III, 90

(- pauciflora Dietr.) IX, 491 (- periplocifolia Sw.) IX, 491

( – periplocifolia β L.) IX, 491

 $(-- var. \beta caribaea DC.)$  IX, 491

(- polyantha Schldl.) IX, 491

 potentilloides St. Hil. subsp. \*elata Hassi. VIII, 38 – pseudocymbalaria Hassl. VIII, 36

\*- var. \*parviflora Hassl. VIII, 36

(Sida Regnellii R. E. Fr. VIII, 40, 389 – Rojasii Hassl.) VIII, 37

(- rostrata Schum. et Thonn.) IX, 491 ( - rubifolia St. Hil. subsp. pseudo-cymbalaria Hassl.) VIII, 36

samoënsis Rech. IV, 228 (- spicata Salzm.) IX, 476

(- spiciflora DC.) IX, 476

(— spinifex Fl. mex. apud Dc.) III, 90 (— stellata Cav.) IX, 491 — tuberculata R. E. Fr. VIII, 388

\*- Zahlbruckneri Rech. IV, 228 Sidalcea sylvestris Nels. V, 217 Sideritis ciliata Thbg. var. \*Mokpoensis

Vant. VIII, 450

(- - var. mokpoensis Vant.) IX, 248 (- glacialis Boiss.) VIII, 136

(- hirsuta Gouan) X, 290 (- hirsuta L.) X, 290

 hyssopifolia L. var. glacialis (Boiss.) Pau VIII, 136

- Ilañezi Pau III, 326

 montana L. subsp. tunetana Murb. V, 211

(- scordioides var. Boissieri Webb) VIII, 136

(- scordioides var. vestita Boiss.) VIII, 136

(- vestita Boiss.) VIII, 136

Sideroxylon rubrocostatum Jum. et P. d. l. Bath. VIII, 201

\*Siegesbeckia Esquirolii Lévl. et Vant. VIII, 59

- Filarszkyi Pit. IX, 276

(Sieglingia paraguayensis O. Ktze.) IV,

Sieversia ciliata (Pursh) Piper VII, 215 Sieversia scapoidea A. Nels. IX, 483 \*Sigmatostalix guatemalensis Schltr. X,

\*- pusilla Schltr. X, 392 (Silene acaulis Strobl) VII, 36

– L. ssp. B. longiscapa (A. Kern) Hay. VII, 36

 $(--\gamma)$  pedunculosa Rchb.) VII, 36

 $(--\beta)$  vulgaris Rchb.) VII, 36

angustifolia (Miller) Guss. X, 290

(— annulata Thoré) VII, 36 (— articulata Viv.) IX, 350

 Aucheriana Boiss, var. angustifolia Litw. VI, 102

- Barrattei Murb. V, 202

\*- Bodinieri Lévl. X, 350

– Boryi Boiss, var.  $\delta$  longifolia Pau VIII, 133

 – var. β Ramburiana (Webb.) Pau VIII, 133

– var. γ Thackeri Pau VIII, 133

- clavaeformis Litw. VI, 102

 colorata Poir. var. γ Cyrenaica Dur. et Barr. IX, 350

Silene colorata var. monticola Murb. V. 202

(— cretica  $\beta$  annulata Rchrb.) VII, 36 — — ssp. annulata (Thoré) Hay. VII, 36

- crispans Litw. VI, 103

(- crypthantha Viv.) IX, 350 (- Cucubalus Wibel) VIII, 436

densiflora Urv. ssp. macroclada
 (Boiss.) Hand.-Mzt. X, 305

(-- var. macroclada Boiss.) X, 305 dichotoma Ehrh, α parviflora Cho-

roschkov VIII, 226 - excapa All b. caulescens Vacc. VIII, 328

\*- Fauriei Lévl. et Vant. VII, 200

- Frivaldskyana Hampe f. purpurascens Vand. IX, 525

(- fruticulosa Pančić) III, 57

 Gallica L. var. β articulata Dur. et Barr. IX, 350

— gaudanensis Litw. VI, 103

(— inaperta Maly) VII, 36 — laeta (Ait.) A. Br. var. Loiseleurii (Gren. et Godr.) Rouy subvar. elatior Brigu. III. 122

- latifolia Rendle et Britten VIII, 436

(- longiscapa A. Kern.) VII, 36 -- Lotriensis Grec. X, 214

maritima With. f. gracilis Almqv. IX, 143

(- Nicaeensis Bonn. & Barr.) V, 202 - nutans L. b.) pygmaea Vacc. VIII, 328

- Otites L. var. Baldaccii Rohl. I, 34 - pseudo-cinerea Loj. Poj. V, 24

(- Ramburiana Webb.) VIII, 133 (- rubella Suffren) VII, 36

Sabinosae Pit. IX, 208

 Schimperiana Boiss. var. latifolia Litw. VI, 103

- Serbica Adam. et Vierh. III, 57

 succulenta Forsk, var. β cryptantha (Viv.) Dur. et Barr. IX, 350

\*- Taquetii Lévl. X, 350 - Taygetea Hal. III, 57

(- vulgaris [Mönch] Garcke.) X, 290 Siler trilobum Scop. var. triste Rohl.

Silphium Reverchoni B. F. Bush IV, 216 Silvorchis nov. gen. Sm. V, 289

- colorata Sm. V, 290

Simaba glabra Engl. subsp. \*trijuga Hassl. X, 347

 – var. α \*emarginata Hassl. X, 347 - - var. inaequilatera Hassl. X, 347

Simbuleta bellidifolia (L.) Aschers. et Schweinf. var.  $\beta$  lusitanica (Jord. et

Fourr.) P. Cout. VIII, 218 (Sinapis nigra L.) VIII, 544 (- nudicaulis Lag.) VI, 382

(- peckinensis Lour.) VIII, 488

(Sinapis procumbens Poir.) VIII, 544 pubescens L. var. glabra Loj. Poj. 111, 333 Sinofranchetia nov. gen. Hemsl. V, 343 - chinensis Hemsl. V, 343 Sinowilsonia nov. gen. Hemsl. V, 265

— Henryi Hemsl. V, 265 Sipanea acinifolia Spruce II, 140 \*Siparuna calocarpa Perk. I, 153 (- guianensis Aubl.) I, 156 pyricarpa [Ruiz et Pav.] Perk.) I, 155 \*- sauraujifolia Perk. I, 155 (- tomentosa [Ruiz et Pav.] Perk. I, 155 \*- umbelliflora Perk. l, 153 \*- Weberbaueri Perk. I, 154 (Sisymbrium Alliaria Scop.) VIII, 321, 436 (- amplexicaule Desf.) VIII, 544 (- arenosum L.) VIII, 321 - asperum L. var. minus Lamb. VIII, 322 - Briquettii Pit. IX, 207 erysimoides Desf. var. β arenarium Pit. 1X, 207 (- Huetii Boiss.) IX, 133 millefolium Jacq. Ait. var. α genuina Pit. IX, 207 — var. γ macrocarpa Pit. IX, 207 (- monenoe Cav.) VI, 382 ( — myriophyllum H. B. K.) IV, 24 (- nebrodense Poir.) V, 89 (- officinale Scop.) VIII, 544 - orientale L. var. subhastatum (Willd.) Thell. V, 363 pinnatifidum DC. var. heterophyllum (Bory) Pau VIII, 132 (- polyceratium Scop.) VIII, 544 - sinapistrum Crantz var. ucrainicum Blonski VI, 30 Sisyrinchium birameum Piper VI, 78 trichanthum Dus. VII, 263 (- Sitanion Leckenbyi Piper) VI, 75 Sloanea Kappleriana Pulle III, 288 \*Smelowskia mongolica Kom. IX, 393 (Smilacina racemosa var. brachystyla Henders.) VI, 78 \*Smilax Dunniana Lévl. IX, 446 \*- Lyi Lévl. VIII, 171 \*— perulata Lévl. et Vant. IX, 78 \*— Taquetii Lévl. X, 372 \*Sobralia pleiantha Schltr. III, 79 \*- rupicola Kränzl. VI, 21

\*- Weberbaueriana Kränzl. I, 188 Solanum anodontum Lévl. et Vant. VI, 126 argenteum Dun. var. lepidocarpum Dus. VII, 264 Arundo Mattei IX, 348 \*— atricoeruleum Bitt. X, 563 - Aubletii Pulle III, 290 \*- Bangii Bitt. X, 552 \*- bijugum Bitt. X, 533 \*- Buchtienii Bitt. X, 558

\*Solanum chimborazense Bitt, et Sodiro X, 539 \*- cochabambense Bitt. X, 553 \*- coerulescens Bitt. X, 554 - coerulescens Bitt. var. \*manophyes Bitt. X, 554 — — var. \*pycnophyes Bitt. X, 554 - Commersonii Dun, var. \*pseudostipulatum Hassl. IX, 116 — didymacanthum Millsp. VII, 286 Dunalianum var. \*lanceolatum Wit. V, 166 \*- Dunnianum Lévl. IX, 324 \*- extuspellitum Bitt. X, 555 - - ssp. subcoeruleum Bitt. X, 556 \* - Fauriei Lévl. X, 152 \*- Fiebrigii Bitt. X, 556 \*- florulentum Bitt. X, 544 - grandiflorum R, et P. var. \*macrocarpum Hassl. IX, 118 \*- grossularia Bitt. X, 537 — — subsp. \*protoxanthum Bitt. X, 538 — — var. \*subunijugum Bitt. X, 538 guaraniticum Hassl, IX, 115 -- - var. \*angustisectum Hassl. IX, 115 – var. \*latisectum Hassl. IX, 115 — — f. \*glabrescens Hassl. IX, 115 — — f. \*pilosula Hassl. IX, 116 \*— hypopsilum Bitt. X, 543 \*— insulae solis Bitt. X, 563 \*— irenaeum Bitt. X, 551 Juciri Mart. f. \*paraguariense Hassl. IX, 118 \*- juvenale Thell. V, 161 \*— kifinikense Bitt. X, 545 — Lacerdae Dus. VII, 225 \*— Lehmannianum Bitt X, 532 \*- longiconicum Bitt, X, 534 \*- medianiviolaceum Bitt. X, 562 \*- megistacrolobum X, 536 \*- microdontum Bitt. X, 535 \*— minutibaccatum Bitt. X, 549 \*— molliusculum Bitt. X, 546 — multispinum N. E. Br. var. \*grandiflorum Hassl. IX, 117 \*- nanum Bitt. X, 564 Neves Armondii Dus. VII, 263 nodiflorum Jacq. var. \*microphyllum Hassl. IX, 118 \* - olympicum Hassl. IX, 116 \*— ornans Witas. V, 165 \*— pachyarthrotrichum Bitt. X, 542 - pallidum Rusby X, 560 (- paraguariense Chod.) IX, 117 \*- patameense Witas. V, 163 \*- var. grandifolium V, 164 \*— – var. parvifolium V, 164 \*— pentagonocalyx Bitt. X, 544

\*- pichinchense Bitt. et Sod. X. 533 \*- polytrichostylum Bitt. X, 550

\*- Rechingeri Witas. V, 163

\*Solanum savaiense Witas. V, 163 \*- scotinonectarium Bitt. X, 560 \*- sinuatiexcisum Bitt. X, 558 \*- Sodiroi Bitt. X, 540 (- sodomaeum Coste) V, 161 \*- subauriferum Bitt. X, 559 \*— subuniflorum Bitt. X, 546 \*— tarderemotum Bitt. X, 547 \*— trachycarpum Bitt. et Sod. X, 541 upolense Witas. V, 164
var. \*paraguariense (Chod.) Hassl, IX, 117 - villaricense Morong, var, \*typicum Hassl. IX, 117 \*- violaceistriatum Bitt. X, 550 - violaceum R. Br. var. album Maid. et Betch. V, 56 \*Solenocentrum Schltr. IX, 163 - costaricense Schltr. IX, 163 \*Solfia Rech. nov. gen. IV, 232 \*- samoëensis Rech. IV, 232 Solidago chrysolepis Fern. VII, 335 \*-- duriuscula Greene VII, 196 (— lapponica With.) VIII, 183 (— minuta L.) VIII, 183 (— Virgaurea var. alpestris Boiss.) VIII, 135 (- -- var. alpestris Reichb.) VIII, 183 (-- var. arctica Hartm.) VIII, 183 (-- var. cambrica DC.) VIII, 183 — — var. granatensis Pau VIII, 135 – var. incana Vand. IX, 527 — — var. minuta (L.) Simm. VIII, 183 – – var. \*Taquetii Lévl. VIII, 141 (-- "forme" alpicola Rouy) VIII, 183 (-- "forme" Hartmanniana Rouy) VIII. 183 (-- "forme" minuta Rouy) VIII, 183 – – f. pauciflora Mer. VIII, 63 Sonchus Bornmülleri Pitard IX, 382 Canariae Pitard IX, 279
Cavaleriei Lévl. VIII, 451 \*- Fauriei Lévl. et Vant. VII, 102 - Gandogeri Pit. IX, 279 Jacquini DC. var. Hierrensis Pit. IX, 279 maritimus L. var. denudatus Deyss. IX, 542 neglectus Pit. IX, 280 oleraceus L. b. Iucanus Terracc. V, 139 \*- Picris Lévl. et Vant. VIII, 451 Regis Jubae Pit. IX, 280 \*- Taquetii Lévl. VIII, 141 (Sonerila Cavaleriei Lévl.) IX, 21 Sonneratia acida L. f var. mosambi-censis (Kl.) Mattei IX, 253 Sophia paradisa A. Nels. et P. B. Kenned. IV, 284

Sophora Purpusi Brdg. III, 376

Cogn. VI, 61

Sophronitis cernua Lindl. var. albiflora

Sorbaria arborea C. K. Schn. 1, 3 - assurgens Vilm. et Boiss. VIII, 344 \*X Sorbaronia C. K. Schn. gen. hybr. nov. III. 134 \*x- alpina C. K. Schn. III, 134 \*x— Dippelii C. K. Schn. III, 134 \*\*— var. superaria (Zbl.) III, 134

\*\*— faliax C. K. Schn. III, 134

\*\*— heterophylla C. K. Schn. III, 134

\*\*— monstrosa C. K. Schn. III, 134 \*x- sorbifolia C. K. Schn. III, 134 ×Sorbopyrus C. K. Schn. gen. hybr. nov. III, 133 × auricularis C. K. Schn. III, 133 ×— — var. bulbiformis (Tatar.) C. K. Schn. III, 133 (Sorbus alpina Heynh.) III, 124 \*— altaica Koehne X, 505 \*— amurensis Koehne X, 513 \*— arachnoidea Koehne X, 513 - arbutifolia var. Baenitziana C. K. Schn. III, 150 (- - var. depressa C. K. Schn.) III, 150 var. atropurpurea C. K. Schn.) III, 150 - aria Cr. var. cyclophylla (Beck.) C. K. Schn. III, 135 (- - var. majestica Zabel) VII, 174 — L. subsp. graeca Heldr. (pro sp.) var. umbellata (Desf.) Maire et Petitm. VI, 3  $(--\delta)$  umbellata Hal.) VI, 3 var. \*Duhmbergii - aucuparia L. Koehne X, 504 – var. glabrata C. K. Schn. III, 133 (- - var. maderensis Lowe) VII, 48 – cashmiriana Hedl. f. \*Jaeschkei Koehne X, 517 - - ? f. \*Thomsonii Koehne X, 517 – f. \*typica Koehne X, 516 concolor (Boiss.) C. K. Schn. III, 135
Conwentzii C. K. Schn. III, 136 (- Dippelii Zabel) Ill, 134 (- - var. superaria C. K. Schn.) III, 134 fallax C. K. Schn. III, 133 - floribunda var. glabrescens C. K. Schn. III, 150 gracilis (S. et Z.) C. Koch var. \*Maximowiczii Koehne X, 514 - Hedlundi C. K Schn. III, 134 \*- heterodonta Koehne X, 516 heterophylla C. K. Schn. Ill, 133 - latifolia Pers. III, 136 – var. obtusata (Spach) C. K. Schn. III, 137 Schn. III, 136 — — var.? seminicisa (Borb.) C. K. Schn. III, 137 — — var. typica C. K. Schn. Ill, 136 — maderensis (Lowe) Dode VII, 48

Sorbus Matsumurana (Mak.) Koehne var. \*Reinii Koehne X, 501

- monstrosa C. K. Schn. III, 134

Mougeoti Soy. et Godr. var. austriaca C. K. Schn. III, 316
plantièrensis C. K. Schn. III, 134

\* polaris Koehne X, 502

\*- pseudogracilis (C. K. Schn.) Koehne X, 504

\*- pruinosa Koehne X, 506 - reflexipetala Koehne VI, 336

rufopilosa C. K. Schn. var. \*steno-phylla Koehne X, 517

- sambucifolia var. pseudogracilis C.

K. Schn.) X, 504

\*- Schneideriana Koehne X, 502 - serotina Köhne VI, 336

( — sorbifolia Hedl.) III, 134

(— trilobata var. oxyloba Boiss.) III, 179 — umbellata Fritsch var. Baldaccii C.

K. Schn. III, 136

— var. cretica (Ldl) C. K. Schn. III, 136

- var. flabellifolia (Spach.) C. K. Schn. III, 136

(— ursina var. Wenzigiana C. K. Schn.) X, 516

-- velutina (Alboff.) C. Schn. III, 135 \*— Wattii Koehne X, 515

\*- Wenzigiana (C. K. Schn.) Koehne X, 516

\*— Wilfordii Koeline X, 503

Sorghum halepense Pers, var. achaeton Reyn. VIII, 214

(Sparganium androcladum var. fluctuaus Morong) 1, 28

\*- coreanum Lévl. X, 441

- fluctuans (Morong) B. L. Rob. I, 28 (- simplex var. fluitans Engelm.) I, 28 Spartina densiflora Bogn. var. \*obtusa Hack. VI, 345

(Spartium valentinum W.) XI, 383 Spathoglottis pacifica Rehb. f. IX, 101 - plicata Bl. X, 70

(Spathiglottis plicata Krzl.) IX, 101 (Specularia falcata DC.) VIII, 257

Spergula arvensis L. var.  $\beta$  vulgaris Koch subvar. compacta Pit. IX, 208 - Battandieri (Fouc.) Dur. et Barr. IX, 350

- fascicularis (Lönnr.) var. glabra K. Johanss, IX, 493

- heterosperma (Guss.) Dur. et Barr. IX, 350

- Munbyana (Pomel) Dur. et Barr. IX, 350

(Spergularia Battandieri Fouc.) IX, 350 ( - Dillenii Lebel.) IX, 350

(- heterosperma Lebel.) IX, 350 – madoniaca Loj. Poj. V, 26

— marginata Kitt, var,  $\beta$  grandiflora Pit. IX, 208

Spergularia marginata var.  $\beta$  pedicellaris Pit. IX, 208

(- media Batt. et Trab.) IX, 350

(- media Boiss.) IX, 350

(— Munbyana Pomel) IX, 350 Nobreana Samp. IV, 382

 purpurea (Pers.) Don var. γ crassipes Samp. IV, 382

— — var.  $\beta$  indurata Samp. IV, 382

(— salina  $\beta$  heterosperma Hal.) IX, 350 (— salsuginea var. bracteata Robins.) VI, 169

Sphaerostigma orthocarpa A. Nels. et

P. B. Kdy. IV, 284

Sphinctospermum nov. gen. Rose V, 110 - constrictum (S. Wats.) Rose V, 110 Spilanthes Acmella (L.) Murr. var. al-

bescentifolia A. H. Moore V, 322 · var. lanceolata (Lk.) A. H. Moore

V, 323

(— albus L'Hèrit.) V, 321 - americana (Mut.) Hieron. var. par-vula (Rob.) A. H. Moore V, 326

— — f. lanitecta A. H. Moore V, 326 — — f. parvifolia (Benth.) A. H. Moore V, 326

– war. ramosa (Hemsl.) A. H. Moore

— — var. repens (Walt.) A. H. Moore V, 326 – var. stolonifera (DC.) A. H. Moore

f. ciliatifolia A. H. Moore V, 327 — — f. longiinternodiata A. H. Moore V, 327

(— arnicoides DC.) V, 327

- arnicoides DC. f. grisea Chod.) V, 328

(- - var. grisea Chod.) V, 328 (-- var. intermedia Chod.) V, 328

i – var. leptophylla (DC.) Bak.) V,

(— — var. macropoda (DC.) Bak.) V, 328

(— Beccabunga DC, var. parvula Rob.)

(- Boetterii Wats) V, 322

- callimorpha A. H. Moore V, 323 (— caulirhiza (Del.) DC. β madagascariensis DC. V, 325)

 chamaecaula A. H. Moore V, 321 ciliata H. B. K. var. diffusa (Poepp)

A. H. Moore V, 324

- decumbens (Sm.) A. H. Moore V,

 – var. leptophylla (DC.) A. H. Moore V, 328

- - var. macropoda A. H. Moore V, 328

(— diffusa Poepp.) V, 324

(- disciformis Rob. var. phaneractis Greenm.) V, 325

Spilanthes doronicoides DC. V, 327 - eurycarena A. H. Moore V, 329 (— exasperata Jacq.) V, 321  $(--\beta)$  cayennensis DC.) V, 321 - grisea (Chod.) A. H. Moore V, 328 - - var. Chodatana A. H. Moore V, 328 - - var. intermedia (Chod.) A. H. Moore V, 328 - var. micra A. H. Moore V, 329 (- helenoides H. et A.) V, 328 iabadicensis A. H. Moore V, 325
iodiscaea A. H. Moore V, 325 — — f. leucaena A. H. Moore V, 324 (— lateraliflora Klatt) V, 326 (— leptophylla DC.) V, 328 - leucophaea Hort. Berol.) V, 322 (- limonica A. H. Moore V, 324 macropoda DC.) V, 328 - mauritiana (Rich.) DC. f. madagascariensis (DC.) A. H. Moore V, 325 (- Nuttallii T. et G.) V, 327 - ocymifolia (Lam.) A. H. Moore V, 325 pammicrophylla A. H. Moore V, 325 (- parvifolia Benth.) V, 326 - phaneractis (Greenm.) A. H. Moore V, 325 poliolepidica A. H. Moore V, 324 (— Pseudacmella Spreng.) V, 323 - urens Jacq. f. lanea A. H. Moore V, 321 (— radicans Jacq.) V, 321 (— radicans Schrad.) V, 321 (— ramosa Hemsl.) V, 326 (- repens (Walt.) Michx.) V, 327 (— Salivaria Domb.) V, 321 (- Sodiroi Hieron.) V, 322 Spiraea angulata Fritsch I, 3 \*— Bodinieri Lévl. IX, 322 — var. \*concolor Lévi. IX, 322 \*— Cavaleriei Lévl. IX, 321\*— Esquirolii Lévl. IX, 322 \*— Fauriei Lévl. VIII, 281 — Fritschiana C. K. Schn. I, 2 \*- Martini Lévl. IX, 321 mombetsusensis Franch. I, 1 \*— ouansanensis Lévl. VII, 197 ∠— pachystachys (Sp. corymbosa 
∠ Douglasii) hort. Sprenger IV, 176 - Zabeliana C. K. Schn. I, 2 Spiranthes alpestris Barb. Rodr. var. densiflora Cogn. V, 315 \*- Brenesii Schltr. X, 481 (- decipiens Hook.) VI, 79 \*— epiphytica Schltr. II, 130 \*— Fawcettii Cogn. VII, 123

\*— goodyeroides Schltr. X, 446

- Hasslerii Cogn. V, 316

\*- seminuda Schltr. III, 18

\*— nutantiflora Schltr. II, 131

\*— porphyricola Schltr. Ill, 18

\*- Türkheimii Schltr. II, 131 \*— Werklei Schltr. X, 482 \*Sporolobus acuminatus (Trin.) Hack. VII, 373 \*— australasicus Dom. IX, 553 \*— multinodis Hack. VII, 316 — var. \*exasperatus Hack. VII, 317 - pectinatus Hack, var. coloratus Hack. V. 31 (— phleoides Hack.) IV, 309 \*— poaeoides Hack. X, 167 (- rigens Desv.) IV, 278 - Ruspolianus Chiov. VI, 6 \*- tenuispica Hack. VI, 344 tuberculatus Hack. IV, 309 Staavia lateriflora Colozza I, 127 Stachys affinis Bge. var. \*glabrata Lévl. IX, 322 - agraria Cham. et Schlechtd. β glabrior Benth. VIII, 309 — anisochila Vis. u. Panč. subsp. zepcensis (Form.) Vand. IX, 533 \* - Chanetii Levl. IX, 222 - boraginoides Cham. et Schlechtd. VIII, 309 — coccinea Jacq. VIII, 309 \*- Franchetiana Lévl. IX, 246 \*— hirtus (L.) Thell. X, 290 - Iva Grsb. var. canescens (Form.) Vand. IX, 534 officinalis (L.) Trev. β algeriensis (De Noë) Cout. VIII, 461 – palustris L. var. velutina Vand. IX, 533 \*-? Polygonatum Lévl. IX, 449 (- recta L.) X, 290 - - var. pyrenaica Pau VII, 86 \*— siamensis Muschl. IV, 270 (- Sieberi Boiss.) VIII, 496 silvatica L. b. macrophylla Terracc. V, 140 Stachytarpheta albiflora DC. var. \*coerulea Loes. 1X, 366 \*— Friedrichsthalii Hay. III, 273 \*— Gardneriana Hay. III, 274 \*- obovata Hay. III, 273 \*- simplex Hay. III, 273 Staelia uruguaya Arech. IV, 221 XStanhopea Wolteriana (St. Martiana Ö X St. tigrina ♀) Kränzl. IV, 171 Stapelia divergens N. E. Brown IV, 122 putida A. Berger III, 31 (Statice Armeria Hook.) VIII, 75 - bella Macl. IV, 138 (- carnosa Boiss.) VII, 32 (- caspia Nic.) IX, 45 (- cespitosa Poir.) IV, 138 - chilensis (Boiss.) Macl. IV, 138 - — var. magellanica (Boiss.) Macl. IV, 138

(Spiranthes tenue Benth.) VII, 123

- Tonduzii Schltr. IX, 26

178 Statice Doriae Somm. V, 259 Gmelini × caspica Kusn. VII, 32 (— graeca Boiss.) VIII, 496 — var. italica Loj. Poj. VIII, 496 (— laeta Nic.) IX, 45 (- leucocoleum Index Kew.) IX, 142 Macloviana (Cham.) Macl. IV, 138 — maritima Mill. var. sibirica (Turcz.) Simm. VIII, 74 (— minuta Boiss.) IX, 45 — Nicotrae Loj. Poj IX, 45 — patagonica (Phil.) Macl. IV, 138 (— patagonica Speg.) IV, 138 pectinata Ait. var. β divaricata Pit. IX, 381 - Perezii Stapf VII, 234 - racemosa Loj. Poj. IX, 45 (- rupicola Bad. var.) IX, 45 (— sibirica Ledeb.) VIII, 75 - Somalorum Vierh. VII, 160 (— suffruticosa Radde) VII, 32 – L. var. carnosa (Boiss.) Kusn. VII, 32 (— var. typica Trautv.) VII, 32 - uruguayensis Arechav. IX, 416 Stauntonia brevipes Hemsl. V, 346 — elliptica Hemsl. V, 344 longipes Hemsl. V, 345
obovata Hemsl. V, 344
parviflora Hemsl. V, 346
Staurogyne siamensis C. B. Cl. II, 127 (Stauropsis chinensis Rolfe) X, 196 (— luchuensis Rolfe) X, 196 (— Quaifei Rolfe) X; 196 (- Warocqueana Rolfe) X, 196 \*Stelis bidentata Schltr. X, 358 \*- Bourgeavii Schltr. IX, 284 \*— Buchtienii Schltr. X, 451 \*— coiloglossa Schltr. VIII, 453 \*— Cooperi Schltr. III, 276 \*— curvata Schltr. X, 358 \*— despectans Schltr. VIII, 453 \*- effusa Schltr. III, 247 \*— hymenantha Schltr. X, 291 \*- Koehleri Schltr. X, 386 \*— laxa Schltr. X, 451 \*- longicuspis Schltr. IX, 28 \*- microchila Schltr. IX, 289 \*— patula Schltr. X, 359 — perpusilla Cogn. VI, 56 \*- polystachya Cogn. VI, 306 \*- rubens Schltr. VIII, 564 \*- saxicola Schltr. X, 452 \*— tricuspis Schtr. III, 276 Türckheimii Schltr. VIII, 564 \*— xanthantha Schltr. X, 452

Stellaria aetnensis Loj. Poj. V, 26

— — var. strictior Dom. I, 129

VII, 106

IV. 19

- graminea f. \*decipiens Abrom.

- - f. longisepala C. G. Westerld.

Stellaria media Cyr. var. glandulosissima Vand. IX, 525 radians L. var. ovatooblonga Koidz. 1X, 136 - subvestita Greene VI, 120 \*Stellera Bodinieri Lévl. X, 369 - Lessertii (Wickstr.) C. A. Mey. var. stachyoides (Schrenk) O. IV, 46 - stachyoides Schrenk IV, 46 \*Stemodia ericifolia (O. K.) Hassl. — subsp. \*vera Hassl. VIII, 210 (Stemodiocra ericifolia O. K.) VIII, 210 Stemmodontia bahamensis N. L. Britton VI. 248 \*Stemona Argyi Lévl. X, 441 Stemonurus secundiflorus Bl. var. Valetonii Hochr. VII. 10 Stenandrium verticillatum Brdg. III, 378 (Stenanthera cardinalis Ldl.) X, 481 \*Stenogyne Fauriei Lévl. X, 150 Stenolobium Garrocha (Hier.) R. E. Fr. IV, 204 \*Stenopetalum album Pritzel X, 133 Stenophyllus Carteri Britt. III, 264 - subaphyllus (Clarke) Britt. VIII, 94 (Stenoptera cardinalis Ldl.) X, 481 (- elegans Krzl.) X, 447 \*-- plantaginea Schltr. X, 446 Stenorrhynchus albicans Cogn. V, 315 \*— apetalus Kränzl. VI, 23 - goninensis Pulle X, 284 latipetalus Cogn. V, 312 \*— parvulus Kränzl. VII, 38 \*— Sancti Jacobi Krzl. VI, 22 stenanthus Cogn. V, 313
vaginatus Cogn. V, 314
stenophyllus Cogn. V, 314 - - var. panciflorus Cogn. V, 315 (Stenosolenium perenne Schrenk) IV, 47 (Stenotus Ianuginosus Greene) VIII, 270 (- stenophyllus Greene) VIII, 271 Sterculia colombiana T. A. Sprague II, 126 Sterculia laevis Wall. var. bracteata Pierre f. grandifolia Hochr. VII, 14 macrophylla Vent. var. falco Hochr. V, 347 (- platanifolia L. f.) VIII, 488 — Treubii Hochr. V, 347 — Wigmanii Hochr. V, 347 Stereochlaena Hack. nov. gen. VI, 321 - Jeffreysii Hack. VI, 321 Stevia chacoënsis R. E. Fr. III, 238 (- imbricata Gardn.) IV, 149 (- pinifolia Phil.) IV, 144 Rebaudiana Hemsl. V, 264 - simulans B. L. Rob. IV, 148 \*Stigmatodactylus celebicus Schltr. X, 4 Stillingia tenuis Small III, 270

Stipa acrociliata F. M. Read. var. minor F. M. Read. VII, 387

- arcuata R. E. Fr. IV, 87 \*— Arsenii Hack. VIII, 515 capillifolia Hack, IV, 277

\*- clandestina Hack. VIII. 516 (- gynerioides Phil.) IV, 277

- Ichn (R. et P.) Kth. var. gynerioides (Phil.) Hack. IV, 277

\*— Jürgensii Hack. VII, 314

— leptothera Spegazz. var. atrovio-

lacea Hack. VI, 154

— Lessingiana Trin. & Rupr. var.

Zederbaueri Hack. VI, 151

- melanosperma Presl var. \*erythrina Hack. VI, 345

- f. contorta Hack. IV, 277

- Neesiana Trin. et Rupr. var. virescens Hack IV, 277

\*— nutans Hack. VII, 315

- turkestanica Hack. VI, 54

(Stipularia Delp., non Beauv.) V, 77 Stizolobium Deeringianum Kath. St. Bort. IX, 48

Stranvaesia Rosthorni C. K. Schn. III. 177

\*Straussia Fauriei Lévl. X, 155

Straussiella purpurea (Bge.) Hausskn. β bicolor (Stapf) Bornin, III, 116

— α genuina Bornm. III, 116

— γ perflava Bornm. III, 116

\*Streblacanthus boliviensis Lindau VII, 67 (Strephium distichophyllum Schrad.) IX, 38

(-? pulchellum Wright) IX, 39 (— strictiflorum Fourn.) IX, 39

Streptanthus coloradensis A. Nelson IX, 482

Streptocarpus grandis N. E. Br. III. 189 \*Streptolirion Duclouxii Lévl. et Vant.

VI, 114 Striga gesnerioïdes (Willd.) Vierh. VII. 163

(— orobanchoides Benth.) VII, 163

Strobilanthes Micholitzi H. N. Ridl. VI, 319

siamensis C. B. Clarke II, 128

Strobilopanax nov. gen. Viguier VI, 47
— macrocarpus (Baill.) Viguier VI, 48

 macrocephalus (Baill.) Viguier VI, 48 (Strombosia lucida T. et B.) VII, 10

(- membranacea Val.) VII, 10 - zeylanica Gardn. var. lucida (T. et

B.) Hochr. VII, 10 - var. membranacea (Bl.) Hochr. VII, 10

- – var. sessilis Hochr. VII, 10 (Strongyloma struthionum Phil.) IV, 142 (Struthiola leptantha Bol.) IV, 200 \*— Volkensii K. Winkl, IX, 534

Strychnos boinensis Jum. et P. d. l. Bath. VIII, 202

\*- longissima Loes. IX, 537

Stylidium debile F. v. M. var. pani-culatum Maid. et Betche V, 85 Styphelia costata F. v. M. var. am-

plexans F. M. Read. VII, 387

- (Soleniscia) elegans DC. var. brevior A. J. Ewart VIII, 413

\*Styrax argyrophyllus Perk II, 18 \*— Bodinieri Lévl. IV, 332

\*— bogotensis Perk. Íl, 19 \*— Cavaleriei Lévl. IV, 331; IX, 447 \*- Cespedesii Perk. II, 21

\*- cyathocalyx Perk. II, 24 \*- Duclouxii Perk. VIII, 83 \*- Esquirolii Lévl. IX, 446 \*- Hayataianus Perk. VIII, 82

\*- lieterotrichus Perk. II, 19 - Hookeri Clarke var. yunnanensis

Perk. VIII, 84

\*— hypargyreus Perk. II, 20 \*- macrocalyx Perk. II, 22 \*— macrotrichus Perk. II. 23

\*- Mathewsii Perk. II, 17 \*— micrasterus Perk. II, 24

\*- microphyllus Perk. II, 21 \*- orizabensis Perk. II, 25 \*- Poissonianus Perk. II, 18 \*— trichocalyx Perk. II, 22

\*— Weberbaueri Perk. II, 16

Succisa praemorsa (Gilib.) Aschers.  $\gamma$ rosiflora Sireitsch. VIII, 227 Suaeda littoralis Grec. X, 217

\*Suttonia apodocarpa Lévl. et Faur. X, 444

\*— cuneata Lévl et Faur. X, 443

\*- Fauriei Lévl. X, 373 \*— flavida Lévl. X, 444 \*-- mauiensis Lévl. X, 444

\*- Meziana Lévl. X, 443 \*- molokaiensis Lévl. X, 373

\*— pukooensis Lévl. X, 444 \*— punctata Lévl. X, 444 \*— Vanioti Lévl. X, 476

Swertia Bisseti Sp. Le M. Moore VIII, 242

- Bonatiana J. H. Burk. X, 366 \*— Dielsiana Hoss. X, 63

- Duclouxii J. H. Burk. X, 366 - mekongensis Balf. f. et G. Forrest

VIII, 156

- patens J. H. Burk. X, 367 - purpurascens var. ramosa I. H.

Burk. VIII, 253 — rosea J. H. Burk. X, 367 Sycopsis Dunnii Hemsl. V, 342

- laurifolia Hemsl. V, 342 - philippinensis Hemsl. V, 342

- Tutcheri Hemsl. V, 340 \*Symbolanthus Baltae Weberb. et Gilg

(- calygonus [R. et P.] Gilg) II, 56

180 \*Symbolanthus microphyllus Gilg II, 55 \*- obscurerosaceus Gilg II, 56 Symphoricarpus occidentalis Hook. var. quercifolia A. Nels. IX, 485 Symphyostemon Lainezi C. M. Hick. VIII, 446 (Symphytum asperum Lepechin × officinale L.?) V, 365 - coeruleum Petitm. V, 365 ×— dichroanthum (S. officinale × tuberosum) Teyb. VIII, 95 ×— multicaule Teyb. (S. officinale × tuberosum) VIII, 95 (- peregrinum A. & G.) V, 365 (— peregininin A. & G.) v, soc (— regium Gmel.) IX, 540 — Vetteri Thell. V, 366 \*Symplocos alpina Brand II, 13 \*— Argyi Lévi. X, 431 \*— aurea Lévi. IX, 445 \*— Balfourii Lévl. IX, 77 \*- Bodinieri Brand III, 217; IX, 76 - botryantha Franch. var. \*stenophylla Brand III, 217 \*— caerulea Lévl. IX, 77 \*— Cavaleriei Lévl. IX, 77 \*— clnerea Brand II, 14 \*— coronigera Lévl. X, 431 \*- Delavayi Brand III, 218 \*— Dielsii Lévl. IX, 445 \*- discolor Brand III, 216 \*— Dunniana Lévl. IX, 445 \*- Esquirolii Lévl. IX, 445 - fasciculata Zoll. var. \*chinensis Brand III, 217 \*— hiemalis Lingelsh. VIII, 3 \*- intermedia Brand III, 217 \*— Lehmannii Brand II, 13 \*— longifolia Brand var. moyobambensis Brand II, 14 macrostachya Brand var. \*Leducii Brand III, 217 \*- Martini Lévl. IX, 77 \*— mirabilis Brand II, 14 \*— multipes Brand III, 216 \*— pinfaënsis Lévl. IX, 77 \*— Prainii Lévl. IX, 445

\*— punctata Brand III, 217

\*— Seguini Lévl. X, 431 \*— Stapfiana Lévl. IX, 444 \*- Weberbaueri Brand II, 13 \*- Wilsonii Brand III, 216 (Syndyophyllum trinervium K. Schum. et Lauterb.) VIII, 481 \*Syngramme Francii Rosenst. IX, 75 – war. \*intermedia Rosenst. IX, 76 Syntherisma adusta (Nees) A. Chase IV, 29 - badia (Scribn. et Merr.) A. Chase IV, 29 - Hackelii (Arech.) A. Chase IV, 29 - Perrotteti (Kth.) A. Chase IV, 30 - stenotaphroides (Nees) A. Chase

IV, 30

Syntherisma velutina (DC.) A. Chase IV, 29 Synthyris pinnatifida subsp. lanuginosa Piper VIII, 267 Syringa affinis Henry var. \*Giraldi C. K. Schn. IX, 80 (— Brettschneiderihybrida Henry) IX, 81 \*— Fauriei Lévl. VIII, 285 (- Giraldi Lem.) IX, 80 ×\*— Henryi (S. villosa × S. Josikaea) C. K. Schn. 1X, 81 (— Josikáca hybrida Henry) IX, 81 \*— Komarowi C. K. Schn. IX, 82 - pinnatifolia Hemsl. IV, \*— Potanini C. K. Schn. IX, 80 — pubescens Turcz. var. typica f. \*pilosa C. K. Schn. IX, 80 - - var. \*tibetica Batal. apud C. K. Schn. IX, 80 \*— reflexa C. K. Schn. IX, 80 \*- Sweginzowii Koehne et Lingelsh. VIII, 9 (- villosa var. glabra C. K. Schn.) IX, 81 — - var. \*hirsuta C. K. Schn. IX, 81 - var. \*rosea C. K. Schn. IX, 81 \*typica C. K. Schn. — — var. Schn. IX, 81 — — f. \*glabra C. K. Schn. IX, 81 – – subf. subhirsuta C. K. IX, 81 \* Wolfi C. K. Schn. IX, 81 Syzygium Rowlandi Sprague V, 353 Т. \*Tabernaemontana Buchtieni H. Winkl. VII, 244 \*— macrosiphon Herzog VII, 66 — orientalis Benth. var. grandifolia Th. Val. V, 389 \*Taenia Fauriei Schltr. IX, 282 Taeniochlaena pinnata (King) G. Schellenb. X, 243 \*Taeniophyllum affine Schltr. IX, 294 \*— aggregatum Schltr. X, 211 (— Alwisii Ldl.) III, 110 \*— decipiens Schltr. IX, 112 \*- ficicola Schltr. X, 212 \*- inconspicuum Schltr. X, 210 \*- paludicola Schltr. X, 211 \*— potamophylla Schltr. X, 210 \*— rhomboglossum Schltr. III, 51 \*— sciaphila Schltr. X, 209 \*— usneoides Schltr. X, 209 Talauma gloriensis Pitt. VIII, 465 - poasana Pitt. VIII, 465 Talinaria Brdg. nov. gen. III, 373

— Palmeri Brdg. III, 373 \*Talisia micrantha Radlk. IX, 375 \*— reticulata Radlk. IX, 375 Tamarindus erythraeus Mattei IX, 251 - somalensis Mattei IX, 251 Tamarix Androssowi Litw. III, 390 Karelini Bnge. var. hirta Litw. IV, 8

Tamarix Kotschyi Bunge var. rosea Litw. VI, 104 laxa W. var. parviflora Litw. IV, 8 turkestanica Litw. IX, 554 (Tanacetum Pallasianum Trauty. et Mey.) V, 276 Tapirira pilosa T. A. Spr. II, 126 Taraxacum âlbidum Dahlst. VII, 135 — andinum Dahlst. IX, 46 \*— apicatum Brenner IV, 355 - attenuatum Br. III, 302 aurantiacum Dahlst. VII, 134 - cucullatum Dahlst. VII, 139 (- denudatum Boiss. et Noë) VI, 149 eurylepium Dahlst, X, 464 \*- falcatum Br. IV, 354 farinosum Hausskn. et Bornm. VI, 150 \*— gibbiferum Br. IV, 355 - hyperboreum Dahlst. X, 510 (— intermedium Raunk.) IV, 356 (— laevigatum P. Dus.) IX, 47 magellanicum Comm. var. lobatum H. Dahlst. IX, 46 \*- medians Br. IV, 356 (— montanum Boiss.) VI, 149 (— montanum DC.) VI, 149 officinale var. divaricatum Br. IV, 28  $(--\alpha)$  genuinum form, gibbiferum Br.) IV, 355 — — form. glaucescens Thell. X, 221 — — var. lacerum Br. IV, 28 — var. stenolepis Br. IV, 28 (— var. uncinatum Br.) IV, 356 — var. ungulatum Br. IV, 28 var. ungulatum Br. IV, - platycarpum Dahlst. VII, 136 pseudonigricans Hdl.-Mzz. VI, 150 - rhodocarpum Dahlst. VII, 137 rhusiocarpum Dahlst, IX, 47 (- serotinum Boiss.) VI, 150 \* stenoglossum Br. IV, 356 - syriacum Boiss. VI, 149 tiroliense Dahlst. VII, 138 \*— uncinatum Br. IV, 356 zermattense Dahlst. VII, 137 (Taraxia longiflora Nutt.) VIII, 12 tanacetifolia (T. et G.) Piper VIII, 12 Tarrietia amboinensis Hochr. V, 3 \*Tauschia Roseana Wolff IX, 518 Tecoma Caraiba Mart. var. \*grandiflora Hassl. IX, 60 - Hassleri T. A. Spr. VII, 142 Ipé Mart. var. integrifolia Hassl. f. \*leucotricha Hassl. IX, 60 -? odontodiscus Bur. et K. Sch. var. \*paraguariensis Hassl. IX, 60 \*Teesdalia coronopifolia (Bergt.) Thell. X, 289 (— Lepidium DC.) X, 290 (— regularis Sm.) X, 290

Telanthera pulchella Aresch. X, 301

\*Telipogon Biolleyi Schltr. IX, 293

Telephium Barbeyanum Bornm. V, 400

\*Telipogon costaricensis Schltr. IX, 166 Tellionia acuminatissima Th. Val. V, 378 Tephrosia Apollinea (Delile) DC. ssp. longistipulata Vierh. VII, 159 (— constricta S. Wats.) V, 110 \*— Leratiana Harms X, 129 - mollis Th. Val. V, 380 - mossambicensis Śchinz V, 338 rufescens Benth. var. \*paraguayensis Ulbr. II, 12 Sect. \*Tetraptera Hassl. VII, 358
 Teramnus labialis Spr. f. angustifolia Th. Val. V, 380 \*Terminalia Balansae (O. K.) Hassler VIII. 45 – var. bernardinensis (Chod.) Hassl. VIII, 45 (- Hassleriana Chod.) VIII, 45 (— — var. bernardinensis Chod.) VIII, 45 \* Samoensis Rech. IV, 229 Tetracoccus Hallii T. S. Brdg. IV, 14 (Tetradiclis Ewersmanni Bge.) VI, 104 — salsa C. A. M.) VI, 104 (— — f. Ewersmanni O. Ktze.) VI, 104 (— — var. longipedicellata (O. Ktze.) Litw.) VI, 104 — tenella (Ehrenb.) Litw. VI, 104 — — var. longipedicellata (O. Ktze.) Litw. VI, 104 Tetrapteris tolimensis T. A. Sp. II, 126 Teucrium Balfourii Vierh. VII, 162 Barbeyanum Asch. et Taub. IX, 470 (- buxifolium Schreb.) III, 329 calycinum Pau II, 325 (— capitatum L.) VIII, 462 (- - var. genuinum Rouy) VIII, 462 (- - var. lusitanicum Brot.) VIII, 462 — — var. ulmeticum Pau III, 331 Cubense L. VIII, 308 (- flavum L. var. glaucum Fouc. et Sim.) III, 208 \* fulvo-aureum Lévi. VIII, 426 — glaucum (Jord. etFourr.) Bég. III, 208 (- gnaphalodes Welw.) VIII, 463 (— Haenseleri Bss.) VIII, 463 - hifacense C. Pau III, 322 \*- Kouytchense Lévl. VIII, 426 laciniatum Torr. VIII, 308 lepicephalum Pau III, 329 (- lusitanicum Hoffgg. et Link, non Schreb.) VIII, 462 \*- nepetoides Lévl. VIII, 450 — occidentale subsp. viscidum Piper VIII, 267 (— petiolare Balf. f.) VII, 162 - petrophilum Pau III, 329 (- Polium Fic.) VIII, 463 — — L. subsp. capitatum Cout. var. capitatum Cout. VIII, 462 — — subsp. Haenseleri Cout. var. δ algarbiense Cout. VIII, 463

Tencrium Polium subsp. Haenseleri var. ε Haenseleri Cout. VIII. 463 — subsp. Polium Brig. var. γ vicentium (Rouy) Cout. VIII. 463 (— prostratum Balf. f.) VII, 162 (— saxatile Cav.) III, 329 - Socotranum Vierh. VII, 162 (- vicentium Rouy) VIII, 463 \*Thalictrum amphibolum Greene VII, 255 (- angustifolium Strobl) VII, 37 (— — γ angustisectum Neilr.) VII, 37 (— — α angustissimum Beck) VII. 37 (— — var. fallax Cel.) VII, 37 — γ glandulosum Beck) VII, 37 (- - γ laserpitiifolium Koch) VII. 37  $(--\gamma)$  latisectum Neilr.) VII. 37  $(--\beta)$  nigricans Beck) VII. 37 ( - var. stenophyllum W. Gr.) VII, 37  $(-- \beta \text{ variisectum Rchb.}) \text{ VII, } 37$ (— angustissimum Cr.) VII, 37 \*- Bernardinum Greene VII, 252 \*— campylopodum Greene VII, 253 \*— cirrhosum Lévl. VII, 97 clavatum DC. var. \*Cavaleriei Lévl. VII, 258 (- coreanum Lévl.) VII, 100 \*- coreospermum Greene VII, 253 \*- Duclouxii Lévl. VII, 98 \*— Dunnianum Lévl. VIII, 549 ( — elatum γ stipellatum Rgl.) VII, 31 — Fauriei Hay. VI, 192 \*- Fauriei Lévl. VII, 100 (— flavum β angustissimum Neilr.) VII,  $(--\alpha \text{ latisectum Murm.}) \text{ VII, } 37$  $(--\gamma \text{ variifolium Neilr.}) \text{ VII, } 37$ (- glandulosum Lecoy.) VII, 37 (- ichangense Lecoy, race \*coreanum Lévl.) VII, 100 (- Ledebourianum C. A. Mey.) VII, 30 \*- lentiginosum Greene VII, 252 - leucocrinum Greene X, 221 - lucidum L. γ glandulosum (Lec.) Hay. VII, 37  $--\beta$  laserpitiifolium (Koch) Hay. VII, 37  $--\alpha$  stenophyllum (W. Gr.) Hav. VII, 36 - Lunellii E. L. Grenne IX, 401 \*- Mairei Lévl. VII, 339 minus L. var, collinum Busch VII, 30 (- - var. elatum Lecoy.) Vli, 30 - - var. Ledebouriannum (C. A. M.) Busch VII, 30 (-- var. nanum Lecoy.) VII, 30 - - var. pratense Busch VII, 30 (- - var. procerum auct.) VII, 30 ( - var. stepposum Korsh.) VII, 30

\*Thalictrum neo-sachalinense Lévl. VII. 101 ( — nigricans DC) VII, 37 - nigricans Scop.) VII, 37 \*— omissum Greene VII, 254 \*- papyraceum Greene VII, 254 \*- propinquum Greene VII, 254 \*- punctatum Lévl. X, 376 (- rotundifolium DC.) V, 77 \*- Taqueti Lévl. VII, 100, 339 (- Taquetii Lévl.) VIII, 549 \*- Tenii Lévl. VII, 98 - thyrsoideum Greene IX, 400 - vegetum Greene IX, 401 \*- verticillatum Lévl. VII, 97, 99 (- virgatum Hook.) VII, 99 - zibeilinum Greene X, 222 (Thea rosiflora Mats.) VIII, 112, 113 - Sasanqua (Thbg.) Nois. var. vernalis Mak. VIII, 113 — sinensis L. var. rosea Mak. VIII, 112 (Thelaia intermedia Alef.) X, 138 \*Thelasis celebica Schltr. X, 187 (- samoensis Krzl.) III, 320; IX, 109 Thelypodium Purpusi Brdg. III, 374 streptanthoides Leiberg VI, 171 Thermopsis montana ssp. ovata B. L. Rob. VII, 215 (Therofon intermedium Hell.) VI, 172 – majus var. intermedium Piper VI, 172 \*Thesium Chaneti Lévl. IX, 446 - pratense Ehrh. var. 3. capillipes Pau VIII, 288 Thlaspi abulense C. Pau III, 323 (-- africanum Burm.) V, 126 - alpestre L. var. purpurascens (Rydb.) C. H. Ostenf. X, 511 (— campestre Vill.) V, 89 (— chalepense Poir.) V, 87 (- coronopifolium Bergeret) X, 289 (— corsicum Sol.) V, 90 (— diffusum Salzm.) V, 90 \* exauriculatum Kom. IX, 392 (- hirsutum Lam.) V, 89 (— hirtum L.) V, 89 (- humifusum Lois.) V, 90 - lutescens Vel. I, 133 (- nemorosum var. Adami Hoffm.) V, 89 (- nudicaule Bergeret) X, 289 (- pubescens Guss.) V, 89 (- purpurascens Rydb.) X, 511 (- recurvatum Sieber) V, 89 (- scapiflorum Viv.) V, 90 (- secundum Medic.) V, 89 Thottea borneensis Val. IX, 308 \*Thrinax Harrisiana Becc. VI, 94 Thrincia hirta Roth var. 4. autumnalis Mer. VIII, 286 (- Tripolitana Sch. Bip.) IX, 468 tuberosa DC. var. β Tripolitana (Sch. Bip.) Dur. et Barr. IX, 468

\*Thrixspermum celebicum Schltr. X, 205

Thrixspermum comans Sm. V, 300 \*- cymboglossum Schltr. X. 207 \* - filifolium Schltr. X, 208 \*— gracilicaule Schltr. III, 278 - Graeffii Rchb. f. IX, 111 \*- indragiriense Schltr. III, 278 \* Loogemanianum Schltr. X, 206 \*- tylophorum Schltr. X, 206 \*Thryptomene Kochii Pritzel X, 133 \*Thymbra Sintenisii Bornm. et Aznav. X. 471 Thymelaea arvensis Lam. f. pilifera Rolıl. 1, 27 - lythroides Barr. et Murb. V, 212 Thymopsis Brittoni Greenm V, 185 Thymus Aznavouri Vel. I, 136 (- Calamintha Brot.) VIII, 460 (-- lobatus Bth.) VIII, 459 (-- lusitanicus Bss.) VIII, 460 - moesiacus Vel. 1, 136 Rohlenae Vel. I, 136 Serpyllum L. var. Przewalskii Kom. V, 272 thasins Vel. I, 135Tosevi Vel. I, 135 Velenovskyi Rohl. I, 27 (- villosus Bth.) VIII, 460 - L. subsp. b.) Insitanicus Cout. VIII, 460 — — subsp. a.) villosus Cout. VIII, 459 ×— vivariensis (Th. Chamaedrys vulgaris) Coste et Revol IX, 544 (— Welwitschi de Noé) VIII, 459 Boiss. α genuinus Cout. VIII, 459 — — β velutinus Cout. VIII, 459 Thysanocarpus curvipes var. madocarpus Piper VI, 172 Thysanotus Bentianus A. J. Ewart and White VIII, 413 \*Tibouchina amoena Herz. VII, 64 - gracilis Cogn. VII, 72 \*- - var. robusta Cogn. VII, 72 \*— Rojasii Cogn. VII, 71 (Tilia cordifolia Bess.) Vill, 435 \*— Franchetiana C. K. Schn. VII, 201 (— grandifolia var. corymbosa Ortm.) VIII, 435 (-- var. pilosa Ortm.) VIII, 435 (- mutabilis Host) VIII, 435 (— pilosa Opiz) VIII, 435 (— platyphyllos var. cordifolia Simk.) VIII, 436 (-- var. corymbosa (Ortm.) Hay. VIII, 435 (— — var. mutabilis Simk.) VIII, 435 – – c. pilosa (Presl) Hay. VIII, 435 \*— Taqueti C. K. Schn. VII, 200 Tuan Szyszl. var. \*Cavaleriei Engl. et Lévi. Vi, 266 (Tillaea rubra L.) X, 290 \*Tillandsia aurea Mez III, 44

\*-- aureobrunnea Mez III, 36

\*Tillandsia Buchtieni H. Winkl, VII, 107 \*— cauligera Mez III, 42 \*- cereicola Mez III, 34 \*- extensa Mez III, 33 \*- favillosa Mez III, 43 \*- Friesii Mez III, 37 \*- heteromorpha Mez III, 41 \*— interrupta Mez III, 38 Langlassei Poiss, et Menet IX, 397 Lecomtei Poiss, et Menet IX, 396 \*- macrodactylon Mez III, 39 \*- pallidoflavens Mez III, 36 \*- patula Mez III, 35 \*- pinnato-digitata Mez III, 39 \*- platyphylla Mez III, 37 - rubentifolia Poiss, et Menet IX, 397 \*- saxicola Mez III, 41 \*- Walteri Mez III, 43 \*- Wangerini Mez III, 40 Timonius subsessilis Th. Val. V, 395 Tissa diandra var. bracteata (Robins.) Piper VI, 169 Tithonia tubaeformis (Jacq.) Cass. var. Bourgaeana Pamp. VII, 234 — Vilmoriniana Pamp. VII, 233 Tococa caquetana T. A. Spr. II, 139 Toechima dasyrrhache Radik. IV, 281 Tofieldia Esquirolii Lévl. III, 371 \*— Fauriei Lévl. et Vant. V, 283 \*- Taqueti Lévl. et Vant. V, 283 Tolpis Proustii Pit. IX, 278 Tonduzia Pittier nov. gen. VIII, 474 — parvifolia Pitt. VIII, 474 — stenophylla (Donn. Sm.) Pitt. VIII, 474 \*Tournefortia mapirensis Lingelsh. VII, 244 \*Tovaria Esquirolii Lévl. VI, 264 \*— Hallaisanensis Lévl. VI, 264 X, 372 Townsonia deflexa Cheesem. IX, 250 \*- viridis (Hk. f.) Schltr. IX, 250 Toxocarpus ankarensis Jum. et P. d. 1. Bath. VIII, 201 Schimperianus Hemsl. V, 261 \*— siamensis Schltr. III, 307 – sulfureus Jum. et P. d. l. Bath. IX, 301, 539 - tomentosus (Desne.) Jum. et P. d. 1. Bath. VIII, 202 Trachelium rumelicum Hampe var. cinerascens Vand. IX, 533 \*Trachymene Kochii Pritz. X, 133 Tracyanthus angustifolius var. texanus B. F. Bush IV, 213 (Tragacantha atacamensis O. Ktze.) IV, 21 (— bella O. Ktze.) IV, 21 Tragia nigricans B. F. Bush IV, 214

Tragopogon hortensis Focke IV, 97

- phaeus Focke IV, 97

— praecox Focke 1, 48

\*Trema Dunniana Lévl. X, 146 (Trianthus ulicina Hook. f.) IV, 142 (Trichachne saccharatum (Buckl.) Nash) IV, 29

(— sacchariflora Nees) IV, 273 (— tenuis Nees) IV, 273

Trichilia cuneifolia Pulle X, 407

\*- stelligera Radlk. IX, 372

\*— subarborescens C. DC. VII, 58
—viridis Rusby var. \*puberula Lingelsh.
VIII, 1

Trichinium eriotrichum (W. V. Fitzg.)

Ewart and White IX, 176

- incanum R. Br. var. intermedium

Ewart IX, 135

 var. parviflorum Ewart IX, 135
 Trichloris pluriflora Fourn. f. macra Hack. IV, 278
 (Trichocoronis Greggii Gray) IV, 149

(Trichocoronis Greggii Gray) IV, 149 (— sessilifolia B. L. Robins.) IV, 149 \*Trichodesma calcaratum(Cosson ined.)

Batt. X, 219

\*— Hemsleyanum Lévl. IX, 327 (Trichodium elatum Pursh) V, 359 (— nanum Presl) V, 357

Trichoglottis javanica Sm. V, 303

— Koordersii Rolfe X, 198

— oblongifolia Rolfe X, 197 \*— Solerederi Kränzl. VIII, 98

- tricostata Sm. V, 304

(Trichogonia podocarpa Bak.) IV, 149 — rhadinocarpa B. L. Rob. IV, 149

(Tricholaena ruficoma Dur. et Schinz) VI, 6

(Trichomanes aphlebioides Christ) V, 370

 (— bipunctatum Poir. var. laxa Bl.) V, 370
 — diaphanum H. B. K. var, \*subalata Rosenst. VII, 291

— formosanum Yabe VI, 282

(— javanicum Bl. var. Bóryana Ktze.) V, 370

— liukiuense Yabe VI, 283

— maximum Bl. var. \*grandiflora Rosenst. V, 371

Miyakei Yabe VI, 282pallidum Bl.) V, 370

\*— stenosiphon Christ V, 10

\*— Werneri Rosenst. V, 35

(Trichonema anceps Mer.) VIII, 216 (—Bulbocodium f. pulcherrima Freyn)

VIII, 215 (— var. rectifolium Mer.) VIII, 215

(— purpurascens Willk.) VIII, 215 (— var. maritimum Mer.) VIII, 215

(— var. virescens Mer.) VIII, 216 — ramiflorum Willk. et Lge. VIII, 215 (Trichophorum alpinum Pers.) III, 142

(— atrichum Palla) Ill, 142 \*Trichosanthes Dunniana Lévl. X, 148 — rubriflos (Thorel mss.) V. Cayla IX, 495 (Trichotosia klabatensis Krzl.) X, 84

(— pleistophylla Krzl.) X, 84 (— virginalis Krzl.) X, 84

— Wallaceana Krzl. IX, 286
Trientalis europaea L. f. erubescens

C. G. Westerld. IV, 17

— f. grandiflora C. G. Westerld.
IV, 17

Trifolium alpestre L. var. Durmitoreum Rohl. 1, 25

— var. glabrum Vand. IX, 526

(— amabile H. B. K.) II, 2 (— Aucheri Boiss.) VIII, 184 (— bithynicum Boiss.) VIII, 184

— constantinopolitanum Ser. var. Carmelii (Boiss. pr. spec.) Thell. V, 365

(— contractum Hochst.) IX, 413 \*— Daveauanum Thell. Ill, 282

— fragiferum L. f. divulsum Prechtelsb. II, 95

\*- macrorrhizum Ulbr. II, 2

— medium L. var. bithynicum (Boiss.) Busch VIII, 184

(— var. majus Boiss.) VIII, 184 \*— montanum L. f. \*macrocephalum Tocl I, 12

nigrescens Viv. var. dolychodon
 Somm. V, 31

— nivale Sieb. var. sanguineum Pau IX, 191

— pannonicum Jacq. f. angustifolium Vand. IX, 526

- Pigmantii Fauch. Ch. f. piligerum Rohl. I, 35

polystachyum Fresen. var. contractum (Hochst.) Lanza IX, 413

rubens L. f. Guarensis Pau VII, 84
stellatum L. var. caspicum Busch VIII, 184

— f. xanthinoides Rohl. I, 35

 striatum L. var. elatum Loj. lusus pedunculatum Thell. X, 221

(——var. incanum [Presl] A. et G.) X, 221 \*— Weberbaueri Ulbr. II, 2

Triglochin turrifera A. J. Éwart VII, 387 (Trigonella americana Nutt.) VII, 268

(— Besseriana Ser.) V, 365

— coerulea (L.) Ser. sp. procumbens (Besser) Thell. V, 365 Trigonotis macrophylla Van. II, 157

Trillium giganteum (H. et A.) Heller IV, 61

(— sessile var. angustipetalum Torr.) IV, 61

(— var. californicum Wats.) IV, 61 (— var. chloropetalum Torr.) IV, 61

(— var. giganteum H. et A.) IV, 61 Trimorpha cappadocica Vierh. VI, 147 — pycnotricha (Schott et Kotsch.)

Vierh. VI, 147 Trinia vulgaris DC. var. \*durmitorea

Rohl. III, 146

Triodia paraguayensis (O. K.) Hack. IV, 278

(Triopteris polycarpa Blanch.) IX, 268 (- volubilis Salzm.) IX, 200

Tripogon subtilissimum Chiov. VI, 7 Tripsacum latifoiium A. S. Hitchc. IV, 255 – dactyloides L. subsp. hispidum Hitchc. IV, 256

Tripteris confusa Bol. VII, 153

karrooica Bol. VII, 155
Lordii Ol. et Hiern var. racemosa Balf. f. VII, 165

– racemosa (Balf. f.) R. Wagn. VII, 165 Triptilion Dusenii O. Hoffm. IV, 142 (Triraphis Hieronymi O. Ktze.) IV, 343 (-? microdon Benth.) X, 117

\*Trisetum Bornmülleri Dom. II, 30 (- Cavanillesii Trin.) III, 140

 distichophyllum (Vill.) Pal. Beauv. var. pseudoargenteum Murr. III, 139

— — var. vestītum Bonn. V, 64 (- Gaudinianum Boiss.) III, 140 \*— hirtiflorum Hack, X, 169 \*- longiglume Hack. VII, 319

- spicatum var. molle (Michx.) Piper

(— subspicatum var. molle Gr.) VI, 74

Tristiropsis Ridleyi Hemsl. V, 264 Triteleia angustiflora Heller IV, 60 (- grandiflora Lindl.) VI, 77

Triticum caninum L. mut. subinerme K. R. Kupff. VI, 125

— cereale (L.) Salisb. var. aestivum (Werkow.) DT. et Sarnth. III, 141 — var. hibernum (Keil) DT. et Sarnth. III, 141

- cylindricum (Host.) Ces. Pass. Gib.

var. hirsutum Binz V, 362 \*— juvenale Thell. III, 281 — peregrinum Hack. VII, 239

(- repens var. pubescens Döll.) VI, 75 (-- var. subvillosum Hook.) VI, 75 Tritonia bracteata A. Worsl. IV, 363 Triumfetta morrumbalana De Wild. III, 165

Trixis Glaziovii Bak. var. aurantiaca

Dus. VII, 223

— Hoffmannii Dus. VII, 223

Trollius patulus Salisb. f. tenuisectus Busch VII, 23

\*Trophis aurantiaca Herz. VII, 51 Tropidia effusa Rchb. f. IX, 92

(Troximon glaucum Nutt.) IV, 144 (— var. asperum Rydb.) VIII, 269 var. dasycephalum Torr. et Gr.) VIII, 269

(— — heterophyllum var. cryptopleura Greene) VIII, 269

(— – var. cryptopleuroides Suksd.) VIII, 269

– var. glabratum Suksd.) VIII, 269 (Tryphane Gerardi Rchb.) VII, 33

Tsimatimia pedicellata Jum. et P. d. l. Bath. IX, 569

- Pervillei (Pl. et Tr.) Jum. et P. d. l. Bath. IX, 569

Tsuga formosana Hay. VIII, 366

Tulipa silvestris L.  $\beta$  australis (Lk.) b. prinzeriana Bolz, IX, 406

— — γ prinzeriana Bolz. VIII, 254

- Urumoffii Hay. X, 320

(Tunica cretica [L.] Boiss.) VIII, 48

— illyrica (L.) Boiss. ε cretica Lanza VIII, 48

— — γ fasciculata Lanza VIII, 48

— — B paniculata Lanza VIII, 48

 $--\delta$  stricta Lanza VIII, 48

 Thessala Boiss. var. β Cyrenaica Dur. et Barr. IX, 350

Tupistra bambusifolia Lévl. et Vant. III, 370

 var. rubro-maculosa Lévl. et Vant. III, 370

\*— Cavaleriei Lévl. X, 372

- Esquirolii Lévl. et Vant. Ill, 370 \*Turnera bahiensis Urb. IV, 134

\*- chrysocephala Urb. IV, 133 \*- leptosperma Urb. IV, 135

– pumilea L. var. Piauhyensis Urb. IV, 133

\*— stenophylla Urb. IV, 136

\* Uleana Urb. IV, 132

Turraeanthus Malchairi De Wild. X, 528 (Tussilago saxatilis Turcz.) V, 277

- Umbertina Borbás I, 143 \*Tylophora amboinensis Schltr. III, 311 — apiculata Schltr. III, 311

- celebica Schltr. III, 312 \*- excisa Schltr. III, 312

\*- Havilandii Warb. III, 313

\*— Henryi Warb. III, 313 \*— Maximowicziana Warb. III, 314 \*- Sarasinorum Warb. III, 314

\*— Schmidtii Schltr. III, 315 \* Schumanniana Warb. III, 315

\*— stenoloba Warb. III, 339 \*-- trichambon Warb. III, 340

Tyrimnus leucographus (L.) Cass. var. Cavillieri Briqu. III, 125

(Ugni molinae Turcz.) IV, 137 ugni (Mol.) Macl. IV, 137

(Ulex europaeus L.) II, 1 Ulmus betuloides Holl. IV, 102

\*- pinnato-ramosa Koehne VIII, 74 - pseudo-racemosa Holl. IV, 102 Umbilicus pendulinus DC. var. Vele-

novskyi Řohl. I, 22 \*caespitiformis

Uncinia R. Br. var. Kükenth. VIII, 7, 220

- pedicellata Kükenth. IX, 408

Unifolium bifolium var. kamtschaticum Gmel.) Piper VI, 78 (Uniola bipinnata L.) VIII, 300

\*Unonopsis guaraya Herz. VII, 52 - Riedeliana R. E. Fries II, 191 \*Uragoga Buchtienii H. Winkl. VIII, 5

Uralepis Anderssonii Aresch. X, 301 (Uranthera siamense Pax et K. Hoffm.) X, 116

Urena lobata L. var. hirsuta Hochr. III, 169

Urobotrva O. Stapf nov. gen. III, 59

 angustifolia Stapf III, 59 — latifolia Stapf III, 60 minutiflora Stapf III, 60

 trinervia Stapf V, 353

Urodon dasyphyllus Turcz. var. ovalifolius A. J. Ewart VIII, 418

Ursinia erectifolia Bol. VII, 152 subintegrifolia Bol. VII, 151 \*Urtica pinfaensis Lévl. et Blin X, 371

\*Urvillea filipes Radlk. VII, 354 \*Utricularia bosminifera Ostf. II, 68 \*- Herzogii Lützelb. VII, 356

— neglecta var. gallaecica Mer. VII, 362

\*— siamensis Ostf. Il, 68 (Uvularia Smithii Hook.) VI, 78

\*Vaccinium albidens Lévl. et Vant. IV, 447

\*— Cavaleriei Lévl. et Vant. IX, 447 - Dobbini Burnh. VII, 43

\* foetidissimum Lévl. et Vant. IX, 447

\*- hamatidens Lévl. X, 152

— macrophyllum (Hook.) Piper VIII, 14 (- membranaceum Dougl.) VIII, 14 myrtilloides var. macrophylla Hook.) VIII, 14

(- oxycoccus var. intermedium A. Gr.) VIII, 14

\*- siccum Lévl. et Vant. IX, 447

 uliginosum L. f. oocarpum Pamp. VII, 235

— — var. patagonicum Macl. IV, 138 Vagnera amplexicaulis var. brachystyla (Henders.) Piper VI, 78

Valeriana baltica Pleijel VII, 288 baltica Pleijel × officinalis L. VII, 385

 campestris Dus. VII, 224 (- capitata var. Hookeri Torr. et Gr.)

VIII, 269 - ceratophylla (Hook.) Piper VIII, 268

(- edulis Nutt.) VIII, 268 f. alterna C. G. - excelsa Poir.

Westerld, IV, 15 (— excelsa Poir. integrifolia Ledeb.)

- — f. trifoliata C. G. Westerld. IV, 15 — globularifolia Rom. var. nevadensis Pau VIII, 134

(- Hookeriana Wight et Arn.) VIII, 269

Valeriana macrorhiza Macl. IV, 139 – mamillata (Suksd.) Piper VIII, 269 (— officinalis L. var. integrifolia Ledeb.) VII, 288

 $(--L. \beta \text{ simplicitolia Ledeb.}) \text{ VII, 288}$ - saxatilis L. b. nana Bolz. IX, 187

(- Scouleri Rydb.) VIII, 269

– sitchensis var. Scouleri (Rydb.) Piper VIII, 269

Valerianella Zoltani Borbás I, 143 Valerianodes fruticosa Millsp. VII, 284 Valota insularis (L.) A. Chase IV, 29

- Pittieri (Hack.) A. Ch. IV. 29 - saccharata (Buckl.) A. Ch. IV, 29 (Vancouveria aurea Greene) VIII, 420

(- chrysantha Greene) VIII, 420 (- hexandra Brew. et Wats.) VIII, 420

- var. aurea Rattan) VIII, 420 — — var. chrysantha Greene) VIII, 420

- parviflora Greene) VIII, 420 Vanda arcuata J. J. Sm. X, 197 (— Cathcarthii Hk. f.) X, 197

— celebica Rolfe X, 197 (— gigantea Ldl.) X, 196 (— Lowei Ldl.) X, 196

(— Muelleri Kränzl.) X, 196 - Watsoni Rolfe IV, 122

Vandellia callitrichifolia Lévl. VI, 377

Bodinieri Lévl. VI, 377 Cavaleriei Lévl. VI, 377

\*Vandopsis breviscapa (J. J. Sm.) Schltr. X, 195, 196

\*— celebica Schltr. X, 195

\*— chinensis (Rolfe) Schltr. X, 196 - gigantea (Ldl.) Pfitz. X, 196

- lissochiloides Gaud. X, 196 \*- Lowii (Ldl.) Schltr. X, 196

\*- luchuensis (Rolfe) Schltr. X, 196 \*- Muelleri (Krzl.) Schltr. X, 196

\*— Quaifei (Rolfe) Schltr. X, 196 — Warocqueana Rolfe X, 196 \*Vanilla Bakeri Schltr. VIII, 561 marowynensis Pulle III, 285

\*— Pittierii Schltr. III, 106 — planifolia Andr. X, 8 \*— platyphylla Schltr. X, 7

(Vaniotia Martini Lévl.) IX, 329 (Verbascum Baldaccii Deg.) III, 149 - Blattaria L. var. tenuipes Borb.

IX, 533 (- blattaroides Hoffgg. et Lk.) VIII, 487

- Bornmülleri Velen. var. \*Lovcense Rohl. III, 148

- bosnense K. Maly VII, 185 (- bulgaricum Vel.) III, 149

- Dieckianum Borb. et Deg. I, 159 \*- Durmitoreum Rohl. III, 149

Formánekii Borb. IX, 533

( - garganicum Ten. var. heterophyllum Gris.) III, 149

(— Guicciardi B. H.) III, 149 (- Henriquesii Lge.) VIII, 486 Verbascum laxum Fil. et Jáv. VII, 184 — Linkianum Mariz var.  $\beta$  compositum Mariz VIII, 486

— var. γ ramosum Mariz VIII, 487

— – var. α simplex Mariz VIII, 486

\*— Nicolai Rohl III, 148 — Ostrogi Rohl. I, 22

(- Prusianum Boiss.) III, 149

- (- simplex Hoffgg. et Lk.) VIII, 486
- tetrandrum Barr, et Murb, V, 209 (— thapsoides Hoffgg. et Lk.) VIII, 487 (— Thapsus Welw. VIII, 486

 virgatum With. β lanceolatum Mariz VIII, 487

Verbena aretioides R. E. Fries III, 360 bipinnatifida Schauer IX, 362

- canescens H. B. K. IX, 362

- caroliniana L. IX, 362

- var. polystachya (Kunth) Loes. IX, 362
- var. recta (Kunth) Loes. IX, 362

— ciliata Benth. IX, 862

hirta Spreng. var. gracilis Dus. VII, 259

- maritima Small III, 292

— officinalis L. var. \*ramosa Lévl. X, 440

(— polystachya Kunth) IX, 362 - pygmaea R. E. Fr. III, 359

(Verbesina buphthalmoides Lk. et Olto) V, 327

— flavovirens R. E. Fr. III, 240 (- Pseudacmella Spreng.) V, 323 Vernonia amplexicaulis R. E. Fr. III, 237

\*- Esquirolii Vant. IV, 331

(- phylicaeformis (Meyen) Wlprs.) 111, 295

- Verdickii O. Hoffm. et Muschl.) 1X, 384

\*— de Wildemaniana Muschl. IX, 384 Veronica Aleppica Boiss. β \*schizostegia Borm, IX, 113

– Astoni D. Petrie IX, 139

(- Boronetzkii Bordizkowski) X, 472 – breviracemosa Oliver IX, 410

 buxifolia Benth. var. prostrata Cock. VIII, 223

- Carquejeana Samp. IV, 383; VIII, 219 chamaedrys L. var. 2. canescens Mer. VII. 365
- cinerea Boiss. var. \*Argaea Stadlm. 11, 165
- didyma Ten. var. agrostifolia Thell. III, 128
- filiformis Sm. var. subabortiva Reyn. VIII, 33
- \*— hawaiensis Lévl. X, 123 - Hjuleri O. Pauls. IV, 47
- latifolia Koch f. angustifolia ε Steig. IV, 69
- Laingii Cock. VIII, 223

×Veronica macrosperma (V. opaca Fr. × Tournefortii Gmel.) J. Schust. 1, 32

- Martini Lévl. VI, 377

— minniana Mer. VII, 365 - minuscularia Pau VIII, 136

- officinalis L. var. 2. glabrescens Mer. VII, 365

\*— — var. \*rhynchocarpa Toel I, 16 - polita Fr. var. rosella Sudre VIII, 323 var. tournefortioides Vollm.

11, 100 ×\*- Prechtelsbaueri (V. agrestis L. ×

V. polita Fr.) Schuster IV, 63 (- repens Boiss.) VIII, 136

(-- Lois. var. nevadensis Pau) VIII, 136

— Revesana Mer. VII, 365

— scutellata L. f. macra Witte II, 122 — serpyllifolia L. f. minima Witte 11, 122

siaretensis E. Lehm. VI, 30 \*- Sintenisii Hsskn. X, 422, 472

- spicata L. f. lanigera Vand. IX, 533 — — f. squamosa (Presl) Vand. IX, 533

\*— Tournefortii Gmel. var. \*fallax Rohl.

- verna L. var. Revelieri Briqu. III, 124

× Vollmanni (V. polita Fr. × Tournefortii Gmel.) Schuster 1, 32, 11, 100

× – Wiesbauriana (V. agrestis L. × Tournefortii Gmel.) Sch. 1, 31

×— Wildtii (V. opaca × polita) Sch. 111, 387

(Vesicaria reticulata Lam.) VI, 128 \*Viburnum ajugifolium Lévl. IX, 441

- amplifolium Rehd. IX, 182 \*- Bodinieri Lévl. IX, 442

\*- Cavaleriei Lévl. IX, 442 \*— Chaffanjoni Lévl. IX, 443

- cinnamomifolium Rehd. IX, 183 congestum Rehd, IX, 180

- crassifolium Rehd. IX, 180 dasyanthum Rehd. IX, 185 \*- Dielsii Lévl. IX, 443

\*— Dunnianum Lévl. IX, 442

- (— erosum var. ichangense Hemsl.) IX, 186
  - – var. setchuense Graebn.) IX, 186 Hessei Köhne VIII, 492

 hirtulum Rehd. IX, 184 — hupehense Rehd. IX, 185

hypoleucum Rehd. IX, 179
ichangense Rehd. IX, 186

\*— Komarovii Lévl. et Vant. IX, 78 — Lantana L. f. brachycarpum Pamp. VII, 235

\* - Martini Lévl. IX, 443

Opulus f. pygmaeum Schelle VIII, 347

— ovatifolium Rehd. IX, 184 \*- pinfaense Lévl. IX, 442

— pyramidatum Rehd. IX, 181

Viburnum Sargenti Koehne f. 2. glabra Kom. V, 274

 Sargenti Koehne f. 1. puberula Kom. V, 274

\*- Stapfianum Lévl. IX. 443

\*— Staphanum Levi. IX, 443

\*— Taquetii Lévi. IX, 443

— ternatum Rehd. IX, 181

— theiferum Rehd. IX, 183

Tinus L. var. macrophyllum Sprenger VIII, 343

tomentosum var. lanceatum Rehd.
 1X, 182

\*— Touchanense Lévl. IX, 442

utile Hemsl. var. elaeagnifolium
 Rehd. IX, 180

- Wilsonii Rehd. 1X, 184

yunnanense Rehd. iX, 179
 (Vicia ambigua Guss.) iX, 352

\*— cassubica L. var. \*pauciflora Dom. 1, 12

\*— cracca L. var. \*depauperata Dom. 1, 13

hirsuta (L.) Koch var. glabrisiliquosa Buchlmann II, 95

\*- montenegrina Rohl. III, 146

(— pilisiensis (Aschers.) Janka) III, 147 — pseudo-Cracca Bert. var. ambigua (Guss.) Dur. et Barr. IX, 352

- pyrenaica Pourr. var. longifolia

Pau IX, 191

sativa L. subsp. cordata Wulf f. subtriflora O. Nägeli et Thell. Ill, 128
silvatica L. f. subrotundata B. Benn. IX, 138

\*— Vanioti Lévl. VII, 230

Vigna Davyi Bol. VII, 125

 vexillata (L.) Benth. var. angustifolia Th. Val. V, 381

(Vilfa acuminata Trin.) VII, 373 (— rigens Desv.) IV, 278

Vincetoxicum hirundinaria Medic. var. Daniloi Rohl. I, 37

- intermedium Taliew II, 136

Viola adunca var. oxyceras (S. Wats.) Piper VIII, 11

alajensis W. Beck. III, 61
alpestris Freyn) VIII, 435

— — (DC.) Jord. subsp. B. Paulini Hay. VIII, 435

- subsp. A. polychroma (Kern.)
 Hay. VIII, 435

(— subsp. zermattensis W. Beck.) VIII, 435

— appendiculata W. Beck. III, 61 (— arenaria var. glaberrima Murb.)

VIII, 435

— arvensis var. c. gracilescens Jord.)

Hay. VIII, 435

— var. Madoniae Loj. Poj. V, 23

— var. b. segetalis (Jord.) Hay.
VIII, 435

Viola arvensis Murr. f. subpatens C. G. Westerld. IV, 18

(— aurea var. venosa S. Wafs.) VIII, 11(— biflora var. crassifolia Mak.) VIII, 107

— calcarata L. var. bicolor Wegenm. VII, 43

(— canina var. oxyceras S. Wats.) VIII, 11

chaerophylloides (Regel) Mak. VI, 287

— — var. Sieboldiana (Max.) Mak. VIII, 107

— f. simplicifolia Mak. VI, 287

— collina Bess. var. fraterna Seml. II, 95

- - var. β dumetorum Seml. II, 95

—  $-\beta$  styriaca (Strobl) Hay. VIII, 434 — crassa Måk. VIII, 107

- formosana Hay. VI, 193 (- gracilescens Jord.) VIII, 435

( - gracilis de Martr.-Don.) VIII, 157 - S. S. f. angustifolia (Form.) Vand. IX, 525

- S. S. f. elata (Form.) Vand. IX,

(- gracillima [Chaten.] R. et F.) VIII,

- St. Hil. var. \*incisa W. Beck. V, 46

Helena Ch. N. Forbes IX, 572
hirta var. carneiflora Sudre VIII, 323

\*X— Jaccardii (V. calcarata X cenisia W. Beck.) W. Becker III, 132

- ibukiana Mak. VIII, 110

(— incisa var. acuminata Franch. et Sav.) VIII, 107

\*- kermesina W. Beck. VII, 124

\*- membranacea W. Beck. VII, 123
- Nagasawai Mak. et Hay. VI, 193
- Nuttallii var. praemorsa (Dougl.)
Piper VIII, 11

(- Nuttallii var. venosa S. Wats.)

VIII, 11

oahuensis Ch. N. Forbes IX, 572
Painteri Rose et House IV, 221
Patrini DC. var. acuminata (Franch.

et Sav.) Mak. VIII, 107

×- permixta (hirta × odorata) Jord. c. pseudosepincola (Beck.) Hay. VIII, 434

(- pinnata Franch. et Sav.) VI, 287 (- var. chaerophylloides Reg. VI, 287

(—— var. dissecta Miq., non Turcz. nec Reg.) VI, 287

(-- var. Sieboldiana Max.) VIII, 107 (-- polychroma A. Kern.) VIII, 435

(- praemorsa Dougl.) VIII, 11

(— var. venosa A. Gr.) VIII, 11

Viola Pringlei Rose et House IV, 222 (- pseudosepincola W. Beck.) VIII,

 pumila Chaix var. orientalis K. Kupff, IV, 10

(— reptans Robins.) IV, 222

 rupestris Schmidt var. b. glaberrima (Murb.) Hay. VIII, 435

 $(--\alpha)$  typica Beck) VIII, 435

(- Savatieri Mak.) VIII, 107 (- saxatilis Pal.) VIII, 435

(- segetalis Jord.) VIII, 435 - sepincola Borb.) VIII, 434 (- Sieboldiana Mak.) VIII, 107

(- styriaca Strobl) VIII, 434 - suavis M. B. var. brevifimbriata W. Beck. II, 137

subsessifolia Laz. IV, 287

- sudetica Willd, var. stenophylla H. Sudre VIII, 157

- tricolor L. var. albido-coerulescens

C. G. Westerld. IV, 18 ( - - subsp. arvensis var. segetalis Rouy et Fouc.) VIII, 435

- **–** var. distinctissima Westerld, IV, 17

 – var. fulvo-striata C. G. Westerld. IV, 18

 $(--\beta)$  grandiflora Maly) VIII, 435 – var. lacticolor C. G. Westerld.

IV, 18 Wittr. – var. luteo-coerulea

luteo-cornlescens C. G. Westerld. IV, 17

 – var. lutescens Wittr, f. pulcherrima C. G. Westerld, IV, 18

(— — α montana Čel.) VIII, 435

 – var. roseola Wittr. f. purpurascens C. G. Westerld, IV, 18

- - f. luteo-roseola C. G. W. IV, 18

— — var. versicolor Wittr. f. perobscura C. G. W. IV, 17

 velutina var. angustifolia Form.) IX, 525

(— — var. elata Form.) IX, 525

— venosa (S. Wats.) Piper VIII, 11 \*Virola Koschnyi Warb. I, 71

- Mycetis Pulle IV, 374

(Viscum album var. hyposphaerospermum f. angustifolium R. Kell.) VII, 32 – – f. latifolium R. Kell. VII, 33

(- austriacum Wiesb.) VII, 32

 $(--\beta)$  Abietis Wiesb.) VII, 33  $(--\alpha \text{ Pini Wiesb.}) \text{ VII, } 32$ 

laxum Boiss. et Reut. β Abietis

(Wiesb.) Hay. VII, 33

— Menyhartii Engl. V, 337 Vismia floribunda T. A. Spr. II, 125 - Sprucei T. A. Spr. II, 125

(Vitex avicennioides Rich.) VII, 285

Vitex Duckei Hub. V, 308 (— ilicifolium Rich.) VII, 285

mollis H. B. K. IX, 367

odorata Hub. V. 308 orinocensis H. B. K. var. multiflora Hub. V, 308

triflora Vahl var. angustiloba Hub. V, 307

triflora Vahl var. coriacea Hub. V. 307

 triflora Vahl var. floribunda Hub. V, 307

– var. Kraatzii Hub. V, 308

- triflora Vahl var. tenuifolia Hub. V, 307

Vitis Bodinieri Lévl. et Vant. II, 157

 Cavaleriei Lévl. et Vant. II, 158 – Chaffanjoni Lévl. et Vant. II, 158 \*— chrysobotrys Lévl. et Vant. III, 350

\*— dichromocarpa Lévl. III, 350

\*- Esquirolii Lévl. et Vant. III, 20 \*— Feddei Lévl. VII, 231

- flexuosa Thunb. var. Mairei Lévl. VII, 340

 Gentiliana Lévl. et Vant. II, 158 - Labordei Lévl. et Vant. II, 158

\*--(?) Mairei Lévl. VII, 338

- Martini Lévl. et Vant. II, 159 multijugata Lévl. et Vant. II, 159 - oligocarpa Lévl. et Vant. II, 159 - Potentilla Lévl. et Vant. II, 159

- - var. glabra Lévl. et Vant II, 160 \*- prunisapida Lévl. et Vant. III, 350

- rigida Lévl. et Vant. II, 160 – rubrifolia Lévl. et Vant. II, 160

\*- Seguini Lévl. IV, 331

Vittadinia australis A. Rich. var. platycephala F. M. Read, VII, 387 (Vittaria elongata BL) V, 371

Vochysia chapadensis Malme II, 188 Voharanga Costant. et Bois. nov. gen. 1X, 536

 madagascariensis Costant. et Bois IX, 537

Vohemaria implicata Jum. et P. d. I. Bath. X, 271

\*Vrydagzenia Beccarii Schltr. IX, 429

\*- celebica Schltr. X, 13 \*- elata Schltr. IX, 430 \*- obliqua Schltr. 14

\*- samoana Schltr. IX, 91

(— Whitmeei Fleischm, et Rech.) IX, 91, 92

Vulpia ciliata (Danth.) Link V, 361 - f. glabrescens Rohl. 1, 24

(- Danthonii (A. u. G.) Volk.) V, 361 Gaudiniana (Boiss.) Terracc. V, 142

- Letourneuxii Aschers. IX, 474

# W.

(Wahlenbergia hercegovina Maly) VII, 188

Waltheria americana L. var. glandulosa R. E. Fr. VIII, 374 \*— Fauriei Lévl. X, 120 - Makinoi Hay. VI, 194 Regnellii K. Schum. VIII, 374 - vernonioides R. E. Fr. VIII, 373 Warmingia Löfgrenii Cogn. I, 96 Washingtonia Claytoni Britt. IV, 137 \*Webera Cavaleriei Lévl. IX, 323 Wedelia obionga Hutch. VIII, 381 \*Weigeltia Buchtieni Pax VII, 112 Weinmannia boliviensis Fries VI, 205 \*Wendlandia Cavaleriei Lévl. X, 444 \*— Dunniana Lévl. X, 444 \*- Feddei Lévl. X, 444 \*Werneria pectinata Lingelsh. VIII, 6 — Rosenii R. E. Fr. III, 298 Whitfieldia latiflos C. B. Cl. V, 354 Wickstroemia Fauriei Lévl. X, 156 Widdringtonia equisetiformis M. T. Mast. IV, 286 Mahoni M. T. Mast. IV, 286 Schwarzii (Marl) M. T. Mast. IV, 286 (Wierzbickia laricifolia Rchb.) VII, 34 liniflora Fourr.) VII, 34 Wimmeria confusa Hemsl. VIII, 293 Wislizenia californica Greene III, 167 costellata Rose III, 168 divaricata Greene III, 167 - fruticosa Greene III, 168 - mamillata Rose III, 168 — melilotoides Greene III, 166 pacalis Greene III, 167
Palmeri Brandeg, non Gr.) III, 167 (- refracta Greene) III, 167 Wissadula amplissima (L.) R. E. Fr. IX, – var. β rostrata (Schum. Thorm.) R. E. Fr. IX, 492 — var. α typica R. E. Fr. IX, 492 — — f. lobulata R. E. Fr. IX, 492 (- Balansae Hassl.) VII, 376 boliviana R. E. Fr. IX, 489 (- callimorpha [Hochr.] Hassl.) XI, 479 (- - var. Friesii Hassl.) IX, 479 conjungens R. E. Fr. IX, 508contracta (Link) R. E. Fr. IX, 505 - densiflora R. E. Fr. iX, 506 - diffusa R. E. Fr. IX, 488 (- divergens E. G. Bak) IX, 486 (- elongata Brdg.) IX, 476 - Fadyenii (Planch. in herb.) R. E. Fr. IX, 486 - glechomatifolia (St. Hil.) R. E. Fr. IX, 511 (- grandifolia E. G. Bak) IX, 508 - Grisebachii R. E. Fr. IX, 511 (— gymnanthemum [Gris.] K. Schum. IX, 506, 511 – var. subtomentosa R. E. Fr. IX510

(Wissadula gymnostachya Turcz.) IX, (— hernandioides auct. p. p. IX, 491, 505, 506 (- hernandioides Garcke) IX, 492 (- heterosperma Hochst.) IX, 492 hirsutiflora (Presl) Rose var. tricarpellata (Robins, et Greenm.) R. E. Fr. IX, 512 (— Jamesonii Turcz.) IX, 476 \*— indivisa R. E. Fr. IX, 211 — insignis R. E. Fr. IX, 512 (- Lechenaultiana Mast.) IX, 506 (— Lozani Rose) IX, 477 (- Luciana Bth.) IX, 506 — macrantha R. E. Fr. IX, 507 – var. γ brevipedunculata R. F. Fr. IX, 508 - - var.  $\beta$  grandifolia (E. G. Bak.) R. E. Fr. IX, 508 – var. α typica R. E. Fr. IX, 508 microcalyx (Rose) R. E. Fr. IX, 513 - microcarpa R. E. Fr. IX, 504 (- mucronulata A. Gr.) IX, 492 (— paniculata Rose) IX, 478 — parviflora (St. Hil.) R. E. Fr. IX, (- patens K. Sch.) IX. 491 – (St. Hil.) Garcke ssp. cuspidata R. F. Fr. IX, 490 - pedunculata R. E. Fr. IV, 107 IX, periplocifolia (L.) Presl var. γ antillarum R. E. Fr. IX, 487 — — f. macrophylla R. E. Fr. IX, 488 - f. microphylla R. E. Fr. IX, — var. β gracillima R. E. Fr. IX, 487 — var. hernandioides Gris. IX, 492 — — f. cordata Chod. et Hassl. IX, 505 <u> — — f. suborbiculata Chod. et</u> Hassl. IX, 505 – var. heterosperma Hochr. IX, 492 -- var. Luciana Hochr. IX, 506 - periplocifolia Mac Fayd.) IX, 486 (- Pringlei Rose) IX, 476 (- rostrata Planch.) IX, 491, 492 (— rostrata auct. p. p.) IX, 491, 505, 506 (— scabra Presl) IX, 478 (— spicata Presl) IX, 476 (- subpeltata (O. K.) R. E. Fr. IX, 505 (- tricarpellata Robins. et Greenm.) IX, 512 - tucumanensis R. E. Fr. IX, 509

\*Woodsia eriosora Christ V, 12 \*— frondosa Christ V, 12 Woodwardia paradoxa C. H. Wr. VI, 319 Wormia Mansoni A. T. Gage VII, 96

## X.

Xanthium bubalocarpon B. F. Bush

IV, 215
— oligacanthum Piper VIII, 269
(Xanthochymus tinctoria DC.) VIII, 488
Xanthosia pilosa Rudge var. \*longipes
Dom. IV, 299

\*— tasmanica Dom. IV, 298

Xanthostemon novaguineensis Th. Val. V, 387

(— paradoxus F. Muell.) V, 387 (Xenopoma eugenioides Gris.) III, 359 Xerospermum brachyphyllum Radlk. VIII, 191

— cylindrocarpum Radlk. VIII, 190 — echinulatum Radlk. VIII, 192

— intermedium Radlk. VIII, 191, 192 (— muricatum King [non Radlk.] VIII,

191, 192 (— Noronhianum Hiern [non Bl.]

VIII, 191
— unijugum Radlk. VIII, 192
(Ximenia ferox Poir.) VII, 119

Xiphagrostis condensatus (Hack.) W.

F. Wight VIII, 488 Xylobium brachystachyum Kränzl. V, 4 Xylocarpus benadirensis Mattei IX, 252 (Xylon Glaziovii O. K.) VIII, 67 Xylosma amara (Span.) Koord. IX, 407

\* Dunnianum Lévl. IX, 455 (— fragrans Desne.) IX, 407 (— leprosipes Clos) IX, 406 Xyris calcarata Heiml. VI, 211

\*— filiscapa Malme III, 112 \*— glaucescens Malme V, 103 \*— megapotamica Malme III, 111 \*— Riedeliana Malme V, 102 — rubrolimbata Heim. VI, 212

 (— stenophylla Nilss.) VI, 209
 — subulata R. et P. var. acutifolia Heim. VI, 209

(- tortula f. robusta Szyszyl.) VI, 210

\*— Uleana Malme III, 113 \*— uninervis Malme V, 101 — Wawrae Heim VI, 210

- Zahlbruckneri Heim. VI, 212

## Y.

Ypsilandra thibetica Franch, var. \*latifolia Vant. VI, 114

Yucca decipiens Trel. V, 245 — Endlichiana Trel. V, 246

Harrimaniae var. Gilbertiana Trel.
 V, 245

rostrata var. linearis Trel. V, 245
 valida Trel.) V, 245

## $\mathbb{Z}$ .

(Zanonia macrocarpa B1) IV, 381 Zanthoxylum guineense Stapf V, 353 Zaushneria Garrettii Nels. V, 218 (Zenobia cerasitlora Lévl.) IX, 448 Zephyranthes porphyrospila E. L. Holmb. III, 94

Zeugites mexicana var. glandulosa Hack.

VI, 158 \*Zeuxine androcardium Schltr. IX, 90

\*— Betche Schltr. IX, 90 (— Chalmersii Schltr.) X, 11

\*- Francii Schltr. IX, 289 \*- leucochila Schltr. III, 46

\*— Minahassae Schltr. X, 11 \*— plantaginea Schltr. IX, 91

samoensis Schltr. IX, 91
sphaerochila Fleischm. et Rech. IX, 91

- stenophylla Bth. IX, 91

Zexmenia ceanothifolia Sch. Bip. var.

conferta W. W. Jones I, 132
— foliosa Rusby I, 132
— gracilis W. W. Jones I, 132
\*— Herzogii Hassl, VII, 357

— xylopoda W. W. Jones I, 131 Zingiber leptostachyum Val. IX, 314 — Zerumbet (L.) Sm. var. litoralis

Val. VII, 184 Zinowiewia integerrima Turcz. VIII, 293

Zizia arenicola Rose IV, 99 \*Zizyphus Endlichii Loes. VIII, 296

\*-- Esquirolii Lévl. X, 148

-- obtusifolia A. Gr. VIII, 296

(Zwackia aurea Sendtn.) VII, 189
- Sendtneri (Boiss.) Maly VII, 189
Zygopetalum Binoti De Wild. IV, 174
(Zygophyllum australasicum Miq.) VIII,
420


- clavatum Schltr. et Diels VIII, 150

leucocladum Diels VIII, 150
Trothai Diels VIII, 150

Zygostates papillosa Cogn. IV, 62







New York Botanical Garden Library
3 5185 00257 7995

